

GLIVE MARIBORSKEGA OTOKA

Izdajo je omogočila: Mestna občina Maribor,
Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave

Uredniški odbor: Slavko Šerod
Anton Poler
Miro Šerod
Bojan Dobrotič

Oblikovanje: Slavko Šerod, Grafiti studio

Založnik: Gobarsko društvo Lisička Maribor

Naklada: 1000 izvodov

Tisk: Grafiti Studio

Maribor, 2018

GLIVE MARIBORSKEGA OTOKA

Slavko Šerod

Anton Poler

Miro Šerod

Bojan Dobrotič



Maribor, 2018

VSEBINA

Uvod	9
Splošno o glivah in monitoringu	11
Splošno o Mariborskem otoku	13
Kratek opis rastlin, živali in gliv na Mariborskem otoku	14
Zanimivosti iz sveta gliv	15
Podatkovna baza Boletus Informaticus	23
Spisek gliv, ki smo jih našli na Mariborskem otoku v letih 2013 – 2017	24
Pregled vrst gliv	35
Priloga: Seznam Zavarovanih vrst gliv in Rdeči seznam gliv Slovenije ter Začasni rdeči seznam ogroženih gliv Evrope	155
Literatura in viri informacij	170
Kazalo vrst	173

Uvod

V sodelovanju z Mestno občino Maribor, Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanja narave, je bil Gobarskemu društvu Lisička Maribor na javnem razpisu odobren 5-letni projekt "Monitoring gliv na Mariborskem otoku". Na osnovi dosedanjega preučevanja gliv lahko ocenimo, da je pestrost gliv Mariborskega otoka velika. Projekt je bil zaključen leta 2017. Namen projekta je bil spoznavati pestrost gliv Mariborskega otoka, ozaveščati ciljne skupine in izdelati brošuro o glivah Mariborskega otoka.

V Gobarskem društvu Lisička Maribor imamo z monitoringom gliv že večletne izkušnje: leta 2008 smo za Urad Vlade RS za komuniciranje ter Ministrstvo za okolje in prostor, izvedli projekt "Glive vlažnice (*Hygrocybe* spp.) kot odzivni bioindikator za ohranjanje biotske raznovrstnosti", kjer smo preučevali travniške vrste gliv. Leta 2009 smo s podobnim projektom bili uspešni na razpisu za Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma ter Službe vlade RS za razvoj in Evropske zadeve. Leta 2013 pa smo glive preučevali pri ciljnem raziskovalnem programu – CRP Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Inštitutom za sistematiko višjih gliv, Mikološko zvezo Slovenije in Kmetijskim inštitutom.

Pri monitoringu gliv smo redno zbirali podatke o gobjem bogastvu Mariborskega otoka, z ozaveščanjem ciljnih skupin pa želimo doseči boljše poznavanje gliv. Vidne dele gliv (gobe oz. trosnjake) smo popisovali z uporabo programske opreme *Boletus informaticus*, ki je v lasti Gozdarskega inštituta Slovenije. Določali smo jih terensko in tudi kabinetno, s pomočjo strokovne literature in ključev za določitev gliv ter z mikroskopskim opazovanjem. Projekt smo prav tako promovirali z zloženko "Monitoring gliv na Mariborskem otoku". Na številnih gobarskih razstavah v regiji in po Sloveniji smo obiskovalce seznanjali s projektom in večina je bila presenečena nad velikim številom vrst, ki smo jih našli na tako majhnem prostoru.

V času 5-letnega monitoringa smo uspeli najti, določiti in popisati 354 različnih vrst gliv. Posebnost so najdbe gliv iz seznama zavarovanih prostoživečih vrst gliv oz. iz rdečega seznama ogroženih vrst gliv Slovenije in tudi najdbe gliv, ki so navedene v začasnem rdečem seznamu ogroženih gliv Evrope. Rdeči seznam gliv je bil objavljen v UL RS št. 42/2010 in obsega 111 ogroženih vrst gliv z različnim statusom ogroženosti, med drugim tudi za zavarovane vrste gliv Slovenije, ki so posebej navedene v Uredbi o zavarovanih prostoživečih vrstah gliv (UL RS št. 58/2011) in obsega 41 najbolj ogroženih vrst gliv v Sloveniji, ki jih je prepovedano nabirati. Glive iz začasnega rdečega seznama ogroženih gliv Evrope so objavljene v tej brošuri. Za pomoč pri nastanku brošure se zahvaljujemo Mestni občini Maribor, Medobčinskemu uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, Zavodu


RS za varstvo narave, OE Maribor, članom Gobarskega društva Lisička Maribor in vsem, ki so kakor koli pripomogli k nastanku te brošure.

Namen brošure je seznanjanje o glivah, ki uspevajo na Mariborskem otoku, predvsem prebivalce Maribora, pa tudi širše, in spodbujanje zavzemanja za naravo na širšem mariborskem območju, prav tako tudi krepitev ekološke zavesti, ki temelji na spoštovanju narave. Javna predstavitev bogatega nabora gliv je nedvomno zanimivo sporočilo o prisotnosti naravnih organizmov, ki živijo v skupnosti z drugimi organizmi, tako rastlinskimi kot živalskimi. Brošura naj vsakomur, ki se zanima za lepote narave, služi kot slikovit vodnik osnovnih informacij o glivah, ki so si izborile prostor na Mariborskem otoku, ki je prostorsko resda majhno območje, toda bogato obdarjeno. Služi naj vsem, ki so željni raziskovanj, a nimajo dovolj dobrih predznanj. Morda bo kdo odkril kakšno novo vrsto in veselilo nas bo, če nas bo o tem obvestil, saj narava vedno lahko pripravlja presenečenja. Publikacija je tudi prispevek Gobarskega društva Lisička Maribor k predstavitvi naravnega bisera, kakršen je Mariborski otok in na katerega je lahko mesto Maribor upravičeno ponosno. Enako ponosni naj bodo tudi zanamci, ki jim bomo skušali otok zapustiti neokrnjen in čim bolj ohranjen ter bogat, saj smo na Otoku le opazovalci in gobe ob krožni poti zgolj opazujemo, ne nabiramo.

Uredniški odbor

Splošno o glivah in monitoringu

Gliva je skupno ime za gobo in podgobje, kot kaže slika 1. Glive poleg bakterij sodelujejo pri razgrajevanju organskih snovi in s tem sklepajo kroženje snovi v naravi. Hifni preplet (ali micelij), ki raste pod zemljo in je nujna podlaga, na kateri rastejo gobe, predstavlja trajno življenjsko obliko in ima sposobnost neskončne rasti, njegova oblika nedoločene telesne strukture pa se bistveno razlikuje od osebkov rastlin in živali. Glive ne spadajo med rastline niti med živali, ampak so samostojni organizmi. Pri monitoringu gliv smo bili odvisni predvsem od gob oz. trošnjakov, ki predstavljajo vidni del gliv in preko teh smo lahko sklepali na njihovo prisotnost. Trošnjaki predstavljajo le kratkotrajno fazo v razvojnem ciklusu glive. Monitoring je tako zaradi nerednega pojavljanja trošnjakov zahteval ponovljivo vzorčenje in intenzivno terensko delo. Izhodišča za pripravo programa monitoringa so bila: dolgoročna naravnost, racionalnost, enostavnost in normiranost. Pri popisih smo beležili imena opaženih vrst gliv (vrstno ime in rodovno ime). Strokovno določanje gliv so opravljali determinatorji Gobarskega društva Lisička Maribor, terminologijo pa mikološka komisija Mikološke zveze Slovenije.



Slika 1: Kaj je gliva in kaj goba (trošnjak) (Vir: www.gobe.si)

Pri monitoringu gliv Mariborskega otoka smo najdbe razdelili v tri območja: zahodni del otoka, srednji del otoka in vzhodni del otoka (slika 2).



Slika 2: Tri območja monitoringa gliv (Vir: informativna tabla na Mariborskem otoku)

Splošne značilnosti pojavljanja trosnjakov: rast večine gob v zmernem podnebnem pasu z izraženimi letnimi časi je pogojena z vegetacijsko sezono in umeščena v določen letni čas. V tem obdobju lahko pričakujemo, da se bodo trosnjaki pojavili. Dejanski začetek gobje rasti pa sprožijo določeni okoljski dejavniki, v prvi vrsti vlaga in temperatura. Sezona rasti gob pri nas traja od zgodnje pomladi do pozne jeseni, večina pa se jih pojavi septembra in oktobra. Gobe rastejo hitro, dejansko lovimo trenutke v njihovem razvojnem ciklu. Obdobje intenzivne rasti lahko traja od nekaj dni do nekaj tednov.

Posamezni mejniki v sezoni rasti gob: novo sezono rasti gob zaznamuje marčna polževka, po domače marčnica, ki se pojavi, še preden drevesa ozelenijo. Nato se aprila pojavijo predstavniki zaprtotrošnic: smrčki ali po domače mavrahi. Pojav prve poletne rasti gob začnejo značilni predstavniki prostotrošnic: navadna lisička in poletni goban ter golobice. Sledi obdobje poletnega mirovanja (vročina, suša), obdobje jesenske rasti pa sledi pojavu izdatnejših padavin in ohladitev, takrat dejansko lahko najdemo največ različnih vrst gob. Poznojesenska rast se nadaljuje po odpadanju listja in pojavu zmrzali, do zimskega mirovanja. Kljub temu lahko pozimi najdemo še kar nekaj vrst gob, npr. zimske panjevke, bukove ostrigarje in tudi bezgove uhljevke. V splošnem gobe rastejo čez vse leto. Večina jih raste na tleh, ostale pa na drevesih oz. na štorih in razpadajočih delih dreves.

Splošno o letnih nihanjih pojavljanja gob: pri gobah so značilna velika letna nihanja pojavljanja gob, ki jih nihče ne zna zanesljivo napovedovati. Pojav gob je vedno pogojen z vremenskimi razmerami (s padavinami, vlago in s temperaturo), vendar pa padavine in vremenske razmere niso zadosten pogoj za dobro gobjo letino. Te se pojavijo približno na 5 do 7 let. Izjemne gobje letine so redek pojav in ga je možno opazovati na 12 do 15 let ali več.

Splošno o Mariborskem otoku

Mariborski otok (slika 3) je naravni otok na reki Dravi pred Mariborom. Leta 1951 je bil zavarovan kot naravna znamenitost, danes pa ima status površinsko geomorfološkega in botaničnega naravnega spomenika. Hkrati je Otok pomemben habitat rastlinskih in živalskih vrst, predvsem ptičev. Svoj prispevek temu habitatu smo dodali tudi v Gobarskem društvu Lisička Maribor, v okviru 5-letnega monitoringa gliv, ko smo našli, določili in popisali 354 različnih vrst gliv.



Slika 3: Mariborski otok iz zraka (Vir: www.maribor.si)

Mariborski otok predstavlja edinstveno geomorfološko tvorbo, ki je nastala v zanimivih geoloških razmerah na prehodu iz Alp v subpanonski svet. Naravne okoliščine, ki so omogočile nastanek otoka, so bile brzice na reki Dravi, kjer je danes jez Hidroelektrarne Mariborski otok. Voda, ki je iz Alp nosila veliko peska in drobirja, se je pod brzicami umirila in odlagala veliko plavnega materiala in tako je sčasoma nastal otok značilne kapljičaste oblike. Po prof. Franju Bašu je otok "najmlajša geološka tvorba mariborske pokrajine". Nastajati so začele prečno položene plasti iz trdega staromiocenskega marmorskega laporja, ki so zgradile podvodne čeri. Ob straneh otoka se reka Drava še zadnjič zoži, preden se dolina odpre v Dravsko polje in Drava postane iz alpske reke umirjena ravninska voda. Omenjeni prag iz trdih kamnin je Dravi naglo jemal moč, tako da je reka tu odložila večino plovnega materiala, iz katerega je nastal otok. Otok je tako aluvialna tvorba, kar pomeni, da je nastal z naplavino rečnih otokov in sicer ob koncu najmlajše ledene dobe.

Mariborski otok predstavlja naravno posebnost, saj je pravi rečni otok in edini te vrste v Sloveniji. Na peščenih in z mineralnimi snovmi bogatih tleh se je razvilo bujno

rastlinstvo in otok zato odlikuje izredno pestra floristična sestava. Položaj otoka je namreč omogočal tudi naseljevanje gorskih rastlin, ki jih je iz Alp prinesla reka Drava. Na otoku, ki ima sicer višjo relativno vlago od neposrednega okolja, vlada posebno podnebje, ki je omogočilo razvoj bogatega rastlinskega in živalskega sveta. Otok prekriva bogata gozdna združba s podrastjo, kjer rasejo številne redke rastline in, kot smo opazili pri monitoringu, tudi glive. Dom pa nudi tudi številnim živalim, predvsem pticam.

Narava otoka je v nenehnem gibanju in spreminjanju v smislu bogatenja rastlinskih in živalskih vrst, zato je varovanje še kako smiselno. Otok ima velik tudi pomen za oskrbo s pitno vodo, saj na otoku načrpana voda služi za bogatenje podzemne vode na Urbanskem platoju, ki je tod najpomembnejši vodni vir, saj s pitno vodo oskrbuje širšo regijo in Mestno občino Maribor. Narava Mariborskega otoka je varovana po lokalnih predpisih in tudi po številnih državnih predpisih.

Kratek opis rastlin, živali in gliv na Mariborskem otoku

Mariborski otok izstopa zaradi bogate flore in favne, predvsem pa je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Registriranih je bilo že 330 rastlinskih vrst (med njimi tudi znamenita trolistna vetrnica, ki dosega eno najbolj vzhodnih rastišč v Evropi). Seznam rastlin otoka obsega več kot 10 % vseh slovenskih rastlinskih vrst. Predvsem spomladi in poleti je v gozdu veliko cvetočih rastlin, med katerimi so v ospredju veliki zvonček, pasji zob in jetrnik. Otok je na vzhodnem delu poraščen z grmišči, predvsem z drevesi gabra, hrasta in bora, na zahodnem delu pa prevladuje gabrov in bukov gozd.

Z ornitološkimi opazovanji so odkrili 75 različnih vrst ptic, od tega 31 vrst, ki na otoku tudi gnezdiijo. Značilne so gozdne vrste ptic, posebno v zimskem času pa Otok predstavlja zatočišče vodnih ptic. V nadaljevanju je kratek seznam opazovanih vrst ptičev na otoku:

- gozdne vrste ptic: ščinkavec, črnoglavka, taščica, kos, vrbji kovaček, poljski vrabec, velika sinica, lišček, dlesk, veliki detel, carar, močvirska sinica, brglez, kanja, vodomec, mali slavec,
- vodne vrste ptic: mali ponirek, liska, labod grbec, mlakarica, čopasta črnica, veliki kormoran, zvonec.

Na otoku prav tako živijo tudi mnogi mali sesalci, predvsem netopirji, veverice, roveke, gozdne miši in ježi. Med žuželkami in nevretenčarji pa prevladujejo metulji, kačji pastirji, hrošči in pajki. Svoj življenjski prostor najdejo v reki ob otoku tudi ribe postrvi in tiste ribje vrste, ki jim bolj ustreza počasen tok reke Drave.

Glive na Otoku rastejo po skoraj celotni površini. V času monitoringa gliv, med leti 2013 in 2017, smo določili in popisali 354 različnih vrst gliv iz različnih rodov, družin in debel, ki bodo natančneje predstavljene v nadaljevanju brošure. Od 41 v Sloveniji zavarovanih vrst gliv smo našli velikolusko mušnico (*Amanita strobiliformis*), od ogroženih vrst iz rdečega seznama pa dišečo trhličko (*Antrodiella fragrans*), cvetočo grmuljo (*Artomyces pyxidatus*), pisano tintovko (*Coprinopsis picacea*) in rjavi bledotrosnik (*Gyroporus castaneus*). Našli smo tudi več redkih evropskih vrst gliv iz "Začasnega rdečega seznama ogroženih gliv Evrope" (Ing, B. 1993). Iz skupine B: orošeni nogavičar (*Chamaemyces fracidus*), iz skupine C: lužninska koprenka (*Cortinarius sodagnitus*), nesomerna rdečelistka (*Entoloma excentricum*), pegasti slinar (*Gomphidius maculatus*), godejeva razcepljenka (*Inocybe godeyi*), medvedja žilavka (*Lentinellus ursinus*) in vrbova ploskocevka (*Trametes suaveolens*), iz skupine D: ovratniška zvezdica (*Geastrum triplex*) in pesniška polževka (*Hygrophorus poetarum*).

Zanimivosti iz sveta gliv

Živa bitja so razdeljena v več skupin organizmov, ki jim pravimo kraljestva (Regnum). Glive (Fungi, Mycota) so visoko specializirana živa bitja, ki niso rastline, živali, bakterije ali protisti. Uvrščamo jih v skupino večceličnih organizmov, ki imajo v celicah jedro – evkarionti.

Glive nimajo plastidov (organel v rastlinskih celicah, udeleženih v sintezi, in pri skladiščenju pomembnih spojin) in ne vsebujejo listnega zelenila (klorofila). Zato niso sposobne, tako kot rastline, iz sončne svetlobe sintetizirati organske snovi iz anorganskih, ampak si morajo hrano črpati iz okolja. Hranijo se z razkrajanjem in vsrkavanjem (absorbiranjem) hrane skozi celično steno. Organizme, ki energijo pridobivajo iz energijsko bogatih organskih molekul, ki jih zaužijejo, imenujemo heterotrofni organizmi. Glive ne oblikujejo tkiv, telo ni razčlenjeno v steblo, liste in korenine, torej je steljka (talus).

Glive običajno oblikujejo eno vrsto spolnih trosišč (teleomorf) in eno ali več oblik nespolnih trosišč (anamorf). Pojav, da ima določen organizem (ena vrsta!) več razmnoževalnih oblik, imenujemo pleomorfizem. Glivo, kot biološko enoto, imenujemo holomorf (teleomorf + en ali več anamorfov). Vsaka oblika trosišč ima lahko veljavno znanstveno ime in zato jo lahko uvrščamo v različne višje taksonomske enote.

Opisanih je približno 100.000 vrst gliv. Ocenjujejo, da je na svetu približno 1.5 do 2 milijona vrst gliv, v Sloveniji pa približno 15.000 vrst gliv. Določene vrste gliv so v Sloveniji z uredbami zavarovane in jih je prepovedano nabirati.

V tleh, različnih razkrajajočih se organskih snoveh ali v skorji dreves, se skriva nevidni in obsežnejši del organizma, sestavljen iz drobnih razvejanih nitk, imenovanih hife; ta del glive imenujemo podgobje ali micelij. Viden je le nadzemni del glive, imenovan

goba; gliva je torej organizem, ki je sestavljen iz vegetativnega dela oziroma podgobja (micelija) in iz razmnoževalnega dela oziroma gobe (trosnjaka). Podgobje obstaja ves čas in se razrašča v organski podlagi več mesecev, let ali stoletij. Ob ustreznih okoljskih pogojih pa podgobje začne "cveteti" oz. zrastejo gobe. Največje doslej odkrito podgobje so leta 1998 našli v ZDA, v državi Oregon, ki se razrašča na površini 890 ha, njegova starost pa je ocenjena na 2500 let. Omenjeno podgobje še zmeraj proizvaja trosnjake.

Po zgradbi so glive bliže živalim kot rastlinam. Za živalske organizme je denimo značilno, da vdihujejo kisik in izdihujejo ogljikov dioksid – podobno velja za glive. Celične stene gliv arhitekturno sicer spominjajo na celične stene rastlin, vendar so zgrajene iz hitina (kot npr. pri hroščih), ki gobi daje obliko in čvrstost. Nekatere vrste gliv vsebujejo tudi beljakovino kolagen, ki je sicer prisotna v mišičnih tkivih. Glive za oddajanje informacij po miceliju uporabljajo enak nevrottransmitor, kot se pretaka v človeških možganih (dimetiltriptamin). Z živalskimi organizmi imajo glive še eno skupno lastnost, da celice v okolico izločajo hidrolitične encime, kot je npr. celulaza, iz okolice pa absorbirajo razgradne produkte hidrolize. Glive v okolju reciklirajo organske snovi, zato so ključnega pomena pri kroženju snovi v ekosistemi.

Glive so se, podobno kot vsa živa bitja, razvijale milijone let, da bi dosegle sedanjo raznovrstnost. Zaradi svoje zgradbe jih je le malo ohranjenih v obliki fosilnih ostankov, še največ so jih našli iz obdobja jantara. Najstarejši fosil gobe sega 90 milijonov let v preteklost. Med evolucijo so se glive prilagajale novo nastalim življenjskim razmeram in se razvijale v nove vrste, neprilagodljive vrste pa so izumrle. Po obliki so se na splošno malo spreminjale.

Glive strokovno preučujejo mikologi. Glive pogosto delimo na nižje in višje glive, pri čemer med nižje glive spadajo npr. plesni, rje, sneti idr., med višje pa vse tiste, ki tvorijo trosnjake (gobe) in jih nabiralci lahko poberejo. Glive spadajo v svoje kraljestvo, ki ga razvrščamo na podkraljestva, debela in poddebla, razrede in podrazrede; tem sledijo redi, družine, ki tvorijo rodove, tem pa pripadajo različne vrste, ki imajo lahko tudi svoje podvrste; nekatere še lahko opišemo kot različek ali kot obliko. Za opise so po mednarodnem dogovoru uporabna latinska znanstvena imena in imajo svetovni pomen, saj npr. pri potovanju po svetu ni mogoče poznati vseh lokalnih imen za gobe, temveč zgolj znanstvena imena.

Tako lahko npr. rdečo mušnico, ki je podrobno opisana na spletni strani www.gobe.si, z latinskim imenom *Amanita muscaria*, razvrstimo na naslednji način:

- kraljestvo: Fungi
- podkraljestvo: Dikarya
- deblo: Basidiomycota (prostotrosnice)
- poddeblo: Agaricomycotina

- razred: Agaricomycetes
- podrazred: Agaricomycetidae (listarice)
- red: Agaricales (listarji)
- družina: Amanitaceae (mušničarke)
- rod: Amanita (mušnice)
- vrsta: Amanita muscaria (L.) Lam. (1783) – rdeča mušnica (*)

Pojasnilo: (*) prva beseda (L.) označuje okrajšavo za avtorja Carla Linneja (1707–1778), ki je gobo opisal leta 1753, a jo je uvrstil v rod kukmaki (*Agaricus*) in jo dvotirno (binarno) poimenoval z rodovnim in vrstnim imenom (nomenklatura), kar je bilo sprejeto kot mednarodna norma za poimenovanje gliv; druga beseda Lam. je okrajšava za zadnjega avtorja, ki je gobo raziskal; gre za avtorja Lamarcka, ki je gobo leta 1783 strokovno raziskal in jo umestil v rod *Amanita*.

Latinska imena so nastala na podlagi značilnosti gobe in imajo poleg rodu in vrste navedenega še avtorja(e) ter letnico opisa.

Vsaj tisoč različnih vrst trosnjakov lahko ločimo s prostim očesom in jih makroskopsko določimo, za natančnejšo določitev pa potrebujemo mikroskop, včasih pa tudi posebne vrste kemikalij, s katerimi lahko na osnovi reakcij na kemikalije določimo oz. potrdimo vrsto gobe. Za pravilno določitev posamezne vrste gobe je treba natančno preveriti vse sestavne dele gobe (klobuk, bet, trosovnico, dnišče beta, obliko in barvo klobuka in beta, obliko in velikost ter barvo trosov, pomemben pa je tudi vonj, okus in otip).

Gliva raste iz trosu oz. spore. S trosi se glive razmnožujejo, trosnjak (gobo) pa razvijejo le nekatere vrste gliv. Njihova vloga je podobna vlogi cvetov in plodov pri rastlinah. Glavni del glive je nitasto razraščeno podgobje, ki raste v prst, tkivo ali les. Pri nekaterih vrstah se podgobje razteza po veliki površini, kar omogoča črpanje mineralnih snovi na veliki površini. Nekatere glive so enocelične, druge pa večcelične in slednjim iz trosov zrastejo nitke ali hife, preplet hif pa se imenuje podgobje ali micelij. Trosi nastajajo v trosnjaku glive. Kaleči trosi se razvijejo v enojedrni micelij, ki se razrašča po podlagi, ko pa nastopi določen čas, se združita oba tipa enojedrnega micelija v dvojedrne celice, ki jim poenostavljeno lahko rečemo moška in ženska celica. Nastane skupek vlaken, imenovan hife, na prepletu katerih pod ugodnimi pogoji zraste trosnjak.

Večino gob glede na proces nastajanja in razširjanja trosov razvrščamo v dve glavni debli: prostotrosnice (bazidiomicete) in zaprtotrosnice (askomicete). Dvojedrna celica se razvije v podstavek oz. bazidij pri prostotrosnicah (potem ko se micelija združita in nastane dvojedrni micelij, se jedro deli dvakrat in nastanejo običajno 4 trosi v eni

sami celici in sicer na "pecljih podstavka" oz. sterigmah bazidija) ali v mešiček oz. ask pri zaprtotrošnjah (potem ko se oba enojedra micelija združita v trosnjaku, se oblikuje "vrečka", v kateri se jedra delijo štirikrat in nastane običajno 8 trosov). Izjema pri prostotrošnjah so trebucharji (*Lycoperdales*), pri katerih trosi nastajajo pod trdo lupino; ko ta razpoči, nastane oblak trosov, ki jih raznašata veter ali dež. Trosi so pomembni za določitev posamezne vrste glive in so povprečno veliki od 1 mikrometra (μm) do 20 μm . Trosi posameznih rodov gliv so različnih barv in oblik (okrogli, elipsasti, ovalni, z grbico, z bradavicami idr.). Obstajajo tudi glive, ki ne tvorijo trosnjakov in se razmnožujejo z brstenjem oz. z delitvijo celice. Celica glive je podobna živalski celici in vsebuje: celično steno iz hitina, jedro, celično mrenico in vakuolo.


Če na kratko ponovimo zgoraj opisani razvojni krog, se glive razmnožujejo spolno in nespolno na različne načine. V primeru, da je trosovnica gobe pod klobukom sestavljena iz lističev ali cevč, gobo uvrščamo med prostotrosnice, kjer najdemo veliko užitnih in tudi skoraj vse najbolj nevarne strupene vrste gob. Med prostotrosnice spadajo npr.: gobani, golobice, lisičke, mušnice, kolobarnice, tintnice, koprenke idr. Naslednje (še večje) deblo pa tvorijo zaprtotrosnice, med katere spadajo npr. smrčki, hrčki, skledice, gomoljike oz. tartufi idr. Pri prostotrošnjah nastajajo trosi (bazidiospore) na površini posebnih kijastih celic (bazidijev) in so navadno štirje, pri zaprtotrošnjah pa nastanejo trosi (askospore) v notranjosti trosnih mešičkov (askih) in jih je navadno osem. Na spletni strani www.gobe.si sta prikazani Razvojni krog prostotrosnic, ki ga slikovito ponazarja knežja mušnica (*Amanita caesarea*) na sliki 4 in Razvojni krog zaprtotrosnic, ki ga ponazarja užitni smrček (*Morchella esculenta*) na sliki 5.

V Sloveniji je doslej terminološko, s slovenskimi imeni, opisanih okoli 3500 vrst gob, kar je rezultat večdesetletnega dela različnih društev, združenih v Mikološki zvezi Slovenije (MZS). Veliko opisanih vrst gob je užitnih in pogojno užitnih, približno 200 je strupenih in približno 30 smrtno strupenih vrst gob. 111 jih je na Rdečem seznamu gliv Slovenije, med katerimi je nekaj zavarovanih vrst (41), ki jih je v Sloveniji prepovedano nabirati. Okoli 200 vrst gob pa je takšnih, pri katerih užitnost še ni raziskana. Več kot 1500 vrst gob je podrobneje opisanih na spletni strani Gobarskega društva Lisička Maribor, www.gobe.si. Povprečni slovenski ljubiteljski nabiralci gob poznajo le nekaj vrst gob, vrhunski poznavalci gob v društvih in MZS pa seveda veliko več vrst.

Doslej smo opisovali t.i. višje glive (makromicete). Obstajajo pa tudi t.i. nižje glive (mikromicete), ki so prav tako precej raznovrstne in razvrščene v več debel: plesni (pojavljajo se npr. na kruhu, sadju, marmeladi idr.), kvasovke (povzročajo alkoholno vrenje, vzhajanje testa itd.), sneti in rje (povzročajo denimo bolezni na kmetijskih površinah z gojenimi kulturami). Teh na Mariborskem otoku nismo preučevali.

Posledica delovanja nižjih gliv je npr. kvašeno testo za kruh, kislo zelje ali kisla repa. Določene vrste plesni (t.i. žlahtne oz. plemenite plesni) so primerne za uživanje in jih najdemo v sirih (gorgonzola, camembert, roquefort idr.). Če pijemo jogurt, kefir, pivo,

vino ali katerikoli fermentirani napitek, je končni okus in videz pijače zasluga kopice mikroorganizmov, bakterij in gliv kvasovk. Neugodne posledice delovanja nižjih gliv pa so različne bolezni, kot npr. hrušev ožig, kostanjev rak, atletsko stopalo itd.




Slika 4: Razvojni krog glive iz debla prostotrosnic (Vir: www.gobe.si)

Glive razlikujemo tudi po načinu prehranjevanja:

- zajedavke ali paraziti (napadajo žive organizme, kot npr. slabotno, staro ali poškodovano dreve, in jih pri tem uničujejo, lotijo pa se tudi živali ali celo samih gliv; tipični predstavniki so lesne gobe, ki rastejo na drevesih; v nekaj letih lahko drevo popolnoma uničijo),
- gniloživke ali saprofiti (hranijo se na mrtvih organizmih ali njihovih ostankih, kot so razpadla drevesa, listje, slama ali drugi organski odpadki, njihova glavna naloga pa je, da vsako organsko snov predelajo nazaj v minerale; delimo jih na tri skupine: v prvi so gobe, ki rastejo na zakopanih ali delno predelanih ostankih organskih snovi, v drugi so gobe, ki rastejo na premičnih ostankih organskih snovi (listje, hrana) in sem spadajo plesnivke, v tretji pa so gobe, ki so lahko tudi zajedavke, kot npr. lesne gobe),
- soživke oz. simbionti ali mikorizne glive (žive v sožitju z zelenimi rastlinami, pri tem pa se podgobje (micelij) spoji z drobnimi koreninami različnih rastlin ali

dreves, pri čemer gobe za svoj razvoj prejmejo potrebne organske snovi, rastline pa iz podgobja prejmejo minerale, ki jih potrebujejo za rast; sem spadajo vse gobe, ki živijo v sožitju z drevesi in se navadno vsako leto pojavijo na približno istem kraju in ob približno istem času).



Slika 5: Razvojni krog glive iz debla zaprtotrosnic (Vir: www.gobe.si)

Na kratko lahko zapišemo, da gniloživke "pospravljajo" naravo, zajedavke nam naravo "uničujejo", soživke pa pripomorejo k boljši rasti rastlin. Zajedavske glive res prištevamo med škodljivce, vendar je med njimi precej zdravilnih vrst gob, druge pa so izrednega pomena za ravnovesje in normalno kroženje snovi v naravi, saj zajedavke organske snovi razkrojijo in jih spremenijo v minerale, kar je hrana za nove rastline in tako se življenjski cikel kroženja hranil v naravi nadaljuje. Gobe so pomemben vir hrane številnim vrstam živali in tudi ljudem.

Obstajajo še t.i. sekundarne glive, ki napadajo trosnjake drugih gliv in med njimi so znane npr.: zajedavska mrestovka (*Peckiaella deformans*), ki raste na sirovkah (*Lactarius*), zelena pajčevinka (*Hypomyces viridis*), ki raste na golobici (*Russula*) in bučikasta predrznica (*Spinellus fusiger*), ki raste na čeladicah (*Mycena*). Vse so razkrojevalke organskih snovi.

Glive so tudi v lišajih (*Lichenes*), ki se spolno razmnožujejo preko glive in tvorijo

simbiozo z zelenimi algami ter modrozelenimi cepljivkami. V Sloveniji je znanih okoli 900 vrst lišajev. Strupenih vrst med njimi ni, so pa znani po grenkem okusu in jih lahko uporabljamo npr. za čaje. Teh na Mariborskem otoku nismo preučevali.

Glive iz debla prostotrosnic lahko okvirno razdelimo glede na obliko trosnjakov. Na slikah od 6 do 9 so prikazane različne oblike trosnjakov prostotrosnic:




Slika 6: Lističaste oblike trosnjakov (Vir: Anton Poler: Gremo po gobe!, 1990)



Slika 7: Cevasta oblika trosnjaka (Vir: Anton Poler: Gremo po gobe!, 1990)



Slika 8: Nelističaste oblike trosnjakov (Vir: Anton Poler: Gremo po gobe!, 1990)



Slika 9: Trebušasta oblika trošnjaka (Vir: Anton Poler: Gremo po gobe!, 1990)

Tudi glive iz debela zaprtotrosnic lahko okvirno razdelimo glede na obliko trošnjakov (sl. 10):



Slika 10: Nekaj oblik trošnjakov zaprtotrosnic (Vir: Anton Poler: Gremo po gobe!, 1990)

Podatkovna baza Boletus informaticus

Podatkovna baza gliv Boletus informaticus (BI) je računalniški program, ki omogoča vnos podatkov o glivah v Sloveniji in je namenjen sistematičnemu beleženju gliv, njihove razširjenosti in podatkov o njihovem rastišču. V podatkovni bazi niso shranjeni le vsi zapisi gliv, najdenih vrst na področju države, temveč program omogoča še različne obdelave gradiva, različne načine izpisa in kartografske predstavitve najdišč v mreži srednje-evropskega kartiranja flore (t.i. SRE koordinatna podatka X in Y) in v mreži UTM (Universal Transverse Mercator). Vsak podatek o vrsti glive in najdišču je avtoriziran in pri opisu razširjenosti je naveden avtor, pri čemer je vsak avtor sam odgovoren za pravilnost podatkov. Vsi podatki so elektronsko arhivirani in urejeni, posodobljeno poimenovani in prikazani na zemljevidu Slovenije. Objavljeni rezultati so zajeti tudi v tiskani obliki, v monografiji Glive Slovenije – Vrste in razširjenost (2005).

V rezultatih so samo tisti podatki, za katere je naveden: znan določevallec, čas in kraj nabiranja. Prikazana je tudi razširjenost različnih vrst gliv v mreži srednje-evropskega florističnega kartiranja, naveden kvadrant najdišča, pa tudi določevallec glive, leto in mesec najdbe ter tip podatka. Obrazci za vnos zapisa o glivi v podatkovno zbirko BI, so dostopni za evidentirane določevalce gliv na spletni strani.

Poimenovanje gliv v brošuri je posodobljeno po mednarodni podatkovni zbirki Index Fungorum, CABI Bioscience database, v času nastanka brošure. Index Fungorum velja za eno največjih zbirk imen gliv (Jurc, Piltaver, Ogris, 2005), ki jo stalno izpopolnjujejo in nadgrajujejo, v njej pa je trenutno okoli pol milijona zapisov o imenih gliv.

Spisek gliv, ki smo jih našli na Mariborskem otoku v letih 2013 – 2017

V spodnji tabeli je spisek 354 najdenih vrst gliv na Mariborskem otoku, v času izvajanja 5-letnega monitoringa:

Številka	Latinsko ime	Slovensko ime
1.	<i>Agaricus essettei</i>	Odsekani kukmak
2.	<i>Agaricus moelleri</i>	Moellerjev kukmak
3.	<i>Agaricus semotus</i>	Pritlikavi kukmak
4.	<i>Agaricus sylvicola</i>	Hostni kukmak
5.	<i>Amanita citrina</i>	Citronasta mušnica
6.	<i>Amanita pantherina</i>	Panterjeva mušnica
7.	<i>Amanita phalloides</i>	Zelena mušnica
8.	<i>Amanita strobiliformis</i>	Velikoluska mušnica
9.	<i>Amanita vaginata</i>	Sivi lupinar
10.	<i>Antrodia ramentacea</i>	Skorjina trhlca
11.	<i>Antrodiella fragrans</i>	Dišeča trhlička
12.	<i>Antrodiella hoehnelii</i>	Bukova trhlička
13.	<i>Antrodiella semisupina</i>	Slojevita trhlička
14.	<i>Armillaria borealis</i>	Severnjaška mraznica
15.	<i>Armillaria cepistipes</i>	Čebulasta mraznica
16.	<i>Armillaria gallica</i>	Rumenovenčna mraznica
17.	<i>Armillaria mellea</i>	Sivorumena mraznica
18.	<i>Armillaria ostoyae</i>	Čnomekinasta mraznica
19.	<i>Artomyces pyxidatus</i>	Cvetoča grmulja
20.	<i>Ascocoryne sarcoides</i>	Mesnata želatinka
21.	<i>Atheniella flavoalba</i>	Voskasta čeladka
22.	<i>Aurantioporus croceus</i>	Žafranasti zlatoluknjičar
23.	<i>Auricularia auricula-judae</i>	Bezgova uhljevka
24.	<i>Auricularia mesenterica</i>	Brestova uhljevka
25.	<i>Auriscalpium vulgare</i>	Navadna žlička
26.	<i>Bisporella citrina</i>	Rumena dvotroska
27.	<i>Bjerkandera adusta</i>	Osmojena bjerkandera
28.	<i>Bjerkandera fumosa</i>	Čokata bjerkandera
29.	<i>Boletus calopus</i>	Leponogi goban
30.	<i>Boletus luridus</i>	Svinjski goban

31.	<i>Boletus pulverulentus</i>	Spreminjavi goban
32.	<i>Boletus reticulatus</i>	Poletni goban
33.	<i>Bovista dermoxantha</i>	Mali kadilček
34.	<i>Callistosporium olivascens</i>	Olivna žoltotroska
35.	<i>Calocera cornea</i>	Rogasti rožički
36.	<i>Calocybe gambosa</i>	Majniška lepoglavka
37.	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	Paličasta hladetinka
38.	<i>Cerrena unicolor</i>	Pepelasti zvitoluknjičar
39.	<i>Chamaemyces fracidus</i>	Orošeni nogavičar
40.	<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Zelenkasti zelenivec
41.	<i>Chroogomphus rutilus</i>	Bakrenasti polžar
42.	<i>Ciboria batschiana</i>	Želodov kelihovec
43.	<i>Clavulina coralloides</i>	Grebenasta grivača
44.	<i>Climacocystis borealis</i>	Severnjaška poroznica
45.	<i>Clitocybe angustissima</i>	Vlažnoroba livka
46.	<i>Clitocybe augeana</i>	Vrtnarska livka
47.	<i>Clitocybe dealbata</i>	Pobeljena livka
48.	<i>Clitocybe gibba</i>	Rjavkasta livka
49.	<i>Clitocybe odora</i>	Janeževa livka
50.	<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	Vodenasta livka
51.	<i>Clitopilus prunulus</i>	Navadna mokařica
52.	<i>Clitopilus scyphoides</i>	Drobna mokařica
53.	<i>Coprinellus disseminatus</i>	Razsejani tintovec
54.	<i>Coprinellus ephemerus</i>	Minljivi tintovec
55.	<i>Coprinellus micaceus</i>	Sljudnati tintovec
56.	<i>Coprinopsis atramentaria</i>	Prava tintovka
57.	<i>Coprinopsis lagopus</i>	Plišasta tintovka
58.	<i>Coprinopsis picacea</i>	Pisana tintovka
59.	<i>Coprinus comatus</i>	Velika tintnica
60.	<i>Coprinus impatiens</i>	Veneča tintnica
61.	<i>Coprinus marculentus</i>	Oglatotrosna tintnica
62.	<i>Coprinus silvaticus</i>	Gozdna tintnica
63.	<i>Cortinarius anomalus</i>	Nepravilna koprenka
64.	<i>Cortinarius anserinus</i>	Sladkobna koprenka
65.	<i>Cortinarius decipiens</i>	Goljufiva koprenka
66.	<i>Cortinarius elegantissimus</i>	Zala koprenka
67.	<i>Cortinarius fulgens</i>	Žareča koprenka
68.	<i>Cortinarius glaucopus</i>	Kolobarniška koprenka
69.	<i>Cortinarius hinnuleus</i>	Jelenčja koprenka
70.	<i>Cortinarius incisus</i>	Razcepljena koprenka

71.	<i>Cortinarius infractus</i>	Scefrana koprenka
72.	<i>Cortinarius purpurascens</i>	Škrlateča koprenka
73.	<i>Cortinarius purp. var. largosuides</i>	Škrlateča koprenka, kijasti različek
74.	<i>Cortinarius rufo-olivaceus</i>	Vrščajeve koprenka
75.	<i>Cortinarius sodagnitus</i>	Lužninska koprenka
76.	<i>Cortinarius talus</i>	Gležnjasta koprenka
77.	<i>Cortinarius venetus</i>	Beneška koprenka
78.	<i>Crepidostus mollis</i>	Zdrizasta postrančica
79.	<i>Crepidostus variabilis</i>	Raznolična postrančica
80.	<i>Crucibulum laeve</i>	Navadni lonček
81.	<i>Cylindrobasidium evolvens</i>	Ploski skorjevec
82.	<i>Dacrymyces palmatus</i>	Pahljačasti solzar
83.	<i>Dacrymyces stillatus</i>	Kapljasti solzar
84.	<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rdečeča zvitocevka
85.	<i>Daedaleopsis tricolor</i>	Tribarvna zvitocevka
86.	<i>Daldinia concentrica</i>	Slojevita oglarka
87.	<i>Datronia mollis</i>	Navadni zvitorpor
88.	<i>Delicatula integrella</i>	Navadna belka
89.	<i>Diatrype stigma</i>	Ploščati predirnik
90.	<i>Dichomitus campestris</i>	Hrastov blazinovec
91.	<i>Dumontinia tuberosa</i>	Gomoljasta zalogarica
92.	<i>Echinoderma asperum</i>	Hrapava trnovka
93.	<i>Echinoderma echinaceum</i>	Bodičasta trnovka
94.	<i>Echinoderma hystrix</i>	Čvrstoluska trnovka
95.	<i>Entoloma conferendum</i>	Križnotrosna rdečelistka
96.	<i>Entoloma excentricum</i>	Nesomerna rdečelistka
97.	<i>Entoloma nitidum</i>	Modra rdečelistka
98.	<i>Entoloma rhodopolium</i>	Nizka rdečelistka
99.	<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	Nizka rdečelistka, smrdeča oblika
100.	<i>Entoloma sericeum</i>	Bleščeča rdečelistka
101.	<i>Entoloma turbidum</i>	Šotiščna rdečelistka
102.	<i>Exidia glandulosa</i>	Žlezasta zamazanka
103.	<i>Exidiopsis calcea</i>	Bela lojevka
104.	<i>Flammulina velutipes</i>	Zimska panjevka
105.	<i>Fomes fomentarius</i>	Bukova kresilka
106.	<i>Fomitiporia punctata</i>	Ploščati glivopor
107.	<i>Fomitiporia robusta</i>	Hrastov glivopor
108.	<i>Fomitopsis pinicola</i>	Smrekova kresilača
109.	<i>Funalia gallica</i>	Tankoroba nasršenka
110.	<i>Ganoderma applanatum</i>	Sploščena pološčenka

111.	<i>Geastrum quadrifidum</i>	Četverokraka zvezdica
112.	<i>Geastrum triplex</i>	Ovratniška zvezdica
113.	<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Sivorjava tramovka
114.	<i>Gloeophyllum trabeum</i>	Labirintasta tramovka
115.	<i>Gomphidius glutinosus</i>	Veliki slinar
116.	<i>Gomphidius maculatus</i>	Pegasti slinar
117.	<i>Gymnopilus hybridus</i>	Hibridna plamenka
118.	<i>Gymnopilus junoninus</i>	Junonina plamenka
119.	<i>Gymnopus alkalivirens</i>	Črni korenovec
120.	<i>Gymnopus brassicolens</i>	Zeljarski korenovec
121.	<i>Gymnopus dryophilus</i>	Vitki korenovec
122.	<i>Gymnopus erythropus</i>	Sehlični korenovec
123.	<i>Gymnopus foetidus</i>	Smrdeči korenovec
124.	<i>Gymnopus hariolorum</i>	Smradni korenovec
125.	<i>Gyroporus castaneus</i>	Rjavi bledotrosnik
126.	<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Solzeča medlenka
127.	<i>Hebeloma hiemale</i>	Zimska medlenka
128.	<i>Hebeloma leucosarx</i>	Vrbina medlenka
129.	<i>Hebeloma longicaudum</i>	Dolgobetna medlenka
130.	<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dvobarvna medlenka
131.	<i>Hebeloma sinapizans</i>	Redkvičasta medlenka
132.	<i>Hebeloma vaccinum</i>	Toporoba medlenka
133.	<i>Hebeloma versipelle</i>	Luskobetna medlenka
134.	<i>Helvella crispa</i>	Jesenski loputar
135.	<i>Helvella ephippium</i>	Sedlasti loputar
136.	<i>Hemimycena cucullata</i>	Bela polčeladica
137.	<i>Hemimycena lactea</i>	Smetanasta polčeladica
138.	<i>Heterobasidion annosum</i>	Jelov trohnoberž
139.	<i>Hygrocybe conica</i>	Koničasta vlažnica
140.	<i>Hygrophorus carpini</i>	Gabrova polževka
141.	<i>Hygrophorus cossus</i>	Prelčeva polževka
142.	<i>Hygrophorus eburneus</i>	Bela polževka
143.	<i>Hygrophorus poetarum</i>	Pesniška polževka
144.	<i>Hymenochaete corrugata</i>	Zgrbančena usnjevka
145.	<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Trdolesna usnjevka
146.	<i>Hyphoderma radula</i>	Otočkasti strgalkar
147.	<i>Hyphodontia quercina</i>	Hrastova zobnica
148.	<i>Hypholoma fasciculare</i>	Navadna žveplenjača
149.	<i>Hypholoma fasciculare</i> var. <i>pusillum</i>	Navadna žveplenjača, drobni različek
150.	<i>Hypholoma sublateritium</i>	Opečnata žveplenjača

151.	Hypoxylon fragiforme	Jagodasti skorjeder
152.	Hypoxylon fuscum	Malinasti skorjoder
153.	Hypoxylon multiforme	Krastasti skorjoder
154.	Inocybe abjecta	Črtasta razcepljenka
155.	Inocybe acuta	Ostrogrba razcepljenka
156.	Inocybe adaequata	Rdečeča razcepljenka
157.	Inocybe aghardii	Aghardova razcepljenka
158.	Inocybe albomarginata	Beloroba razcepljenka
159.	Inocybe asteospora	Zvezdastotrosna razcepljenka
160.	Inocybe bongardii	Bongardova razcepljenka
161.	Inocybe corydalina	Zoprna razcepljenka
162.	Inocybe dulcamara	Klobučevinasta razcepljenka
163.	Inocybe godeyi	Godejeva razcepljenka
164.	Inocybe hirtella	Mandljeva razcepljenka
165.	Inocybe maculata	Pegasta razcepljenka
166.	Inocybe mixtilis	Igličevna razcepljenka
167.	Inocybe napipes	Repasta razcepljenka
168.	Inocybe obscurobadia	Ozkocistidna razcepljenka
169.	Inocybe petiginosa	Sivoroba razcepljenka
170.	Inocybe phaeodisca	Svetloroba razcepljenka
171.	Inocybe pyriodora	Dišeča razcepljenka
172.	Inocybe rimosa	Zašiljena razcepljenka
173.	Inocybe squamata	Luskata razcepljenka
174.	Inocybe umbratica	Belkasta razcepljenka
175.	Inonotus nodulosus	Grčavi luknjač
176.	Kretzschmaria deusta	Črneča ožganka
177.	Laccaria laccata	Rdečkasta bledivka
178.	Lacrymaria lacrymabunda	Kosmati črnivec
179.	Lactarius acerrimus	Kratkobetna mlečnica
180.	Lactarius deterrimus	Smrekova sirovka
181.	Lactarius evosmus	Vonjava mlečnica
182.	Lactarius pyrogalus	Leskina mlečnica
183.	Lactarius uvidus	Sluzasta mlečnica
184.	Lactarius zonarius	Kolobarčasta mlečnica
185.	Lentinellus ursinus	Medvedja žilavka
186.	Lenzites betulina	Brezova lenzovka
187.	Lepiota castanea	Kostanjasti dežnik
188.	Lepiota cristata	Smrdljivi dežniček
189.	Lepiota cristatoides	Zoprni dežniček
190.	Lepiota josserandii	Parkovni dežniček

191.	<i>Lepiota oreadiformis</i>	Gladki dežniček
192.	<i>Lepista glaucocana</i>	Bledovijolična kolesnica
193.	<i>Lepista nuda</i>	Vijoličasta kolesnica
194.	<i>Lepista ricekii</i>	Poprova kolesnica
195.	<i>Lepista sordida</i>	Umazana kolesnica
196.	<i>Lycogala epidendrum</i>	Razbarvana grahovka
197.	<i>Lycoperdon perlatum</i>	Betičasta prašnica
198.	<i>Lycoperdon pratense</i>	Travniška prašnica
199.	<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Hruškasta prašnica
200.	<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Iglična prašnica
201.	<i>Lyophyllum connatum</i>	Beli zajček
202.	<i>Lyophyllum decastes</i>	Rjavi zajček
203.	<i>Lyophyllum fumosum</i>	Sivi zajček
204.	<i>Lyophyllum immundum</i>	Umazani zajček
205.	<i>Lyophyllum loricatum</i>	Trdokožni zajček
206.	<i>Marasmius anomalus</i>	Nepravilna sehlica
207.	<i>Marasmius cohaerens</i>	Trdobetna sehlica
208.	<i>Marasmius torquescens</i>	Volčičja sehlica
209.	<i>Marasmius wynnei</i>	Vijoličasta sehlica
210.	<i>Megacollybia platyphylla</i>	Širokolistna velekokorenovka
211.	<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Črtasta gostolistka
212.	<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Navadna gostolistka
213.	<i>Melanoleuca pseudoluscina</i>	Ozkobetna gostolistka
214.	<i>Melanophyllum haematospermum</i>	Bodičasta temnolistka
215.	<i>Melogramma spiniferum</i>	Bukova trgača
216.	<i>Meripilus giganteus</i>	Črneča velezraščenka
217.	<i>Merulius tremellosus</i>	Drhtavi zgubanec
218.	<i>Mollisia cinerea</i>	Sivkasta lončevka
219.	<i>Morchella esculenta</i>	Užitni smrček
220.	<i>Mycena acicula</i>	Bucikasta čeladica
221.	<i>Mycena aetites</i>	Sivorjava čeladica
222.	<i>Mycena capillaripes</i>	Lasastobetna čeladica
223.	<i>Mycena crocata</i>	Žoltosočna čeladica
224.	<i>Mycena flos-nivium</i>	Ivjebetna čeladica
225.	<i>Mycena galericulata</i>	Nagubana čeladica
226.	<i>Mycena galopus</i>	Mlečna čeladica
227.	<i>Mycena haematopus</i>	Krvobetna čeladica
228.	<i>Mycena olida</i>	Skorjina čeladica
229.	<i>Mycena pura</i>	Radkvičasta čeladica
230.	<i>Mycena renati</i>	Renejeva čeladica

231.	<i>Mycena rosea</i>	Strupena čeladica
232.	<i>Mycena vulgaris</i>	Navadna čeladica
233.	<i>Mycena zephirus</i>	Zefirna čeladica
234.	<i>Mycenitis alliaceus</i>	Dolgobetna česnovka
235.	<i>Mycoacia uda</i>	Rumena iglovka
236.	<i>Nectria cinnabarina</i>	Cinobраста bradavička
237.	<i>Oudemansiella hygrophoroides</i>	Belkasta širokolistka
238.	<i>Panaeolina foenisecii</i>	Košenična govňarka
239.	<i>Panaeolus acuminatus</i>	Koničasti govňar
240.	<i>Panaeolus fimicola</i>	Gnojliščni govňar
241.	<i>Panaeolus papilionaceus</i>	Pisani govňar
242.	<i>Panellus mitis</i>	Mili zgručevac
243.	<i>Panellus stipticus</i>	Trpki zgručevac
244.	<i>Parasola conopilus</i>	Bombažnata črnilovka
245.	<i>Parasola plicatilis</i>	Zgubana črnilovka
246.	<i>Paxillus involutus</i>	Navadna podvihanka
247.	<i>Paxillus rubicundulus</i>	Jelševa podvihanka
248.	<i>Peniophora cinerea</i>	Siva opnovka
249.	<i>Peniophora incarnata</i>	Mesnordeča opnovka
250.	<i>Peniophora polygonia</i>	Trepetlikova opnovka
251.	<i>Peniophora quercina</i>	Hrastova opnovka
252.	<i>Peziza succosa</i>	Sočna skledica
253.	<i>Peziza varia</i>	Raznolična skledica
254.	<i>Peziza vesiculosa</i>	Mehurjasta skledica
255.	<i>Phellinus igniarius</i>	Vrbov plutač
256.	<i>Phellinus trivialis</i>	Navadni plutač
257.	<i>Pholiotina teneroides</i>	Žlebičasti luskinček
258.	<i>Pleurotus ostreatus</i>	Bukov ostrigar
259.	<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Poletni ostrigar
260.	<i>Pluteus aurantiorugosus</i>	Prelestna ščitovka
261.	<i>Pluteus boudieri</i>	Čebulasta ščitovka
262.	<i>Pluteus cervinus</i>	Jelenova ščitovka
263.	<i>Pluteus ephebeus</i>	Žametasta ščitovka
264.	<i>Pluteus exiguus</i>	Drobcena ščitovka
265.	<i>Pluteus nanus</i>	Pritlikava ščitovka
266.	<i>Pluteus pellitus</i>	Bela ščitovka
267.	<i>Pluteus plautus</i>	Zrničasta ščitovka
268.	<i>Pluteus romellii</i>	Romellova ščitovka
269.	<i>Pluteus thomsonii</i>	Thomsonova ščitovka
270.	<i>Polyporus arcularius</i>	Rombasti luknjičar

271.	<i>Polyporus brumalis</i>	Zimski luknjičar
272.	<i>Polyporus ciliatus</i>	Ščetinasti luknjičar
273.	<i>Polyporus leptcephalus</i>	Raznolični luknjičar
274.	<i>Polyporus mori</i>	Satjasti luknjičar
275.	<i>Polyporus tuberaster</i>	Gomoljavi luknjičar
276.	<i>Postia caesia</i>	Modri skutovec
277.	<i>Postia fragilis</i>	Krhki skutovec
278.	<i>Postia stiptica</i>	Trpki skutovec
279.	<i>Postia subcaesia</i>	Modrikasti skutovec
280.	<i>Psathyrella atomata</i>	Sloka črnivka
281.	<i>Psathyrella bipellis</i>	Vinskordeča črnivka
282.	<i>Psathyrella candolleana</i>	Zbledela črnivka
283.	<i>Psathyrella corrugis</i>	Ljubka črnivka
284.	<i>Psathyrella leucotephra</i>	Dimastolistna črnivka
285.	<i>Psathyrella multipedata</i>	Stonoga črnivka
286.	<i>Psathyrella spadiceogrisea</i>	Sivorjava črnivka
287.	<i>Psilocybe caerulipes</i>	Modrobetna gologlavka
288.	<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i>	Žaltava korenarka, roženosiva oblika
289.	<i>Rhodocollybia maculata</i>	Pegasta korenarka
290.	<i>Rhodocollybia proluxa</i> var. <i>distorta</i>	Spotegnjena korenarka, zasukani razl.
291.	<i>Rhodocybe gemina</i>	Zvegana rusoglavka
292.	<i>Rickenella swartzii</i>	Dvobarvna mahoživka
293.	<i>Rugosomyces ionides</i>	Modrikasti lepoglavec
294.	<i>Russula amoena</i>	Vabljiva golobica
295.	<i>Russula amoenolens</i>	Vonjava golobica
296.	<i>Russula cessans</i>	Bukova golobica
297.	<i>Russula chloroides</i>	Ozkolistna golobica
298.	<i>Russula delica</i>	Modrolistna golobica
299.	<i>Russula exalbicans</i>	Razbarvana golobica
300.	<i>Russula foetens</i>	Smrdljiva golobica
301.	<i>Russula galochroa</i>	Mlečnobela golobica
302.	<i>Russula heterophylla</i>	Rjavozelena golobica
303.	<i>Russula nigricans</i>	Črneča golobica
304.	<i>Russula nobilis</i>	Baržunasta golobica
305.	<i>Russula pectinata</i>	Grebenasta golobica
306.	<i>Russula pectinatoides</i>	Rjavobetna golobica
307.	<i>Russula romelli</i>	Malinova golobica
308.	<i>Russula solaris</i>	Sončna golobica
309.	<i>Sarcomyxa serotina</i>	Pozna zgručevka
310.	<i>Sarcoscypha coccinea</i>	Škrlatna čašica

311.	Schizophora paradoxa	Nenavadna razporka
312.	Schizophyllum commune	Navadna cepilistka
313.	Scleroderma verrucosum	Bradavičasta trdokožnica
314.	Skeletocutis amorphia	Brezlična kostenelka
315.	Stereum gausapatum	Kosmata slojevka
316.	Stereum hirsutum	Dlakava slojevka
317.	Stereum subtomentosum	Žametasta slojevka
318.	Strobilurus esculentus	Smrekova storževka
319.	Strobilurus stephanocystis	Ovenčana storževka
320.	Strobilurus tenacellus	Grenka storževka
321.	Stropharia aeruginosa	Zelenkasta strniščnica
322.	Suillus granulatus	Ovčarska lupljivka
323.	Tarzetta catinus	Čašasta torilka
324.	Tephrocybe atrata	Očrnjena sivolistka
325.	Tephrocybe palustris	Barjanska sivolistka
326.	Thelephora anthocephala	Cvetoča roža
327.	Thelephora caryophyllea	Nageljnasta roža
328.	Thelephora penicillata	Čopičasta roža
329.	Trametes cervina	Rjaveča ploskocevka
330.	Trametes gibbosa	Grbasta ploskocevka
331.	Trametes hirsuta	Kosmata ploskocevka
332.	Trametes ochracea	Kolobarčasta ploskocevka
333.	Trametes pubescens	Puhasta ploskocevka
334.	Trametes suaveolens	Vrbova ploskocevka
335.	Trametes versicolor	Pisana ploskocevka
336.	Tremella foliacea	Listasta drhtavka
337.	Tremella mesenterica	Rumena drhtavka
338.	Trichaptum bifforme	Papirasta apnenka
339.	Tricholoma myomyces	Kraška kolobarnica
340.	Tricholoma orirubens	Žarolistna kolobarnica
341.	Tricholoma pardinum	Pegasta kolobarnica
342.	Tricholoma scalpturatum	Rumeneča kolobarnica
343.	Tricholoma terreum	Prstena kolobarnica
344.	Tricholomopsis rutilans	Rdečkasta trhlenka
345.	Tubaria furfuracea	Svetloroba trobljica
346.	Tubaria hiemalis	Zimska trobljica
347.	Tubaria praestans	Velika trobljica
348.	Volvariella gloiocephala	Velika nožničarka
349.	Xerocomellus chrysenteron	Rdečebetni polstenec
350.	Xerocomellus rubellus	Rdeči polstenec

351.	<i>Xerula radicata</i>	Zaviti širokolistar
352.	<i>Xylaria hypoxylon</i>	Vitka lesenjača
353.	<i>Xylaria longipes</i>	Dolgobetna lesenjača
354.	<i>Xylaria polymorpha</i>	Kopučasta lesenjača

V nadaljevanju so vse vrste gliv iz zgornjega seznama opisane in prikazane:

- z avtorskimi fotografijami članov Gobarskega društva Lisička Maribor,
- s fotografijami s spletne strani Gobarskega društva Lisička Maribor in
- s fotografijami iz drugih spletnih virov, ki so navedeni pri literaturi in virih informacij.

Fotografijam smo dodali tudi krajše opise gliv. Več podatkov o opisanih vrstah gliv je mogoče dobiti na spletni strani društva, www.gobe.si.

PREGLED VRST GLIV

Obrazložitev za opise različnih vrst gliv – primer:

OPIS GLIVE:

Velikoluska mušnica


Amanita strobiliformis

(Paulet ex Vittad.) Bertill. (1866)

POMEN:

Slovensko dvotirno (binarno) ime določene vrste glive (vrsta in rod)

Latinsko dvotirno (binarno) ime določene vrste glive z navedbo avtorja(ev) in letnico opisa (latinska imena gliv so posodobljena z mednarodno podatkovno bazo gliv, Index Fungorum, v času priprave brošure)



Zeleno osenčene rimske številke označujejo mesece rasti določene vrste glive

mušničarke (Amanitaceae)

Z, RS

mušničarke – terminološka označba družine za določeno vrsto glive

Z – zavarovana vrsta glive

RS – gliva iz rdečega seznama gliv Slovenije

belkasta goba z rombasto oblikovanimi luskami na sprva poloblem in kasneje na sploščenem klobuku. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrosnica, trosi so na belih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Kratek opis glive in mesta najdbe

Popis: 2016

Leto popisa določene vrste glive

1

Odsekani kukmak*Agaricus essettei* Bon (1983)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

bela goba ima sprva jajčasto zvonast in kasneje razprt klobuk, dnišče beta pa je značilno zadebeljeno in ravno odsekano. Saprofit in prostotrosnica s sprva belimi in nato črnimi trosi na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

2

Moellerjev kukmak*Agaricus moelleri* Wasser (1976)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima polkroglast klobuk s sploščenim temenom, kasneje je izbočen in prekrit s rjavimi luskami, bet je bel. Saprofit in prostotrosnica, trosi se nahajajo na sprva rožnatih in kasneje na črno rjavih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

3

Pritlikavi kukmak*Agaricus semotus* Fr. (1863)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

zelo majhna goba z rožnatim izbočenim klobukom in z bledo rumenim betom. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na sprva sivo rožnatih in kasneje na sivo črnih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

4

Hostni kukmak*Agaricus sylvicola* (Vittad.) Peck (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

bela goba s sploščenim temenom na klobuku in z dolgim pogosto ukrivljenim belim betom. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na rožnatih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

5

Citronasta mušnica*Amanita citrina* (Schaeff.) Pers. (1797)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

skoraj v celoti citronasto rumena goba s sprva polkrožnim in kasneje z razprtim klobukom, pokritim s hrapavimi ostanki ovojnice, ima obroček na betu. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

6

Panterjeva mušnica*Amanita pantherina* (DC.) Krombh. (1846)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

goba je sprva bela kepica, obdana s krhko lupino, ki pri nadaljnji rasti razpoka v drobne krpice ali pike. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrosnica, trosi so na belih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



1



2



3



4



5



6

7

Zelena mušnica*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link
(1833)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mušničarke (*Amanitaceae*)

goba ima sprva polkroglast in nato zravnana klobuk zelenkaste barve ter beli bet, ki ima viseč beli obroček. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrošnica, troši so na belih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

8

Velikoluska mušnica*Amanita strobiliformis* (Paulet ex Vittad.) Bertill. (1866)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mušničarke (*Amanitaceae*) **Z, RS**

belkasta goba z rombasto oblikovanimi luskami na sprva poloblem in kasneje na sploščenem klobuku. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrošnica, troši so na belih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

9

Sivi lupinar*Amanita vaginata* (Bull.) Vittad. (1783)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mušničarke (*Amanitaceae*)

goba s sprva zvonastim in kasneje razprtim sivim klobukom ter belkastim betom, ki nima obročka. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrošnica, troši so na belih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

10

Skorjina trhljica*Antrodia ramentacea* (Berk. & Broome) Donk (1966)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kresilače (*Fomitopsidaceae*)

beli trosnjak z luknjičasto trosovnico na površini raste kot tanka trda plast na skorji dreves. Saprofit in prostotrošnica, ki uspeva na odpadlih iglavcih, troši so na površini gobe. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2015

11

Dišeča trhlička*Antrodiella fragrans* (A. David & Tortic) A. David & Tortic (1986)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mrenarke (*Phanerochaetaceae*) **RS**

okrasta goba je poličasto rastoča luknjičarka z izrazitim vonjem po kumarinu. Parazit in prostotrošnica, ki uspeva na listavcih in povzroča belo trohnobo, troši so na luknjicah pod klobukom. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2017

12

Bukova trhlička*Antrodiella hoehnelii* (Bres.) Niemelä (1982)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mrenarke (*Phanerochaetaceae*)

belkasta goba konzolne in polokrogle oblike, ki raste na lesu in povzroča belo trohnobo. Parazit in prostotrošnica, ki raste na listavcih, troši so na spodnjem delu klobuka. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2017



7



8



9



10



11



12

13

Slojevita trhlička*Antrodiella semisupina* (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden (1980)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mrenarke (*Phanerochaetaceae*)

rjava goba pahljačaste ali školjčaste oblike, ki na lesu povzroča belo trohno. Parazit in prostotrošnica, ki uspeva na listavcih in včasih tudi iglavcih, troši so na spodnji strani klobuka. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

14

Severnjaška mraznica*Armillaria borealis* Marxm. & Korhonen (1982)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

šopasto rastoča goba na drevesih s sprva polkroglastimi in kasneje izbočenimi rjavimi klobuki z luskami ter z okrastimi beti. Saprofit in tudi parazit, prostotrošnica, troši se nahajajo na okrastih lističih pod klobuki. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

15

Čebulasta mraznica*Armillaria cepistipes* Velen. (1920)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

šopasto rastoča goba z rjavimi klobuki in luskami ter s čebulasto zadebeljenim dniščem, na svetlejših betih so obročki. Saprofit in parazit, prostotrošnica, ki raste na listavcih, troši so na belkastih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

16

Rumenovenčna mraznica*Armillaria gallica* Marxm. & Romagn. (1987)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

šopasto rastoča goba z rjavimi klobuki in obročki oz. venci rumene barve na rjavih betih. Saprofit in parazit, ki raste na štorih listavcev in iglavcev, prostotrošnica, troši so na rjavih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

17

Sivorumena mraznica*Armillaria mellea* (Vahl) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

šopasto rastoča goba sivorumene barve z luskami na klobukih in z beti z obročki. Saprofit in parazit z listavci ali iglavci in prostotrošnica, troši so na sprva belih in kasneje rjavkastih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

18

Črnomekinasta mraznica*Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink (1973)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

šopasto rastoča goba z rjavkastimi klobuki in z luskami ter z belkastimi obročki z rjavo obrobo na betih. Saprofit in parazit, ki raste na listavcih in iglavcih, prostotrošnica, troši so na rjavkastih lističih pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2016



13



14



15



16



17



18

19

Cvetoča grmulja*Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich (1982)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

žličarke (*Auriscalpiaceae*)**RS**

lesna goba z grivastim trosnjakom okrase barve in z vejami ter z vršički v obliki dvignjene odprte dlani rok. Saprofit in prostotrosnica, troši so na površini vejic. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2017

21

Voskasta čeladka*Antheniella flavoalba* (Fr.) Redhead (2012)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

majhna gobica s stožčasto izbočenim svetlo rumenim klobukom z voskasto površino ter z dolgim in tankim betom. Saprofit in prostotrosnica, troši so na belih lističih, ki so pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

23

Bezgova uhljevka*Auricularia auricula-judae* (Bull.) Quél. (1886)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

uhljarke (*Auriculariaceae*)

ušesu podobna rjava goba z želatinasto tresočo strukturo raste na bezgih in ima žilavo ter prožno meso. Saprofit in parazit na listavcu in prostotrosnica, troši so na celotni notranji strani trosnjaka. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2013

20

Mesnata želatinka*Ascocoryne sarcoides* (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson (1967)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pecljarke (*Helotiaceae*)

želatinasta goba vijolično-rjavkaste barve raste na odmrlih delih listavcev. Trosnjak je udrt in ima kratek bet. Saprofit in zaprtotrosnica, troši se nahajajo na površini gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2017

22

Žafranasti zlatoluknjičar*Aurantiorporus croceus* (Pers.) Donk (1933)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (*Coriolaceae*)

goba nepravilnih oblik z žafranasto-oranžno barvo raste konzolno vpeta na odmrlem lesu listavcev in ima luknjičasto strukturo, luknjice so zlate barve, beta nima. Saprofit in prostotrosnica, troši so v luknjicah pod klobukom. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014

24

Brestova uhljevka*Auricularia mesenterica* (Dicks.) Pers. (1822)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

uhljarke (*Auriculariaceae*)

ušesu podobna sivo rjava goba z elastično strukturo in zelo kratkim betom. Saprofit ali parazit, ki raste na brestih in na drugih listavcih, prostotrosnica, troši so na spodnji strani trosnjaka. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2013



19



20



21



22



23



24

25

Navadna žlička*Auriscalpium vulgare* Gray (1821)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

žličarke (*Auriscalpiaceae*)

majhna rjavkasta gobica ima klobuk žličaste oblike in dolg tanek bet, raste pa na borovih storžih. Saprofit in prostotrošnica, troši so na bodičasti trosovnici, ki je pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

27

Osmojena bjerkandera*Bjerkandera adusta* (Willd.) P. Karst. (1879)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

bjerkanderke (*Bjerkanderaceae*)

goba pepelnato sive barve raste kot pahljača na odmrlih delih listavcev in nima beta. Saprofit in prostotrošnica, troši so v luknjičasti trosovnici na spodnji strani. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2013

29

Leponogi goban*Boletus calopus* Pers. (1801)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

cevarke (*Boletaceae*)

mesnata goba s sivo-rjavim klobukom in z betom, ki je na vrhu rumen, navzdol pa ima rdečkasto mrežico. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrošnica, troši so na rumenkastih cevkah pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

26

Rumena dvotroska*Bisporella citrina* (Batsch) Korf & S.E. Carp. (1974)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pecljarke (*Helotiaceae*)

majhne rumene gobice imajo klobuček v obliki skodelice in zelo majhen bet, raste pa na lesu listavcev. Saprofit in zaprtotrošnica, troši se nahajajo na konkavni oz. vbočeni površini trosnjaka. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2013

28

Čokata bjerkandera*Bjerkandera fumosa* (Pers.) P. Karst. (1879)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

bjerkanderke (*Bjerkanderaceae*)

čokata goba konzolaste oblike je sivo rjavkasta in nima beta. Saprofit in parazit predvsem na vrbah, prostotrošnica, troši so v fino luknjičasti belkasti trosovnici na spodnji strani. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

30

Svinjski goban*Boletus luridus* Schaeff. (1774)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

cevarke (*Boletaceae*)

goba z rjavim žametastim klobukom in z oranžno-rjavim betom. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrošnica, troši so na oranžno-rdečih cevkah pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2017



25



26



27



28



29



30

31

Spreminjavi goban*Boletus pulverulentus* Opat. (1836)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

cevarke (*Boletaceae*)

goba z žametastim klobukom tobačno rjave barve in rjavo-rdečkastim betom. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na rumenih cevkah oziroma luknjicah pod klobukom. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

32

Poletni goban*Boletus reticulatus* Schaeff. (1774)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

cevarke (*Boletaceae*)

goba z žametastim klobukom svetlo rjave barve in s svetlo rjavim betom z rjavo mrežico. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na beli luknjičasti trosovnici pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2013

33

Mali kadilček*Bovista dermoxantha* (Vittad.) De Toni (1888)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

prašničarke (*Lycoperdaceae*)

majhna belkasta in okrogla gobica raste na travnikih in pašnikih. Mikorizna vrsta in prostotrošnica, troši so v celotni notranjosti gobe, trosnjak je sprva bel, končno pa se spremeni v rjavi prah. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

34

Olivna žoltotroska*Callistosporium olivascens* (Boud.) Bon (1976)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba ima svetlo rjavkast klobuk z olivno zelenkastimi odtenki in rjavkast bet, ki raste skupinsko. Mikorizna vrsta z iglavci in prostotrošnica, troši so na rumeno-rjavih lističih pod zravnanim klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

35

Rogasti rožički*Calocera cornea* (Batsch) Fr. (1827)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

solzarke (*Dacryomycetaceae*)

oranžno-rumeni trosnjak je zelo podoben pokončnim debelim iglicam, majhni rogci na koncih pa so proti vrhu zašiljeni. Saprofitna goba, ki raste na listavcih in prostotrošnica, troši so na zunanji površini zgornjih delov vitkih in pokončnih rožičkov. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2017

36

Majniška lepoglavka*Calocybe gambosa* (Fr.) Donk (1962)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

spomladi rastoča goba z belim ali rjavim klobukom in belim betom je zelo podobna kolobarnicam. Saprofit, ki raste na travnikih in pašnikih, prostotrošnica, troši so na belih gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



31



32



33



34



35



36

37

Paličasta hladetinka

Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr. (1899)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sluzarke (*Ceratiomyxidae*)

Majhen snežnobel in rogato razvejen trosnjak raste največ na štorih. Trosovnica je sluzasta. Spada med sluzavke oz. sluzaste vrste plesni. Trosi nastajajo na površini trosnjaka. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2013

38

Pepelasti zvitoluknjičar

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill (1903)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

trosnjak pepelnate barve je na robovih valovito pahljačaste oblike in priraščen na drevesne veje ali na debla. Saprofit in prostotrosnica, ki ima trose v luknjičasti trosovnici na spodnjem delu. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2017

39

Orošeni nogavičar

Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk (1962)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima sprva izbočen in kasneje razširjen klobuk blede rumenkaste barve, bet pa ima nogavičarsko prevleko in kapljice ter belo zastiralce. Saprofit in prostotrosnica, troši so na belih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

40

Zelenkasti zelenivec

Chlorociboria aeruginascens (Oeder) Seaver ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra (1958)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

pecljarke (*Helotiaceae*)

majhne gobice modrozelenih barv imajo obliko skodelice in pecljast bet. Saprofit in prostotrosnica raste na ostankih hrastovih dreves, troši so na površini pod klobukom. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014

41

Bakrenasti polžar

Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. (1964)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

slinarke (*Gomphidiaceae*)

goba ima gladki klobuk bakrenorjave barve in bet iste barve. Mikorizna vrsta z iglavci in prostotrosnica, troši so na debelih lističih okrašto rožnate barve pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2016

42

Želodov kelihovc

Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. (1947)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

pecljarke (*Helotiaceae*)

majhne gobice cimetasto rjave barve imajo obliko keliha in voskasto notranjo stran ter črn tanek bet. Saprofit, ki raste na odpadlih hrastovih želodih, zaprtotrosnica, troši so na rjavi zunanji skledasti strani klubuka. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014



37



38



39



40



41



42

43

Grebenasta grivača*Clavulina coralloides* (L.) J. Schröt. (1888)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kijarke (*Clavariaceae*)

trošnjak sivobelkaste barve je grmičasto zraščen, vejice pa rastejo iz skupnega beta in se na vrhu sploščijo ali pa nazobčajo. Saprofit in prostotrosnica raste v iglastih in listnatih gozdovih na tleh, troši nastajajo na vrhu vejic. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

44

Severnjaška poroznica*Climacocystis borealis* (Fr.) Kotl. & Pouzar (1958)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

bjerkanderke (*Bjerkanderaceae*)

lesna goba bele do okraسته barve raste konzolno vpeta na iglavcih in je porozna. Parazit in prostotrosnica, troši se nahajajo na spodnji strani belkastega trošnjaka v labirintasto razporejenih luknjicah. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

45

Vlažnoroba livka*Clitocybe angustissima* (Lasch) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

bela goba z lijasto oblikovanim klobukom in značilnim vlažnim robom ter sivo okrastim betom raste v listnatih in tudi v iglastih gozdovih. Saprofit in prostotrosnica, troši so na belih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

46

Vrtnarska livka*Clitocybe augeana* (Mont.) Sacc. (1887)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

bela goba z lijasto obliko klobuka in belim betom raste strnjeno predvsem na vrtovih. Saprofit in prostotrosnica, troši so na belih gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

47

Pobeljena livka*Clitocybe dealbata* (Sowerby) Gillet (1874)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

povsem bela goba z lijastim klobukom, ki ima valovit rob in močan vonj po moki. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v travi pod različnim drevjem, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

48

Rjavkasta livka*Clitocybe gibba* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba z usnjeno rjavim lijastim klobukom in z blede rjavim betom. Saprofit, ki raste v bližini iglavcev, prostotrosnica, troši so na belih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



43



44



45



46



47



48

49

Janeževa livka*Clitocybe odora* (Bull.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba ima modrikasto do zelenkasto siv
lijasti klobuk in svetlejši bet ter močno
diši po janežu. Saprofit in prostotrosnica,
troši se nahajajo na belih lističih pod
klobukom. Najdena na srednjem delu
Otoka.

Popis: 2017

51

Navadna mokarica*Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm.
(1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

sivkasta goba ima razširjen klobuk z
močno podvitim robom in belkastim
betom ter močno diši po moki. Mikorizna
vrsta z listavci in iglavci, prostotrosnica,
troši so na rdečkastih lističih pod
klobukom. Najdena na vzhodnem delu
Otoka.

Popis: 2016

53

Razsejani tintovec*Coprinellus disseminatus* (Pers.) J.E.
Lange (1938)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

tintarke (*Coprinaceae*)

gobice imajo belkaste do sivkaste klobučke
in bete ter rastejo razsejano v skupinah
na štorih. Saprofit in prostotrosnica, troši
se nahajajo na počrnelih lističih pod
klobukom in se ne utekočinijo. Najdena na
srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

50

Vodenasta livka*Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper
(1981)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

sivorjava goba ima lijast klobuk vodenega
izgleda in okraštostiv bet, ki je korenasto
zaključen. Saprofit in prostotrosnica, troši
so na okraštostivih lističih pod klobukom.
Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

52

Drobna mokarica*Clitopilus scyphoides* (Fr.) Singer (1946)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

drobna bela gobica z vodeno rožnatimi
odtenki in belkastim betom močno diši
po moki. Mikorizna vrsta z listavci ali
iglavci in prostotrosnica, troši so na
rožnatih lističih pod klobukom. Najdena
na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2014

54

Minljivi tintovec*Coprinellus ephemerus* (Bull.) Redhead,
Vilgalys & Moncalvo (2001)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima cimetasto rjav klobuk
jajčaste oblike in belkast bet, raste pa
v skupinah in je kratkega veka. Saprofit
in prostotrosnica, troši so na rjavih in
kasneje črnih lističih pod klobukom.
Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017



49



50



51



52



53



54

55

Sljudnati tintovec*Coprinellus micaceus* (Bull.) Vilgalys (2001)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

gobice rastejo šopasto in imajo stožčaste klobuke z barvo sljudnate gline ter bel bet. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na odmrlem lesu, trosi so na sprva belih in kasneje črnih lističih, ki so pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

56

Prava tintovka*Coprinopsis atramentaria* (Bull.) Redhead (2001)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima sivjajčast klobuk in bel bet, raste pa v velikih šopih na ostankih lesa, vrtovih in parkih. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na sprva belih in kasneje črnih lističih pod klobukom, ki se utekočinijo. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

57

Plišasta tintovka*Coprinopsis lagopus* (Fr.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima kosmato plišast klobuk, ki je sprva bel in kasneje siv do rjav ter dolg bel bet. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na sprva belih in kasneje črnih lističih pod klobukom, ki se črno utekočinijo. Raste na gozdnem odpadu. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

58

Pisana tintovka*Coprinopsis picacea* (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)**RS**

goba z belimi zaplatami na rjavem klobuku zvonaste oblike ima pisan videz, bel bet pa ima luskice. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na bogatih tleh vseh gozdov, trosi so na sprva belih in kasneje črnečih lističih pod klobukom, ki se utekočinijo. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

59

Velika tintnica*Coprinus comatus* (O.F. Müll.) Pers. (1797)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima bel jajčasto podolgovat klobuk z luskami in dolg bel bet, raste pa na bogatih organsko polnih tleh, vrtovih in parkih. Saprofit in prostotrosnica, trosi se nahajajo na črnih lističih, ki se utekočinijo. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

60

Veneča tintnica*Coprinus impatiens* (Fr.) Quél. (1888)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

hitro veneča gobica ima sprva oranžno-rjav klobuk konusne oblike, kasneje pa izbočen in sivo-bež barve, bet je bel, raste na trdem lesu. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na sivih lističih pod klobukom, ki ne počrni. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



55



56



57



58



59



60

61

Oglatotrosna tintnica*Coprinus marculentus* Britzelm. (1893)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima lešnikovo-rjav klobuk, ki je sprva pokončno valjaste oblike in nato zvonast, bet pa je dolg in rjavkast. Saprofit raste na mešanici slame in gnoja, je prostotrosnica, oglati trosi pa so na črnečih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

62

Gozdna tintnica*Coprinus silvaticus* Peck (1872)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

gobica ima sprva koničast in nato zvončast rjav klobuk in dolg bel do rumeno-rjav bet. Saprofit in prostotrosnica, raste na gozdnih tleh, kjer se razkrajajo les, trosi so na črnečih gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

63

Nepravilna koprenka*Cortinarius anomalus* (Fr.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima izbočen klobuk, ki je v vlagi modro siv, v suhem pa rjavo bež barve, bet je pasast, koprena pa bela in hitro minljiva. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, raste v listnatih gozdovih, trosi so na cimetastorjavih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

64

Sladkobna koprenka*Cortinarius anserinus* (Velen.) Rob. Henry (1986)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba z rumeno rjavkastim klobukom ima sladkoben vonj po slivah in okrašt bet, raste pa pod listavci, predvsem pod bukvijo. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, trosi so na glineno rjavih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

65

Goljufiva koprenka*Cortinarius decipiens* (Pers.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima koničasto strukturiran klobuk temno rjave barve, ki je masten in bet, ki je na vrhu srebrn, v dnišču pa rjav. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, raste ob mokriščih, trosi pa so na rjavih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

66

Zala koprenka*Cortinarius elegantissimus* Rob. Henry (1989)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima na obrobju oranžnega klobuka eleganten rumenkast pas, rumenkast bet pa ima ovoj barve prsti. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom, ki so sprva rumeni in nato rjavi. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017



61



62



63



64



65



66

67

Žareča koprenka *Cortinarius fulgens* Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima klobuk zlatorumene barve, ki kar žari in rumen bet, dnišče pa je gomoljasto. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom, ki so sprva rumeni in zatem rjastorjavi. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

69

Jelenčja koprenka *Cortinarius hinnuleus* Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima sprva koničast in kasneje izbočen oranžno-rjav klobuk in deloma bel do okrast bet. Mikorizna vrsta z listavci raste tudi v parkih, prostotrosnica, troši so na cimetasto okrastih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

71

Scefrana koprenka *Cortinarius infractus* (Pers.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima rjavkast klobuk spremenljivega ali scefranega videza in srebrno siv gomoljast bet. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrosnica, troši so na sajasto rjavih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

68

Kolobarniška koprenka *Cortinarius glaucopus* (Schaeff.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba raste v skupinah v kolobarjih in ima široko grbičast svetlorjav klobuk ter sivo moder do rjav gomoljast bet. Mikorizna vrsta z iglavci in prostotrosnica, troši so na sprva modrih in nato rjavih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

70

Razcepljena koprenka *Cortinarius incisus* (Pers.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

majhna goba ima cimetasto rjav klobuk, ki se na robu rad razcepi in svetlo rjav bet. Mikorizna vrsta z iglavci in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom, ki so najprej sivo-rjavi in kasneje cimetno rjavi. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

72

Škrlateča koprenka *Cortinarius purpurascens* Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima klobuk različnih barv, od datljevo rjave do rdeče rjave, stopničasto odebeljen bledovijoličast bet, na pritisnjenem mestu pa postane škrlatno rdeča. Mikorizna vrsta z iglavci in prostotrosnica, troši se nahajajo na vijoličnih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017



67



68



69



70



71



72

73 Škrlateča koprenka, kijasti različek

Cortinarius purpurascens var. *largosuides* Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima rjavkast klobuk, kijasto oblikovan bet sinjemode do vijolične barve, na dotik oz. na pritisnjenih delih pa postane škrlatno rdeče barve. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na gostih škrlatno vijoličastih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

75 Lužninska koprenka

Cortinarius sodagnitus Rob. Henry (1935)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima ime po reakciji s kalijevim lugom, kjer kožica klobuka pordeči. Klobuk je sprva vijoličast in kasneje modrikast, enako tudi bet. Mikorizna vrsta in prostotrošnica, ki raste pod listavci, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

77 Beneška koprenka

Cortinarius venetus (Fr.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima klobuk olivno-zelenkaste barve in tudi bet ter lističi so enake barve. Mikorizna vrsta z iglavci in prostotrošnica, raste pa skupinsko po več skupaj, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

74

Vrščajeva koprenka

Cortinarius rufo-olivaceus (Pers.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

mesnata goba ima vijoličasto-rjav klobuk in olivno-zelenkaste lističe, ki kasneje rjavijo, bet je svetlo vijoličast. Imenovana je po mikologu Dušanu Vrščaju. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

76 Gležnjasta koprenka

Cortinarius talus Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba je imenovana po gležnjastem betu, ima sprva okrasto rumen in kasneje rjavkast klobuk in okrasto rumen bet, ki kasneje rjavi. Mikorizna vrsta in prostotrošnica, ki raste pod listavci, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

78 Zdrizasta postrančica

Crepidotus mollis (Schaeff.) Staudé (1857)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

postrančarke (*Crepidotaceae*)

goba ima školjkast klobuk bele ali okraسته barve, pod površinsko kožico je zdrizasta plast, beta skoraj ni, ker je goba stransko priraščena na osnovo, to je na odpadni les listavcev. Saprofit in prostotrošnica, troši se nahajajo na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014



73



74



75



76



77



78

79

Raznolična postrančica*Crepidotus variabilis* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

postrančarke (*Crepidotaceae*)

bela gobica ima školjkast klobuk, ki je pripet stransko na osnovo, to je na vejah listavcev. Klobuk je lahko raznolik, lahko je zvonast ali ostrigast. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na sprva belih in kasneje na rahlo rožnatih lističih. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

80

Navadni lonček*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly (1936)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

gnezdarke (*Nidulariaceae*)

drobna gobica je podobna lončku ali gnezdu in je na zunanji strani rjavkasta, na notranji pa okraša, v njej pa so bele kroglice s trosi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na dračju ali odpadnih vejah, trosi so znotraj kroglic. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

81

Ploski skorjevec*Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Jülich (1974)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

skorjarke (*Physalacriaceae*)

goba je kot tanka ploska skorja razraščena na drevesni skorji in povzroča belo gnilobo. Saprofitna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrosnica, trosi so na površini gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014

82

Pahljačasti solzar*Dacrymyces palmatus* (Schwein.) Burt (1921)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

solzarke (*Dacrymycetaceae*)

živo rumeno-oranžna gobica ima pahljačasto obliko s številnimi vršički na konceh, začne pa rasti kot majhna pikica ali solzica. Saprofit in prostotrosnica, raste na odpadnih vejah iglavcev in listavcev, trosi so na površini gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

83

Kapljasti solzar*Dacrymyces stillatus* Nees (1816)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

solzarke (*Dacrymycetaceae*)

goba je živo rumeno-oranžna in ima obliko kapljice, začne pa rasti kot majhna solzica in nima beta. Saprofit in prostotrosnica, ki je želatinasta, raste na iglavcih, trosi pa se nahajajo na zgubani površini. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2017

84

Rdečecha zvitocevka*Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt. (1888)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

goba ima mlada sivo do rumeno površino, pozneje pa vse bolj rdeči in raste kot polica na odmrlem drevesu listavcev. Saprofit in prostotrosnica, trosi so v luknjicah oz. v zvutih cevkah pod površino. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014



79



80



81



82



83



84

85

Tribarvna zvitocevka*Daedaleopsis tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer (1941)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

na listavcih poličasto rastoča goba ima površino kolobarjasto in iz treh glavnih barv – cimetaste, rdečkaste in rdeče-rjave barve. Saprofit in prostotrosnica, trosi nastajajo v luknjicah oz. cevkah pod površino. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2013

86

Slojevita oglarka*Daldinia concentrica* (Bolton) Ces. & De Not. (1863)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pečkarice (*Pyrenomycetideae*)

skoraj kroglasta trda goba ima barvo in obliko oglja. Saprofit in zaprtotrosnica, ki raste na odmrlih listavcih, trosi so v votlinicah tik pod površjem večplastne oz. večslojne trosovnice. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

87

Navadni zvitorpor*Datronia mollis* (Sommerf.) Donk (1966)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (*Polyporaceae*)

žametast trosnjak je podoben ploskemu in nepravilnemu obližu okrase do rjave barve, ki raste na odpadlih listavcih. Saprofit in prostotrosnica, trosi so v luknjicah oz. porah na površini gobe, ki so zvite. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

88

Navadna belka*Delicatula integrella* (Pers.) Fayod (1889)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

majhne snežnobe gobice rastejo skupinsko na trohnečih štorih in humusu, bet je visok in tanek. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na belih lističih pod klobukom. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

89

Ploščati predirnik*Diatrype stigma* (Hoffm.) Fr. (1849)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pečkarice (*Pyrenomycetideae*)

goba raste kot tanki ploščati obliž na vejah listavcev in predre vrhno plast skorje ali celo obkroži veje. Saprofit in zaprtotrosnica, trosi se nahajajo na površini trosnjaka. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2014

90

Hrastov blazinovec*Dichomitus campestris* (Quél.) Domanski & Orlicz (1966)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (*Polyporaceae*)

rjav trosnjak izgleda kot navzven obrnjena luknjičasta trosovnica, raste na hrastu in je blazinasto mehakter škodljiviec, ki povzroča belo gnilobo. Saprofit in prostotrosnica, trosi so v luknjicah. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



85



86



87



88



89



90

91

Gomoljasta zalogarica*Dumontinia tuberosa* (Bull.) L.M. Kohn
(1979)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

keliharke (*Sclerotiniaceae*)

rjava gobica ima skledasto oblikovan klobuk in dolg bet. Mikorizna vrsta z rožo podlesno vetrnico, s katero tvori gomoljasto tvorbo pod zemljo, zaprtotrošnica, troši so na gornji gladki površini klobuka. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

92

Hrapava trnovka*Echinoderma asperum* (Pers.) Bon (1991)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima na svetlorjavem klobuku ostre rjave trnaste luske, ki povzročajo hrapavost, bet je do obročka bel in dalje rjav, raste pa na rastlinskih ostankih med iglavci. Saprofit in prostotrošnica, troši so na belih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

93

Bodičasta trnovka*Echinoderma echinaceum* (J.E. Lange) Bon
(1991)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima na klobuku smetanaste barve ostre koncentrično razporejene rjave trne, bet pa je gosto vlaknast. Saprofit in prostotrošnica, ki raste v mešanem gozdu, troši so na sprva smetanastih in kasneje rjavkastih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

94

Čvrstoluska trnovka*Echinoderma hystrix* (F.H. Møller & J.E. Lange) Bon (1991)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima klobuk rumeno-rjave barve, na katerem so ostre in čvrste rjave luske oz. trni in tudi bet je poln trdih lusk ter ima obroček. Saprofit in prostotrošnica, troši so na belih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

95

Križnotrošna rdečelistka*Entoloma conferendum* (Britzelm.) Noordel. (1980)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

goba z rjavkastimi klobuki sprva zvončaste oblike in kasneje razširjeni ima dolg tanek bet. Saprofit in prostotrošnica, ki raste na travnikih in na gozdnih jasadah, rožnati troši imajo obliko križa in so na rdečkastih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

96

Nesomerna rdečelistka*Entoloma excentricum* Bres. (1881)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

goba ima bledorjav izbočen klobuk, ki je nesomerne oblike, dolg tanek bet in goste rdečkaste lističe. Saprofit in prostotrošnica, raste na travnikih in senožetih, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017



91



92



93



94



95



96

97

Modra rdečelistka*Entoloma nitidum* Quél. (1883)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

goba ima modrikast klobuk sprva zvonaste in nato izbočene oblike z grbo na osredju, tudi bet je moder, lističi pa so zreli rdečkasti. Saprofit in prostotrosnica, raste v iglastih in mešanih gozdovih, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

99

Nizka rdečelistka, smrdeča oblika*Entoloma rhodopolium* f. *nidorosum* (1989)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

goba nizke rasti ima svetlorjav klobuk z grbami, belkast bet in rdečkaste lističe ter neprijetno smrdi po dušiku, raste pa na vlažni travi v listnatih in mešanih gozdovih. Saprofit in prostotrosnica, trosi nastajajo na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

101

Šotiščna rdečelistka*Entoloma turbidum* (Fr.) Quél. (1872)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

goba ima kostanjevo rjav klobuk zvonaste do izbočene oblike, bet je tanek in sivorjav, lističi so rdečkasti, uspeva pa na šotiščih. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

98

Nizka rdečelistka*Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

goba nižje rasti od večine rdečelistk ima sivo rjav razprt klobuk z vdrfino na osredju, bel bet in rdečkaste lističe, raste pa na substratu v listnatem gozdu. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

100

Bleščeča rdečelistka*Entoloma sericeum* Quél. (1872)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

goba ima sijoč čokoladno rjav klobuk, bet je tanek in sivorjav, lističi pa so rdečkasti. Saprofit in prostotrosnica, raste na tratah in travnikih, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

102

Žlezasta zamazanka*Exidia glandulosa* (Bull.) Fr. (1822)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

drhtavkarke (*Tremellaceae*)

goba je umazano črna kot katran in povsem nagubana kot možgani in mehko želatinasta. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na golem odpadnem lesu listavcev, trosi so na površini gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2013



97



98



99



100



101



102

103

Bela lojevka*Exidiopsis calcea* K. Wells (1962)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

uhljarke (*Auriculariaceae*)

goba raste kot tanka bela skorja na drevesih in ima v mokrem stanju lojasto ali voskasto strukturo. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na odmrlih delih iglavcev in listavcev, troši so na zunanji površini gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

104

Zimska panjevka*Flammulina velutipes* (Curtis) Singer (1951)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

žametarke (*Dermolomataceae*)

goba uspeva v zimskem času, ima klobuk od rumene do rjave barve in kosmat bet, ki je sprva oranžno-okrast in kasneje črn. Saprofit in parazit, prostotrosnica, ki raste na panjih, štorih in deblih listavcev, troši so na lističih rumene barve pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2017

105

Bukova kresilka*Fomes fomentarius* (L.) J. Kickx f. (1867)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kresilače (*Fomitopsidaceae*)

goba poličaste in kopitaste oblike raste na bukvah in ima na trdi sivo-rjavi površini polkrožne koncentrične pasove. Agresivni parazit in prostotrosnica, troši se nahajajo v luknjicah svetlo lešnikove barve. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2013

106

Ploščati glivopor*Fomitiporia punctata* (P. Karst.) Murrill (1947)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

trošnjak ploščate in nepravilne oblike se razraste na drevesnih vejah in je rjav do rjasto rjav, na površini ima luknjice, spodnji del pa je olesenel ali plutast. Saprofit in nevaren parazit, prostotrosnica, troši so v luknjicah na površini trošnjaka. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

107

Hrastov glivopor*Fomitiporia robusta* (P. Karst.) Fiasson & Niemelä (1984)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

goba je trda in olesenela ali plutasta, raste priraščena na živih hrastih in je polkroglaste oblike ter rjava do sivo črna, na prerezu je žafranasto rjava in ima več slojev. Saprofit in nevaren parazit ter prostotrosnica, troši so v luknjicah. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

108

Smrekova kresilača*Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst. (1881)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kresilače (*Fomitopsidaceae*)

trda lesna goba je pisano obarvana in raste poličasto na smrekah, trosovnica pa je iz majhnih por rumeno-okraste barve. Saprofit in parazit, prostotrosnica, troši so v luknjicah v spodnjem delu. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014



103



104



105



106



107



108

109

Tankoroba nasršenka*Funalia gallica* (Fr.) Bondartsev & Singer (1941)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

goba raste pahljačasto na lesu, ima tobačno rjavo barvo in tanek rob iz gostih dlak, ki kot krtačasto nasršene štrlijo navzven. Saprofit in parazit, prostotrošnica, trosi se nahajajo v luknjicah v spodnjem delu gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

111

Četverokraka zvezdica*Geastrum quadrifidum* DC. ex Pers. (1801)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

zvezdarke (*Geastraceae*)

goba se imenuje po štirih krakih, v katere se zvezdasto razdeli zunanja ovojnica, potem ko zraste iz prvotne jajčaste oblike, ima okraško barvo. Saprofit in prostotrošnica, ki raste pod smrekami med iglicami, trosi so v notranjosti trosnjaka in puhajo skozi ustje. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

113

Sivorjava tramovka*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen) P. Karst. (1882)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

goba ima trd rjavkast klobuk polkrožne do pahljačaste oblike, beta pa nima. Saprofit in prostotrošnica, ki raste na odmrlih iglavcih in tramovih, trosi se nahajajo na žarkasto rastoči tvorbi debelih lističev na spodnji strani. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

110

Sploščena pološččenka*Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat. (1887)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pološčarke (*Ganodermataceae*)

goba je podobna sploščeni konzoli, ki raste na lesu listavcev in ima položčeno zgornjo površino rjave barve. Saprofit in parazit, prostotrošnica, trosi so v luknjicah oz. belih porah v spodnjem delu gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2013

112

Ovratniška zvezdica*Geastrum triplex* Jungh. (1840)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

zvezdarke (*Geastraceae*)

goba ima zvezdasto obliko razprtih krakov, okoli kroglaste ovojnice pa se nahaja nekaj mesnati ovratnik. Saprofit in prostotrošnica, trosi so v notranjosti rjavkaste kroglice in ob dozoretnju uhajajo iz vrhnje luknjice. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

114

Labirintasta tramovka*Gloeophyllum trabeum* (Pers.) Murrill (1908)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

goba ima pahljačasto obliko in labirintasto trosovnico, raste pa na tramovih in odmrlih drevesih. Saprofit in prostotrošnica, trosi pa so na labirintasto valovitih lističih na spodnji strani. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014



109



110



111



112



113



114

115

Veliki slinar*Gomphidius glutinosus* (Schaeff.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

slinarke (*Gomphidiaceae*)

goba ima močno slinast oz. sluzav klobuk in bet, klobuk je izbočen in blede rjav do sivo moder, bet pa bel. Mikorizna vrsta z iglavci in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2016

116

Pegasti slinar*Gomphidius maculatus* (Scop.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

slinarke (*Gomphidiaceae*)

goba ima slinast klobuk okrašto rjave barve s črnorjavimi pegami, belkast dolg bet pa je večinoma suh. Mikorizna vrsta z iglavci in prostotrosnica, trosi so na sprva belkastih in kasneje rjavih lističih pod udrtim klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2017

117

Hibridna plamenka*Gymnopilus hybridus* (Gillet) Maire (1933)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

postrančarke (*Crepidotaceae*)

goba ima klobuk svetleče rumeno-rjave barve kot plamen, bet je rjavkast in v dnišču bel. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na odmrlem lesu, trosi so na sprva rumenih in kasneje na kot klobuk obarvanih lističih pod klobukom. Najdena je na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

118

Junonina plamenka*Gymnopilus junonius* (Fr.) P.D. Orton (1960)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

postrančarke (*Crepidotaceae*)

goba ima sprva polkroglast rumeno-oranžni klobuk, ki je nato izbočen, majhne luske se bleščijo, lističi so zastrti zaradi podvitega roba klobuka, na betu pa je kožnat obroček. Saprofit in prostotrosnica, raste na odmrlih drevesih, trosi se nahajajo na rjavkastih lističih. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

119

Črni korenovec*Gymnopus alkalivirens* (Singer) Halling (1997)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima rjavo-črn klobuk in dolg tanek bet s kosmatim dniščem, raste pa na odmrlem lesu. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na rdečerjavih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

120

Zeljarski korenovec*Gymnopus brassicolens* (Romagn.) Antonín & Noordel. (1997)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima okrašto rjave klobuke, ki so sprva zvonasti in nato sploščeni, bet je tanek in temno rjav, lističi so beli, raste šopasto na vejah in listih listavcev ter smrdi po gnilem zelju. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



115



116



117



118



119



120

Smrdeči korenovec

121 *Gymnopus foetidus* (Sowerby) J.L. Mata & R.H. Petersen. (2004)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima sprva zvonasto izbočen in kmalu sploščen rjav klobuček, ki je na osredju udrt ter črn tanek bet, lističi so sivo rožnati, ima neprijeten vonj po plesnobi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na odpadlih vejah listavcev, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

Sehlični korenovec

123 *Gymnopus erythropus* (Pers.) Antonín (1997)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima rdeče-rjav klobuk in bet, lističi pa so belkasti. Podobna je gobicam *sehlicam*. Saprofit in prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom, raste pa na odpadnih delih dreves listavcev. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

Rjavi bledotrosnik

125 *Gyroporus castaneus* (Bull.) Quél. (1886)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

cevarke (*Boletaceae*)**RS**

goba z rjavim klobukom in rjavim betom je podobna *gobanu* in ima blede rumenkast trosni prah. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, troši so v belih luknjicah pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

Vitki korenovec

122 *Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill (1916)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima okrasto-rjav klobuk, rjav in vitek bet ter belkaste lističe, raste pa na starem ležečem listju. Saprofit in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

Smradni korenovec

124 *Gymnopus hariolorum* (Bull.) Antonín (1997)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima izbočen rjav klobuk in belkast bet, ki je proti dnišču volnat oz. kosmat. Saprofit in prostotrosnica, ki smrdi po gnilem zelju, raste na preperem bukovem listju, troši so na sprva belih in nato rjavkastih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

Solzeča medlenka

126 *Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Quél. (1872)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba z okrasto belim izbočenim klobukom in s spodvihanim robom, belim betom in s solzečimi lističi. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci, prostotrosnica, troši so na belih do rjavkastih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



121



122



123



124



125



126

127

Zimska medlenka*Hebeloma hiemale* Bres. (1892)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba uspeva tudi v zimskem času, ima blede rjav klobuk z roza odtenki, bel bet in sprva bele lističe, ki nato rjavijo. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci ter prostotrošnica, troši se nahajajo na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

128

Vrbina medlenka*Hebeloma leucosarx* P.D. Orton (1960)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima na osredju okrasto rjav klobuk in belo obrobje, bet je bel do okrast, lističi pa sprva beli in nato blede rjavkasti. Mikorizna vrsta z vrbami in prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

129

Dolgobetna medlenka*Hebeloma longicaudum* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima sprva blede okrast in nato rjav klobuk ter dolg blede okrast bet. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci v vlažnih gozdovih ter prostotrošnica, troši so na sprva belih in nato rjavih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

130

Dvobarvna medlenka*Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Quel. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima na površini klobuka dve barvni področji: rjasto rjavo osredje in belo rjavo obrobje, bet in lističi pa so rjavi. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci ter prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

131

Redkvičasta medlenka*Hebeloma sinapizans* (Paulet) Gillet (1876)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima okrasto rjav klobuk in okrast bet, ki star postane votel, značilen zanjo je vonj po redkvici. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci, prostotrošnica, troši so na rjavkastih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

132

Toporoba medlenka*Hebeloma vaccinum* Romagn. (1965)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima širok top rob na polkroglastem rdeče-rjavem klobuku in bel bet, ki je proti dnišču rjavkast. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na belkastih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



127



128



129



130



131



132

133

Luskobetna medlenka*Hebeloma versipelle* (Fr.) Gillet (1876)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima svetlo rjav klobuk z rdeče rjavim osredjem, belkast bet z luskami ter lističe bež barve. Mikorizna vrsta z listavci in z iglavci in prostotrošnica, troši se nahajajo na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

134

Jesenski loputar*Helvella crispa* (Scop.) Fr. (1822)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

loputarke (*Helvellaceae*)

goba ima močno zvegan loputast klobuk okrase barve in žilast belkast bet. Saprofit in zaprtotrošnica, ki raste na gozdnih tleh, troši so na zunanji površini loput, ki jih je od 2 do 4. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

135

Sedlasti loputar*Helvella ephippium* Lev. (1841)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

loputarke (*Helvellaceae*)

goba ima sedlasto obliko klobuka sivo rjave barve, pri čemer sedlo veže dve navzgor zavihani vzporedni loputi, bet je kremast in žilav. Saprofit in zaprtotrošnica, troši so na zunanji gladki površini loput. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

136

Bela polčeladica*Hemimycena cucullata* (Pers.) Singer (1961)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

belkasta gobica ima klobuček v obliki pol-čeladice in zelo dolg bel bet ter bele lističe. Saprofit in prostotrošnica, raste na koščkih lesa in listja v mešanih gozdovih, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

137

Smetanasta polčeladica*Hemimycena lactea* (Pers.) Singer (1938)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

drobcena gobica ima klobuček v obliki polčeladice in je smetanaste barve, bel bet pa je precej dolg. Saprofit in prostotrošnica, ki raste pod iglavci na koščkih lesa ali tudi na organskih odpadkih, troši so na belkastih gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

138

Jelov trohnoznež*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. (1888)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

goba rjasto rjave barve z belim robom ima obliko konzole, ponoči pa se sveti zaradi bioluminiscence, beta nima. Saprofit in zelo nevarni parazit in prostotrošnica, ki raste na iglavcih, najraje jelkah in povzroča trohno, troši pa se nahajajo v belih luknjicah na spodnji strani gobe. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014



133



134



135



136



137



138

139

Koničasta vlažnica*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

polžarke (*Hygrophoraceae*)

goba ima koničast klobuk oranžno rdečih barv in oranžno rumen do oranžno rjav bet. Saprofit ali mikorizna vrsta, ki raste na travnikih in pašnikih, prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

140

Gabrova polževka*Hygrophorus carpini* Gröger (1980)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

polžarke (*Hygrophoraceae*)

goba ima klobuk slonokoščene bele barve in rjavkasto osredje ter belkast bet in raste pod gabri. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, troši so na belih lističih pod klobukom. Najdena je na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

141

Prelčeva polževka*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

polžarke (*Hygrophoraceae*)

goba ima bel klobuk, ki sčasoma postane na robu rjasto rumen, bet in lističi so belkasti, smrdi pa po gosenci prelca. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

142

Bela polževka*Hygrophorus eburneus* (Bull.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

polžarke (*Hygrophoraceae*)

goba je povsem bela, sčasoma pa klobuk in bet postaneta okrašta, na betu so drobna zrnca. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci, prostotrosnica, troši so na belih lističih pod klobukom gobe. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

143

Pesniška polževka*Hygrophorus poetarum* R. Heim (1948)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

polžarke (*Hygrophoraceae*)

goba ima bel klobuk, ki je na osredju rdeče okrašt in na robu podvihan, bet in lističi pa so belkasti. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

144

Zgrbančena usnjevka*Hymenochaete corrugata* (Fr.) Lév. (1846)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

goba oz. trosnjak raste kot tanki sloj na lubju listnatih dreves in je rožnato-rjav do končno črn. Saprofit je veliki škodljivec in lahko zlepi vejice enega drevesa z vejami drugega, prostotrosnica, troši se nahajajo na površini. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014



139



140



141



142



143



144

145

Trdolesna usnjevka*Hymenochaete rubiginosa* (Dicks.) Lév. (1846)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

trda goba raste poličasto in skupinsko na lesu ter ima usnjato površino temno rjave barve. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na listavcih, troši so na spodnji kakavovo rjavi površini, kjer so tudi dlačice ali seti. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

147

Hrastova zobnica*Hyphodontia quercina* (Pers.) J. Erikss. (1958)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

razporarke (*Schizoporaceae*)

goba raste kot široka zaplata s pokončnimi kratkimi in ploskimi zobci na vejah hrastov in je smetanaste do okraسته barve. Saprofit in prostotrosnica raste na odpadlih delih listavcev, beli troši so na zunanji površini trosnjaka. Najdena je na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

149

Navadna žveplenjača, drobni razl.*Hypholoma fasciculare* var. *pusillum* J.E. Lange (1923)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

strniščarke (*Strophariaceae*)

goba je drobni različek prej opisane gobe, ima žvepleno rumen klobuček in rumen bet ter uspeva šopasto na štorih iglavcev in listavcev. Saprofit in prostotrosnica, troši so na sprva rumenih in nato črnečih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

146

Otočkasti strgalkar*Hyphoderma radula* (Fr.) Donk (1957)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

skorjarke (*Corticaceae*)

goba ima obliko majhnih otočkov in se kot tanka plast razraste na lubju listavcev, je belkasta in na osredju okraста. Saprofit in prostotrosnica, troši so na zunanji površini trosnjaka, ki je iz topih zobcev ali trnov. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

148

Navadna žveplenjača*Hypholoma fasciculare* (Huds.) Quél. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

strniščarke (*Strophariaceae*)

goba ima izbočen klobuk žvepleno rumenih barv in rjavo teme, dolg in ukrivljen rumen bet ter šopasto raste na štorih iglavcev in listavcev. Saprofit in prostotrosnica, troši so na rumeno zelenih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

150

Opečnata žveplenjača*Hypholoma sublateritium* (Schaeff.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

strniščarke (*Strophariaceae*)

goba ima polkrožen klobuk opečno rjave barve in dolg rumen bet ter sivo olivne lističe. Saprofit in prostotrosnica, ki raste šopasto na panjih različnega drevja, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



145



146



147



148



149



150

151

Jagodasti skorjoder*Hypoxylon fragiforme* (Pers.) J. Kickx f. (1835)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pečkarice (*Pyrenomycetideae*)

trošnjak je okrogel, trd in jagodaste barve ter se množično razraste na skorji listavcev. Saprofit in zaprtotrošnica, troši so tik pod površino gobe v peritecijah - stekleničastih trosnjakih. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2014

152

Malinasti skorjoder*Hypoxylon fuscum* (Pers.) Fr. (1849)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pečkarice (*Pyrenomycetideae*)

trošnjak je skoraj kroglast, trd in malinaste barve ter raste na lubju odpadnih listavcev. Saprofit in zaprtotrošnica, troši so tik pod površino gobe v peritecijah jajčaste oblike. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

153

Krastasti skorjoder*Hypoxylon multiforme* (Fr.) Fr. (1849)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pečkarice (*Pyrenomycetideae*)

trošnjak je nepravilno polkroglaste oblike, trd in je sprva rjav ter kasneje črn, raste pa v kolonijah na lubju listavcev. Saprofit in zaprtotrošnica, troši so tik pod površino gobe v stekleničastih peritecijah. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

154

Črtasta razcepljenka*Inocybe abjecta* P. Karst. (1879)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima ime po razločnih belo črtastih ostrinkah lističev pod rjavkastim klobukom, ki se s staranjem na robu razcepi, bet pa je svetlo rjavkast. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci in prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

155

Ostrogrba razcepljenka*Inocybe acuta* Boud. (1917)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima ostro grbo seskaste oblike na osredju rjavkastega klobuka, bet je tanek in rjav, lističi pa so sprva beli in kasneje rjavi. Mikorizna vrsta raste v mešanih gozdovih in je prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

156

Rdečča razcepljenka*Inocybe adaequata* (Britzelm.) Sacc. (1887)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima rdečkasto rjav do škrlatno rjav klobuk zvonaste oblike, rob se s staranjem cepi, bet pa je zgoraj bel in spodaj rožnate barve. Mikorizna vrsta z listavci in prosto-trošnica, troši so na sprva belih in kasneje na rožnatih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017



151



152



153



154



155



156

157

Aghardova razcepljenka*Inocybe agardhii* (N. Lund) P.D. Orton (1960)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima rumeno do okrasto rjav klobuk in enak bet z vidnim obročkom, lističi pa so olivno rjavi in gosti, rob klobuka se star rad cepi. Mikorizna vrsta z grmi in vrbami, prostotrošnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

158

Beloroba razcepljenka*Inocybe albomarginata* Velen. (1920)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima rjavkast klobuk z belim robom, ki se star rad cepi, bet je rjavkast, lističi pa so sprva beli in kasneje rjavijo. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrošnica, ki raste tudi v parkih in ob poteh, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

159

Zvezdastotrošna razcepljenka*Inocybe asteospora* Quél. (1879)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima sprva stožčast rdeče rjav klobuk, ki se kasneje razpre, enak bet in sivo rjave lističe. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, trosi značilne zvezdaste oblike pa so na lističih pod klobukom, ki se star na robu rad cepi. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

160

Bongardova razcepljenka*Inocybe bongardii* (Weinm.) Quél. (1872)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima najprej stožčast in nato zvonasto izbočen klobuk okrasto rjave barve in grbo z luskami na temenu, bet in lističi pa so rdeče rjavi. Mikorizna vrsta z listavci in tudi iglavci ter prostotrošnica, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

161

Zoprna razcepljenka*Inocybe corydalina* Quél. (1875)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima izbočeno obliko klobuka z grbo na osredju, ki je nekoliko temnejše sivo-zelena kot klobuk, bet je belkast, lamele pa sprva blede sive in kasneje rjavkaste. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci ter prostotrošnica, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

162

Klobučevinasta razcepljenka*Inocybe dulcamara* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima rjavi klobuk, ki je klobučevinasto vlaknast in skoraj poravnan, bet je rjav in ima komaj vidne sledi obročka, lističi pa so tudi rjavkasti. Mikorizna vrsta z iglavci, ki raste skupinsko, prostotrošnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



157



158



159



160



161



162

163

Godejeva razcepljenka*Inocybe godeyi* Gillet (1874)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima rožnati koničasti klobuk, bet in lističe, sčasoma pa postaja vse bolj rožnato rdeča. Mikorizna vrsta z listavci, predvsem bukvami, prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom, ki se na robu rad razcepi. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

164

Mandljeva razcepljenka*Inocybe hirtella* Bres. (1884)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima vonj po mandljih, klobuk je sprva zvonast in nato ploščat ter slamnato rumen do zlat, bet je belkast, lističi pa sčasoma rjavijo. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrosnica, troši pa so na lističih pod klobukom. Najdena je na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

165

Pegasta razcepljenka*Inocybe maculata* Boud. (1885)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima stožčasto zvonast rjav klobuk s pegastimi ostanki ovojnice na temenu, bet je bel in ima na dnu stopničasti gomoljček, lističi pa so sprva beli in kasneje rjavkasti. Mikorizna vrsta z listavci, troši so na lističih pod klobukom, ki se na robu rad razcepi. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

166

Igličevna razcepljenka*Inocybe mixtilis* (Britzelm.) Sacc. (1887)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima sprva zvonast in kasneje izbočen klobuk rumeno rjavkaste barve z zlatimi odtenki in z grbo na osredju, bet je bel do okrašt, gosti lističi pa so svetlo rjavi in raste samo v igličastih gozdovih. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

167

Repasta razcepljenka*Inocybe napipes* J.E. Lange (1917)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima stožčast rjavkast klobuk z grbo na osredju, bet je rumeno rjav in ima v dnišču repi podoben gomolj, lističi pa so sprva beli in kasneje okraști. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom, ki se star na robu rad razcepi. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

168

Ozkocistidna razcepljenka*Inocybe obscurobadia* (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz (1977)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima izbočen rjavkast klobuk z izrazito grbo na osredju, je vlaknast, rob je nekoliko svetlejši, bet je belkast, lističi pa so okraști. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017



163



164



165



166



167



168

169

Sivoroba razcepljenka*Inocybe petiginosa* (Fr.) Gillet (1876)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

majhna gobica ima zelo vlaknast sivorjav klobuk in sivkast rob, bet je tanek in rjav, lističi pa so okraști do slamnato rumeni. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom, ki se star na robu cepi. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

171

Dišeča razcepljenka*Inocybe pyriodora* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima okrašto do rdečkasto rjav klobuk z grbo na osredju, bet je rožnate barve, lističi pa so cimetasto rjavi. Goba ima zelo sladkoben vonj. Mikorizna vrsta z iglavci in listavci, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

173

Luskata razcepljenka*Inocybe squamata* J.E. Lange (1917)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima sprva stožčast in kmalu zravnani rjavkast klobuk, ki je pokrit z luskami, bet je okrašto rumen, lističi pa sprva rumenkasti in končno rjavi. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom, katerega rob se star cepi. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

170

Svetloroba razcepljenka*Inocybe phaeodisca* Kühner (1955)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima kremasto rjavkast izbočen klobuk z grbo na osredju in s svetlim oz. belkastim robom, bet je okrašt, lističi pa sprva beli in kasneje rjavkasti. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

172

Zašiljena razcepljenka*Inocybe rimosa* (Bull.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima okrašto rjav klobuk, ki je sprva močno stožčast, kmalu pa zravnani in grbast ter z navzgor zavihanim robom, tanek bet je okrašt, lističi pa rjavkasti. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci, prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

174

Belkasta razcepljenka*Inocybe umbratica* Qué. (1883)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba je vsa bela, klobuk je sprva stožčast in kasneje zravnani ter na robu razcepljen, raste pa pod smrekami. Mikorizna vrsta z iglavci in prostotrošnica, troši so na lističih, ki stari posivijo. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



169



170



171



172



173



174

175

Grčavi luknjač*Inonotus nodulosus* (Fr.) P. Karst. (1882)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

lesna goba je iz skupaj rastočih trosnjakov, ki imajo grbe oz. grče in so oranžno rjavi do rjavi. Saprofit in parazit ter prostotrosnica, troši so v luknjicah, ki so sprva kremaste in kasneje okrasto rjave barve. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

176

Črneča ožganka*Kretzschmaria deusta* (Hoffm.) P.M.D. Martin (1970)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pečkarice (*Pyrenomycetideae*)

lesna goba, ki se kot siva ali črna skorja oz. kot ostanek pogorišča razraste na še živih listavcih ali štorih ter se staplja s površino. Saprofit in parazit ter zaprtotrosnica, troši so v spodnjem delu trdega in lomljivega trosnjaka. Najdena je na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

177

Rdečkasta bledivka*Laccaria laccata* (Scop.) Cooke (1884)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba je rožnato rdečih do rjavkastih barv, ki s staranjem bledijo, klobuk je sprva izbočen in kasneje zravnčan ter na osredju udrt. Saprofit in prostotrosnica, ki raste ob poteh in na gozdnih obronkih, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

178

Kosmati črnivec*Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. (1887)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima kosmati rjavi klobuk in skoraj črne lističe, bet pa je sprva bel in kmalu rjav. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na travi in na tleh v šopih tesno skupaj, troši so na sprva okrastih in kasneje na črnečih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

179

Kratkobetna mlečnica*Lactarius acerrimus* Britzelm. (1893)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima okrasto rumen in na osredju udrt klobuk ter kratek bet, lističi so okraști, goba izloča bel sok ali mleček. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

180

Smrekova sirovka*Lactarius deterrimus* Gröger (1968)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sprva izbočen okrasto oranžen klobuk, ki kmalu postane na osredju udrt in delno pozeleni, bet in lističi ter mleček pa so oranžni. Mikorizna vrsta s smrekami in prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2016



175



176



177



178



179



180

181

Vonjava mlečnica*Lactarius evosmus* Kühner & Romagn. (1954)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima rumen do okrašt izbočen klobuk z udrtim osredjem, tudi bet in lističi so rumenkasti, mleček pa je bel. Ima sladek vonj po jabolkah. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

182

Leskina mlečnica*Lactarius pyrogalus* (Bull.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sivo rjav izbočen klobuk z udrtim osredjem, sivo okrašt bet in okrašte lističe, njen mleček je bel in pekoč. Mikorizna vrsta z leskami, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

183

Sluzasta mlečnica*Lactarius uvidus* (Fr.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sivo rjav klobuk z vijoličnimi lisami in sluzasto površino, na osredju je udrt, bet je bel, lističi blede okraši, mleček pa bel in nato vijoličen. Mikorizna vrsta z iglavci in listavci, prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

184

Kolobarčasta mlečnica*Lactarius zonarius* (Bull.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima okrasto rumen klobuk z udrtino na osredju in s kolobarji na površini, bet je bel, lističi blede okraši, mleček pa bel. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

185

Medvedja žilavka*Lentinellus ursinus* (Fr.) Kühner (1926)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

goba ima žilav in prožen klobuk medvedje rdeče-rjave barve, ki na obrobju blede, lističi so beli do rožnato rjavi, beta pa ni. Saprofit in prostotrošnica, ki raste konzolno vpeta in skupinsko na listavcih, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

186

Brezova lenzovka*Lenzites betulina* (L.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

siva goba konzolaste oblike je sploščena in ima na spodnji strani trosovnico iz cevč, ki prehajajo v lističe, včasih je zelena od alg, beta nima. Saprofit in prostotrošnica raste na brezah, troši so v luknjicah na spodnji strani. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014



181



182



183



184



185



186

187

Kostanjasti dežniček*Lepiota castanea* Quél. (1881)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

majhna goba ima kostanjevo rjav dežnikasti klobuk z luskami, ki so tudi na visokem betu z obročkom, lističi so sprva beli in nato rjavijo, raste v listnatih in iglastih gozdovih. Saprofit in prostotrosnica, troši pa so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

189

Zoprni dežniček*Lepiota cristatoides* Einhell. (1973)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

majhna gobica ima klobuček kremaste do okrase barve z oranžno rjavimi krpicami na površini, bet je mlad bel in kmalu rjavkast, lističi so kremaste barve, imenovana pa je po neprijetnem vonju. Saprofit, ki raste v mešanih gozdovih in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

191

Gladki dežniček*Lepiota oreadiformis* Velen. (1920)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima gladek bel izbočen klobuk, ki je na osredju okrast in ima grbo, bet je zgoraj okrast in nato bel ter okrasto pigmentiran, lističi so beli. Saprofit in prostotrosnica, ki raste med gozdno travo, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

188

Smrdljivi dežniček*Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

gobica ima na svetlem izbočenem klobučku rjave luske in grbo, tanek bet z minljivim obročkom in bele lističe. Saprofit, ki raste v gozdovih, parkih in vrtovih, prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Goba ima neprijetni vonj. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

190

Parkovni dežniček*Lepiota josserandii* Bon & Boiffard (1974)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima sprva na osredju klobuk cimetno rjave barve in nato vinsko rdeče rjave na beli podlagi, lističi so beli in na robu rožnati, bet pa je rdeče rjavkast in nima obročka. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v parkih, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

192

Bledovijolična kolesnica*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer (1951)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba ima sprva polkrožen in kmalu izbočen bledovijoličasti klobuk, ki ima podvihan rob in tudi bet ter lističi so enakih barv, goba nikoli nima koprene, raste pa v mešanem gozdu. Saprofit in prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



187



188



189



190



191



192

193

Vijoličasta kolesnica
Lepista nuda (Bull.) Cooke (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba je v celoti vijoličasta, zravnani ali tudi na robu navzgor dvignjen klobuk ima rob podvihan, bet je nekoliko svetlejši. Saprofit in prostotrosnica, ki raste pod iglavci, trosi so na vijoličnih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

195

Umazana kolesnica
Lepista sordida (Schumach.) Singer (1951)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba ima vodeno svetlo vijoličast klobuk, ki je sprva izbočen in kmalu poravnani ter z valovitim robom in udrtim osredjem, bet in lističi so enaki. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v šopih v travi in pod listavci, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

197

Betičasta prašnica
Lycoperdon perlatum Pers. (1796)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

prašničarke (*Lycoperdaceae*)

bela goba ima betičasto obliko, glavati del je skoraj okrogel in ima igličaste bradavice, bet je širok. Saprofit in prostotrosnica, trosi so v glavi trosnjaka in kot prah uhajajo skozi odprtino, raste na gozdnih tleh. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

194

Poprova kolesnica
Lepista ricekii Bon (1983)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba ima sprva izbočen in kmalu sploščen bel klobuk, ki je kasneje svetlo rjav, bet je enak, lističi pa beli in nato okraški, okus ima po popru. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na travnikih in pod listavci, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

196

Razbarvana grahovka
Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. (1829)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

graharke (*Tubiferaceae*)

goba je kroglasta in podobna grahu ter ima sprva rdečkasto barvo, kmalu se razbarva in je sivo-zelena do rjava, beta nima. Saprofit in nižje razvita gliva, ki raste na trohnečih iglavcih, trosi pa se nahajajo v notranjosti gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

198

Travniška prašnica
Lycoperdon pratense Pers. (1797)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

prašničarke (*Lycoperdaceae*)

trosnjak je skoraj kroglast in ima na sprva beli in kasneje blede rjavi površini drobne bodice, na vrhu je odprtina za uhajanje trosov v okolico, bet je kratek, trosovnica pa je v celotni notranjosti gobe. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na travnikih, trosi so v notranjosti trosnjaka. Najdena je bila na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017



193



194



195



196



197



198

199

Hruškasta prašnica

Lycoperdon pyriforme Schaeff. (1774)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

prašničarke (*Lycoperdaceae*)

goba ima hruškasto obliko in je sprva bela, nato cela rjava, bet je zašiljen, raste pa na trhljem lesu. Saprofit in prostotrosnica, trosi so v glavi trosnjaka in kot rjav prah uhajajo skozi odprtino na vrhu trosnjaka. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

200

Iglična prašnica

Lycoperdon umbrinum Pers. (1801)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

prašničarke (*Lycoperdaceae*)

goba ima rjavo kroglasto glavo s temnimi iglicami, bet je svetlorjav, debel in kratek, raste pa v iglastem gozdu na razpadajočih iglicah. Saprofit in prostotrosnica, trosi so v notranjosti glave in uhajajo iz nje kot prah. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

201

Beli zajček

Lyophyllum connatum (Schumach.)
Singer (1939)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba je v celoti bela, klobuk je izbočen in na robu podvihan, bet je čvrst, lističi pa so gosti. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v velikih šopih ob gozdnih poteh ali v travi, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

202

Rjavi zajček

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer (1951)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

gobe imajo rjave klobuke in dolge belkaste bete, ki so zraščeni v dnišču, lističi so beli do svetlo rjavi, rastejo pa v gozdovih in parkih. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

203

Sivi zajček

Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton (1960)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

gobe imajo klobuke pepelno sive barve in bele bete, ki so zraščeni v dnišču, lističi so beli in rastejo šopasto v mešanih gozdovih. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

204

Umazani zajček

Lyophyllum immundum (Berk.) Kühner (1938)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba ima izbočen klobuk umazano bledo do sivo rjave barve, tudi bet ima umazane sive odtenke, lističi pa so sivo rjavkasti. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom, raste v mešanih gozdovih. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



199



200



201



202



203



204

205

Trdokožni zajček
Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühner ex
Kalamees (1994)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

gobe imajo klobuke črno-rjavih barv, ki jih pokriva trda in prožna koža, rjave bete, ki so zraščeni v dnišču in bele lističe, rastejo pa pod listavci. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

207

Trdobetna sehlica
Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke &
Quel. (1878)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima okrast izbočeno zvonast klobuk s cimetasto rjavim osredjem in tanek trd rdečerjav bet, lističi pa so belkasti. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v listnatem gozdu na lesnih ostankih, trosi so na redkih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

209

Vijoličasta sehlica
Marasmius wynnei Berk. & Broome
(1859)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba z belim izbočenim klobukom ima blede vijolične odtenke na osredju, bet je blede rjav, lističi pa so najprej beli in nato sivi. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom, raste v listju in v igličevju v mešanih gozdovih. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

206

Nepravilna sehlica
Marasmius anomalus Lasch (1854)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima izbočeno zvonast in kremasto okrast klobuk podoben padalu, tanek in dolg bet je zgoraj bel, nato rdeče-rjav in proti dnu črn, lističi so belkasti, raste pa na travnikih in tudi na kravjem gnoju. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na redkih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

208

Volčičja sehlica
Marasmius torquescens Quel. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima sprva kupolast in nato izbočen klobuk umazano kremaste barve, ki je na osredju rjav, žilav bet je tanek in zgoraj okrast, proti dnišču pa temno rjav, lističi so okraști. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na lesnih ostankih pod listavci, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

210

Širokolistna velekokorenovka
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. &
Pouzar (1972)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima izbočen in kasneje zravnšan sivo rjav klobuk, beli lističi so zelo široki, bet pa je belkast. Saprofit in prostotrosnica, raste na preperelih drevesnih panjih, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



205



206



207



208



209



210

211 **Črtasta gostolistka**
Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill
(1914)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)
goba ima črtasta rjava vlakna na belkastem betu, rjavi klobuk je sprva zvonast in kmalu zravnna ter z udrtno in grbico na osredju, lističi pa so beli. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na travnikih in pašnikih, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

213 **Ozkobetna gostolistka**
Melanoleuca pseudoluscina Bon (1980)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)
goba ima izbočen klobuk okrašte barve z grbo na osredju, bet je ozek in dolg ter zgoraj okrašt in nižje rjav, lističi so belkasti. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na rečnih obrežjih in sipkih tleh, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

215 **Bukova trgača**
Melogramma spiniferum (Wallr.) De Not. (1863)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

trgačarke (*Melanconidaceae*)
črnojavni in jagodam podobni kroglasti trosnjaki z bradavičasto površino rastejo na lubju bukovih dreves, beta nimajo. Nevaren saprofit in zaprtotrosnica, troši so na vsej zunanji površini trosnjaka, raste strnjeno na listavcih. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

212 **Navadna gostolistka**
Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill
(1911)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)
goba ima sprva izbočen rjavkast klobuk in kmalu postane osredje lijasto, bet ima rjava vlakna, lističi pa so belkasti in gosti. Saprofit in prostotrosnica, ki raste ob robovih poti in gozdov na organskem drobirju, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

214 **Bodičasta temnolistka**
Melanophyllum haematosperrum (Bull.) Kreisel (1984)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)
goba ima umazano rjavkast izbočen klobuk z grbo na osredju in bodicami ter ostanki koprene na robu, bet je tanek in siv z vinsko rjavimi lisami, lističi so sprva vinsko rožnati, kmalu potemniijo do rjave barve. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na gnilih kosih lesa, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

216 **Črneča velezraščenska**
Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. (1882)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)
goba na dotik črni in ima obliko velikega pahljačastega grma okrašto rjave barve s koncentričnimi programi, bet je kratek ali ga ni. Parazit in prostotrosnica, ki raste na štorih listavcev kot velika zraščenska, troši so v belih luknjicah pod gobo. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



211



212



213



214



215



216

217

Drhtavi zgubanec

Merulius tremellosus Schrad. (1794)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

skorjarke (*Corticiaceae*)

goba v obliki polkrožnih poličk belkaste do rožnate barve je mehka in želatinasta ter ima zgubano površino in zadrhti kot žele. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na lubju štorov listavcev in tudi iglavcev, troši so na spodnji rožnati površini, ki je labirintasto brazdasta. Najdena je bila na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

219

Užitni smrček

Morchella esculenta (L.) Pers. (1801)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

jamičarke (*Morchellaceae*)

goba je podobna satovnici z globokimi in med seboj povezanimi udrtinami in grebeni različnih oblik, je okrasta do sivorjava, bet je votel in okrast. Saprofit in zaprtotrosnica, troši se nahajajo v udrtinah med grebeni. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

221

Sivorjava čeladica

Mycena aetites (Fr.) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima sivorjavi klobuk koničaste oz. stožčaste oblike, ki star postane razširjen, tanek bet je visok in vodenega videza, lističi so sivi. Saprofit in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom, raste pa na travnatih površinah. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

218

Sivkasta lončevka

Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

lončarke (*Dermateaceae*)

siva goba je mehka in podobna lončku, ki je na notranji površini gladek, na zunanji sivo rjavi površini hrapav, rob trosnjaka je bel. Saprofit in zaprtotrosnica, ki raste največ na odmrlem lesu listavcev in precej redkeje iglavcev, troši so na notranji površini gobe. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

220

Bucikasta čeladica

Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

drobcena gobica ima klobuček živo oranžne barve in čeladaste oblike ter dolg prosojen tanek bet, podobna pa je buciki. Saprofit in prostotrosnica, troši so na belih lističih pod klobukom, raste pa na odmrlih rastlinskih delčkih. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

222

Lasastobetna čeladica

Mycena capillaripes Peck (1888)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima zvonast klobuček sive do sivo rjave barve, ki se star razširi, sivi bet je kot las tanek in dolg, tudi lističi so sivi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste pod iglavci, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



217



218



219



220



221



222

223 Žoltosočna čeladica

Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (Marasmiaceae)

gobica ima klobuček rumeno do olivno rjave barve, ki je zvončaste oblike, v betu pa je oranžno rdeč sok, ki na klobučku pušča rdeče črte, lističi so beli in z rdečkastimi odtenki. Saprofit in prostotrošnica, ki raste na lesnih ostankih listavcev, troši pa so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

225 Nagubana čeladica

Mycena galericulata (Scop.) Gray (1821)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (Marasmiaceae)

gobica ima gubasto nazobčan sivo rjavkast klobuk, bel do rjav tanek bet in bele lističe. Saprofit in prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom, raste pa na ostankih lesa in na štorih v mešanih gozdovih. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

227 Krvobetna čeladica

Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (Marasmiaceae)

gobica ima sprva koničast in nato zvonast klobuček rdečkaste do rdeče rjave barve z grbo na osredju, v rdeče rjavem betu pa je krvavo rdeč mleček, lističi so rdeči. Saprofit in prostotrošnica, ki raste šopasto v vseh gozdovih, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

224 Ivjebetna čeladica

Mycena flos-nivium Kühner (1952)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (Marasmiaceae)

gobica ima svetlo rjav zvončast klobuček in sivorjav bet, ki ima na dnu ivju podobne bele iglice, lističi so sivo belkasti. Saprofit in prostotrošnica, ki raste v iglastih gozdovih na lesnih ostankih in storžih, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

226 Mlečna čeladica

Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. (1871)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (Marasmiaceae)

gobica ima sprva stožčast in nato zvonast klobuk sive barve, v tankem sivem do črnem betu pa ima obilico belega mlečka. Saprofit in prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom, raste v vseh gozdovih na iglicah ali na steljah listavcev. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

228 Skorjina čeladica

Mycena olida Bres. (1887)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (Marasmiaceae)

gobica ima sprva stožčast in nato zvončast klobuček kremaste barve, rumenorjav bet in bele lističe, raste pa na skorjah listavcev. Saprofit in prostotrošnica, troši nastajajo na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



223



224



225



226



227



228

229

Redkvičasta čeladica*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima sprva zvonast klobuk, ki se kmalu razpre, je rožnat ali vijoličast, bet je rožnat, gosti lističi pa so bledih barv. Saprofit in prostotrosnica raste v vseh gozdovih, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

231

Strupena čeladica*Mycena rosea* Gramberg (1912)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima sprva polkroglast in nato razprt klobuk rožnate barve, takšni pa so tudi lističi in bet. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom, je strupena, raste pa med gnilih listjem in diši po redkvi. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

233

Zefirna čeladica*Mycena zephirus* (Fr.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima koničast klobuk vodeno rdeče rjavkaste barve, ki kmalu postane ploščat, je pegast in na robu svetel, lističi so beli, bet pa je sivo vijoličast. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v iglastih gozdovih na odpadkih, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

230

Renejeva čeladica*Mycena renati* Quél. (1886)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

majhna gobica zvončastih oblik ima rožnat klobuk in rumeni bet, lističi so beli, raste pa šopasto. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na razpadlem lesu listavcev, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena ob poti na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2015

232

Navadna čeladica*Mycena vulgaris* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima blede svetlo rjav klobuk, ki je sprva stožčast in nato izbočen ter z udrtino na osredju in z želatinasto kožico, bet in lističi so sivo rjavi, raste pa na odpadlih iglicah. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na redkih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

234

Dolgobetna česnovka*Mycetinis alliaceus* (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima sprva stožčast in kmalu zravnani klobuk sivorjave barve, dolgotanek bet je proti dnišču vse bolj črn, lističi pa so beli. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na listju in iglicah, trosi so na lističih pod klobukom, goba diši po česnu. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014



229



230



231



232



233



234

235

Rumena iglovka*Mycoacia uda* (Fr.) Donk (1931)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

iglarke (*Meruliaceae*)

trošnjak se razraste kot tanka bela preproga ali skorja z rumenimi trdimi iglicami, ki se nahajajo na spodnjih straneh drevesnih vej. Saprofit in prostotrosnica, raste na listavcih in povzroča belo gnilobo, trosi se nahajajo na površini iglic. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

237

Belkasta širokolistka*Oudemansiella hygrophoroides* Singer & Cléménçon (1971)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

žametarke (*Dermolomataceae*)

goba je v celoti bela in ima najprej izbočen in nato zravnani klobuk z žametno površino, pod katerim so zelo široki lističi. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom, uspeva pa v listnatih in v mešanih gozdovih. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

239

Koničasti govнар*Panaeolus acuminatus* (Schaeff.) Quél. (1874)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

smetiščarke (*Bolbitaceae*)

gobica ima sivorjav zvonast klobuk s konico na osredju, bet je tanek in dolg ter do črnorjav, lističi so črni, raste pa na pašnikih na gnoju. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

236

Cinobраста bradavička*Nectria cinnabarina* (Tode) Fr. (1849)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pečkarice (*Pyrenomycetideae*)

drobcena gobica cinobrase ali opečnate barve je podobna bradavički in ustvarja dva tipa plodišč (strom), ki sta stisnjeni v kepo: nespolna in spolna plodišča, trosi nastajajo v slednjih. Saprofit in zaprtotrosnica, ki raste na odmrlih vejah listavcev, trosi pa so na površini trošnjaka. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2016

238

Košenična govнарka*Panaeolina foeniceci* (Pers.) Maire (1933)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

smetiščarke (*Bolbitaceae*)

goba ima polkroglasti rjav klobuček, tanek rdečkasto rjav bet in rjave lističe. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na košenicah – na enkrat letno pokošenih travah in na govnu, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

240

Gnojiščni govнар*Panaeolus fimicola* (Pers.) Gillet (1878)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

smetiščarke (*Bolbitaceae*)

gobica ima sprva zvonast in nato poravnani sivočrni klobuk, tanek bet je umazano bel in v dnu rjav, sivo-olivnati lističi s staranjem črni. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na gnojiščih in na travnikih, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



235



236



237



238



239



240

241

Pisani govnar*Panaeolus papilionaceus* (Bull.) Quél.
(1872)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

smetiščarke (*Bolbitaceae*)

gobica pisanih barv od sive do rjavkaste in sivočrne ima stožčasto zvonast klobuk, ki je v temenu zašiljen, sivorjav bet je dolg in tanek, lističi so črni, raste pa na govnu na pašnikih. Saprofit in prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

243

Trpki zgručevac*Panellus stipticus* (Bull.) P. Karst. (1879)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

goba ima ledvičasto obliko klobuka okrasto rjave barve, enak je debeli in kratki bet, lističi so okraști ali cimetaști, raste pa na panjih in odpadlih vejah listavcev. Saprofit in prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena je bila na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

245

Zgubana črnilovka*Parasola plicatilis* (Curtis) Redhead (2001)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

črnilke (*Coprinaceae*)

goba ima sivorjave klobučke, ki so sprva stožčasti in kmalu konveksni z vidno rjavo grbo na osredju, stari so zgubani, bet je bel do siv, lističi pa najprej sivi in kmalu črni. Saprofit in prostotrosnica, ki raste ob poteh in na travnikih, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

242

Mili zgručevac*Panellus mitis* (Pers.) Singer (1936)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

bela goba školjkaste oblike sčasoma postane okrasta, je prožna in žilava, bet in lističi so belkasti, raste pa v velikih gručah na vejah iglavcev. Saprofit in parazit, prostotrosnica, troši so na lističih pod zgornjim delom gobe. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

244

Bombažnata črnilovka*Parasola conopilus* (Fr.) Örstadius & E. Larss. (2008)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

črnilke (*Coprinaceae*)

goba s stožčastim klobukom ima barvo kot bombaž, vlažna je rdeče rjavkasta, posušena pa okrasta, lističi so črni, bet je bel in raste ob gozdnih poteh med lesnimi odpadki. Saprofit in prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

246

Navadna podvihanka*Paxillus involutus* (Batsch) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

podviharke (*Paxillaceae*)

goba ima rjav in žametast klobuk z močno podvihanim robom, bet je rjav, lističi pa so barve lesa in gosti. Mikorizna vrsta z raznimi vrstami dreves in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017



241



242



243



244



245



246

247

Jelševa podvihanka

Paxillus rubicundulus P.D. Orton (1969)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

podviharke (*Paxillaceae*)

goba ima rjav klobuk, ki je na osredju vdrť ali liĵast, rob je povihan pri mlajših gobah, bet je rumeno rjav, listiĵi so rumenkasti, raste pa pod ĵrnimi jelšami. Mikorizna vrsta in prostotrošnica, troši so na gostih listiĵih pod klobukom. Najdena je bila na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

249

Mesnordeĵa opnovka

Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. (1889)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

skorĵarke (*Corticiaceae*)

trošnjak mesnordeĵe barve se kot tanka plast ali opna razraste na listavcih in je zelo nevaren patogen organizem. Parazit in tudi saprofit, prostotrošnica, troši so na celotni zunanji površini gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

251

Hrastova opnovka

Peniophora quercina (Pers.) Cooke (1879)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

skorĵarke (*Corticiaceae*)

trošnjak je v vlagi roŵnate barve, v suhem stanju pa rĵavkast ter se kot tanka plast ali opna razraste po hrastovih drevesih ter jih kot rak uniĵuje, saj povzroĵa belo gnĵlobo. Parazit in prostotrošnica, troši so na celotni zunanji površini gobe. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

248

Siva opnovka

Peniophora cinerea (Pers.) Cooke (1879)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

skorĵarke (*Corticiaceae*)

trošnjak je podoben tanki sivi opni, ki raste na listavcih in je nevaren, ker povzroĵa belo gnĵlobo. Saprofit in parazit, prostotrošnica, troši so na celotni zunanji površini gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

250

Trepetlikova opnovka

Peniophora polygonia (Pers.) Bourdot & Galzin (1928)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

skorĵarke (*Corticiaceae*)

trošnjak je v vlagi blede roŵnat iin voskast, v suhem pa siv do rĵavkast ter kot tanka plast ali opna raste na trepetlikovih drevesih. Parazit in saprofit ter prostotrošnica, troši so na celotni zunanji površini gobe. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

252

Soĵna skledica

Peziza succosa Berk. (1841)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

skledarke (*Pezizaceae*)

goba ima sklediĵasto obliko in je rumeno do sivo rĵave barve, v njenem mesu pa nastaja soĵen rumen mleĵek, ki se izloĵa ob zarezi. Saprofit in zaprtotrošnica, ki raste v listnatih gozdovih ob poteh in na ilovnatih tleh, troši nastajajo na celi površini znotraj skledice. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2015



247



248



249



250



251



252

253

Raznolična skledica
Peziza varia (Hedw.) Alb. & Schwein.
(1805)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

skledarke (*Pezizaceae*)

goba ima raznolično skledasto obliko, ki je znotraj rjava in gladka, na zunanji površini pa bela ali okraستا, bet je zelo kratek, raste pa na odpadlem lesu in na lesnih sekancih. Saprofit in zaprtotrošnica, troši nastajajo na notranji površini skledice. Najdena je bila na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

255

Vrbov plutač
Phellinus igniarius (L.) Quél. (1886)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

trošnjak je kopitast in polkrožen ter rjav do sivo črn, na prerezu tobačno rjav, trd kot les in prirasel s strani na živih in odmrlih vrbah. Saprofit in parazit in prostotrošnica, troši so v luknjicah na spodnjem delu gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

257

Žlebičasti luskinček
Pholiotina teneroides (Lge.) Sing. (1921)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

strniščarke (*Strophariaceae*)

goba ima rdečerjav stožčasto oblikovan klobuk in dolg nažlebičen temnorjav bet z obročkom. Saprofit in prostotrošnica, ki raste vzdolž poti in na travnikih, troši so na rjastorjavih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

254

Mehurjasta skledica
Peziza vesiculosa Bull. (1790)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

skledarke (*Pezizaceae*)

mlada gobica je kot mehurček, ki se nato na vrhu odpre, je rumeno okraستا, bet je majhen ali ga ni. Saprofit in zaprtotrošnica, ki raste na kompostu ali tudi v cvetličnih lončkih, troši nastajajo na notranji površini gobe. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

256

Navadni plutač
Phellinus trivialis (Bres.) Kreisel (1964)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

goba ima sprva gomoljasto, nato konzolno obliko s koncentričnimi pasovi, je sivo rjava do temno rjava, meso je žafranovo rumene barve. Saprofit in parazit, prostotrošnica, ki raste na listavcih, troši so v luknjicah na spodnjem delu. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

258

Bukov ostrigar
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.
(1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

goba ima siv do sivo rjav klobuk školjkaste oblike, kratek stransko priraščen bel bet in bele lističe, raste pa na bukvah. Saprofit in parazit, prostotrošnica, troši se nahajajo na gostih lističih pod klobukom. Najdena je na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016



253



254



255



256



257



258

259

Poletni ostrigar

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

goba ima sprva zgrbljen in nato pahljačast bel do svetlorjav klobuk, rob je tanek in valovit, bet je kratek in bel ter žilav, lističi so beli in padajo na bet, meso ima okus in vonj po janežu. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na odmrlih listavcih, troši pa se nahajajo na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

261

Čebulasta ščitovka

Pluteus boudieri P.D. Orton (1960)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

skoraj v celoti bela goba ima čebulasto dnišče beta, izbočen klobuk ima vdrtno na osredju, sprva beli lističi pa postanejo blede rožnati. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na lesnih ostankih listavcev in na žagovini, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

263

Žametasta ščitovka

Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet (1876)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

goba ima sprva zvonast in kasneje izbočen klobuk sivo rjave do rjave barve in z grbico na osredju, površina je žametasta, bet je bel, lističi pa najprej beli in kmalu rožnati. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na lesnih ostankih, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

260

Prelestna ščitovka

Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc. (1896)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

goba je zvončastih oblik in spreminja barvo od rumenkastih do rdečastih odtenkov, bet je bel in z rožnatim nadihom, lističi pa beli in kmalu rožnati. Saprofit, ki raste na trhljih štorih listavcev, prostotrosnica, troši so nahajajo na lističih pod klobuki. Najdena ob poti na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2017

262

Jelenova ščitovka

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

goba ima sprva polkroglast klobuk sive do rjave barve kot jeleni in se kmalu zravna, bet je siv do rjav, lističi pa sprva beli in nato rožnati. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na kosih lesa listavcev in iglavcev, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

264

Drobcena ščitovka

Pluteus exiguus (Pat.) Sacc. (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

majhna gobica ima bel klobuk, ki je sprva polkroglast in kmalu izbočen, bet je bel, beli lističi pa so kmalu rožnati. Saprofit in parazit, prostotrosnica, ki uspeva na lesnih ostankih listavcev, troši pa so na lističih pod klobukom. Najdena je na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



259



260



261



262



263



264

265

Pritlikava ščitovka

Pluteus nanus (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

majhna gobica ima najprej zvonast in nato izravnani sivo rjav do rjav klobuk z grbo na osredju, bet je bel, lističi pa sprva beli in sčasoma rožnati. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na preperelem lesu v listnatem gozdu, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

267

Zrničasta ščitovka

Pluteus plautus (Weinm.) Gillet (1876)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

goba ima sprva izbočen in kasneje ploščat roževinasto siv do rjav klobuk z grbo na osredju in na površini fina zrnca, bet je bel, beli lističi pa sčasoma postanejo rožnati. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na kosih odmrlih listavcev, troši nastajajo na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

269

Thomsonova ščitovka

Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis (1948)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

gobica ima sivo rjav do rjav klobuk, ki je sprva izbočen in kmalu poravnani, površina klobuka se rada naguba, bel bet je tanek in dolg in kmalu siv, lističi so sprva beli in nato rožnati. Saprofit in prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

266

Bela ščitovka

Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

goba je skoraj v celoti bela, klobuk je sprva stožčast, nato zvonast in končno poravnani, na površini starih gob se naredijo luske, v starosti pa beli lističi postanejo rožnati. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na delih odmrlih listavcev, troši nastajajo na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

268

Romellova ščitovka

Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. (1895)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

goba ima sprva izbočen in kasneje ploščat klobuk, ki je rumen z rožnatim odtenkom, bet je rumen, lističi pa sčasoma rdečkasti. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na kosih odmrlih listavcev, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

270

Rombasti luknjičar

Polyporus arcularius (Batsch) Fr. (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba ima rahlo izbočen rumeno do okrasto rjav klobuk, pod njim je belkasto kremasta trosovnica z luknjicami, katerih rob oblikuje romb, bet sčasoma rjavi, raste na odmrlih delih listavcev. Saprofit in prostotrosnica, troši so v luknjicah pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014



265



266



267



268



269



270

271

Zimski luknjičar

Polyporus brumalis (Pers.) Fr. (1818)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba ima sprva izbočen in kasneje zravn rjav klobuk z udrtim osredjem, pod njim je blede rumena luknjičasta trosovnica, bet je tanek in okrast, raste pa v zimskem času na odmrlih vejah.

luknjarke (*Polyporaceae*)

. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

273

Raznolični luknjičar

Polyporus leptcephalus (Jacq.) Fr. (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba je zelo raznolična, mlada ima zgrbljen klobuk, nato se razprostre ali udre, je lahko ledvičasta ali nepravilna okrogla, klobuk je rdeče okrast do rjav, bet je bel in v dnišču črno rjav, luknjice so okrasto rjave, raste na odpadlih vejah v mešanem gozdu. Saprofit in prostotrosnica, troši so v luknjicah pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2015

275

Gomoljavi luknjičar

Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. (1815)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba je imenovana po gomoljastem betu in luknjičasti strukturi trosovnice, okrasto do blede rdečkasto rjav klobuk je sprva ploščat in kasneje udrt, belkast bet se proti dnišču oži do gomolja, meso pa je belo. Saprofit in prostotrosnica, troši se nahajajo v luknjicah pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

272

Ščetinasti luknjičar

Polyporus ciliatus Fr. (1815)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba ima ščetinast oziroma kosmat klobuk rjavo zelene barve, ki je poravn in na osredju lijast, trosovnica je luknjičasta in bela, bet je rjav, raste pa na odpadlih vejah listavcev. Saprofit in prostotrosnica, troši se nastajajo v luknjicah. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014

274

Satjasti luknjičar

Polyporus mori (Pollini) Fr. (1821)
(*Neofavolus alveolaris*)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba ima rumeno oranžen klobuk okrogle ali ledvičaste oblike, pod katerim je satjasta oblika belih luknjic, ki sega tudi po celem belkastem betu. Saprofit in prostotrosnica, redkeje parazit, ki raste na listavcih, troši so v luknjicah pod klobukom. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014

276

Modri skutovec

Postia caesia (Schrad.) P. Karst. (1881)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

žametarke (*Dermolomataceae*)

goba ima polkrožno do ledvičasto oblikovan klobuk modre do modro sive barve, beta nima, ker je poličasto pritrjena na šture ali debela iglavcev, trosovnica pa je luknjičasta in belkasta do sivo modrikasta. Saprofit in prostotrosnica, troši so v luknjicah, meso pa je skutasto in mehko. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016



271



272



273



274



275



276

277

Krhki skutovec

Postia fragilis (Fr.) Jülich (1982)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

žametarke (*Dermolomataceae*)

belkasta goba ima polkrožno do ledvičasto obliko police, je bočno priraščena na šture in debela iglavcev, beta nima, trosovnica na spodnjem delu je luknjičasta, meso je sprva mehko skutasto, kasneje pa krhko. Saprofit in prostotrosnica, trosi so v luknjicah na spodnjem delu. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

279

Modrikasti skutovec

Postia subcaesia (A. David) Jülich (1982)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

žametarke (*Dermolomataceae*)

goba ima polkrožno obliko in je poličasto priraščena na štorih ali deblih listavcev, ima spužvasto strukturo in kakor skuta mehko meso ter je sprva bela, nato pa modrikasta. Saprofit in prostotrosnica, trosi nastajajo v luknjicah na spodnjem delu gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

281

Vinskordeča črnivka

Psathyrella bipellis (Quél.) A.H. Sm. (1946)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima sprva stožčast in kasneje izbočen klobuk vinskordeče barve, tudi dolg in tanek bet je vinskordeč, lističi pa so sprva škrlatno rjavi in kasneje temno sivi do črni. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na kosih lesa in preperevajočih koreninah, trosi pa so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

278

Trpki skutovec

Postia stiptica (Pers.) Jülich (1982)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

žametarke (*Dermolomataceae*)

bel trosnjak je poličasto priraščen na šture ali debela iglavcev in ima polkrožno ali tudi ledvičasto obliko, meso je mehko skutasto, okus pa trpek oziroma grenak. Saprofit in prostotrosnica, trosi nastajajo v luknjicah na spodnjem delu. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

280

Sloka črnivka

Psathyrella atomata (Fr.) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

tintarke (*Coprinaceae*)

goba je sloke postave in ima rožnat klobuk zvonaste oblike in z grbo na osredju, dolg in tanek siv bet ter sprva sive in kmalu črne lističe. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na gnojnih travnikih in ob gozdnih poteh, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

282

Zbledela črnivka

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire (1913)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima polkrožno izbočen do razprostr klobuk blede kožnate barve, dolg tanek bet je bel, lističi pa sprva beli, nato rožnati in končno črnijo. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v mešanih gozdovih na štorih, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017



277



278



279



280



281



282

283

Ljubka črnivka*Psathyrella corrugis* (Pers.) Konrad & Maubl. (1949)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

vitka in visoka gobica ima stožčast klobuk rožnate do sivo vijolične barve, tanek bet je belkast, lističi pa so sprva rožnati in končno črni. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v mešanem gozdu na travnikih, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

285

Stonoga črnivka*Psathyrella multipedata* (Peck) A.H. Sm. (1941)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima ime po zelo številnih tankih belih betih, ki so zaraščeni skupaj, svetlo rjavkasti klobuki so parabolične oblike, lističi pa so sprva sivi in končno temno rjavi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na tleh v mešanih gozdovih, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

287

Modrobetna gologlavka*Psilocybe caerulipes* (Peck.) Sacc. (1887)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

strniščarke (*Strophariaceae*)

goba ima izbočen rjav klobuk, proti dnišču rjavega beta je značilno modre barve, lističi pa so najprej svetlo rjavi in končno temno rjavi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v listnatih gozdovih na odpadlih koščkih lesa, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

284

Dimastolistna črnivka*Psathyrella leucotephra* (Berk. & Broome) P.D. Orton (1960)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima sprva zvonast in kasneje sploščen klobuk bele barve z rjavkastim osredjem, bet je bel, lističi pa dimaste barve. Saprofit in prostotrosnica, ki raste ob gozdu in med travo, troši so na zelo gostih lističih pod širokim klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

286

Sivorjava črnivka*Psathyrella spadiceogrisea* (Schaeff.) Maire (1937)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

tintarke (*Coprinaceae*)

goba ima sprva koničast in kmalu zvonasto izbočen klobuk sivorjave barve, bel bet je debel in dolg, lističi pa sprva beli in končno temno rjavi. Saprofit in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom, raste pa na kosih lesa v mešanih gozdovih. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

288

Žaltava korenarka, roženosiva obl.*Rhodocollybia butyracea* f. *asema* (Fr.) Antonín (1997)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima sprva stožčast in nato zravnani klobuk roženosive do rjave barve, ki star dobi dvignjene robove, bet je rjav, lističi pa beli. Saprofit in prostotrosnica, ki raste pod smrekami in v mešanih gozdovih, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



283



284



285



286



287



288

289

Pegasta korenarka*Rhodocollybia maculata* (Alb. & Schwein.) Singer (1939)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba je skoraj v celoti bela, le na razprtem klobuku ima rjave pege, tudi trd bel bet postane star rjavo lisast, enako tudi lističi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste najraje pod iglavci, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena je na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

291

Zvegana rusoglavka*Rhodocybe gemina* (Paulet) Kuyper & Noordel. (1987)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

goba ima mesnordeč oz. rusoglav sploščen klobuk, ki ima zvegan oz. skrivljen rob, bet je bel, lističi pa so okrasto rusi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v iglastih gozdovih, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

293

Modrikasti lepoglavec*Rugosomyces ionides* (Bull.) Bon (1991)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba ima sprva zvonast in kasneje sploščen vijoličast klobuk z modrikastim osredjem, bet je moder, lističi pa belkasti. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v listnatih gozdovih med odpadlim listjem, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

290

Spotegnjena korenarka, zasukani različek*Rhodocollybia prolixa* var. *distorta* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima rjavkast klobuk z oranžno rdečimi odtenki, ki je na robu močno zavihan, bet je zasukan in bel do okrast, lističi pa so beli. Saprofit in prostotrosnica, ki raste šopasto v vseh gozdovih, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena je na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

292

Dvobarvna mahoživka*Rickenella swartzii* (Fr.) Kuyper (1984)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

gobica ima siv do sivo-rjav klobuk s črnim osredjem, siv bet je v zgornjem delu temno vijoličast, redki lističi so beli do sivi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste med mahom in na močvirnatih predelih, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

294

Vabljiva golobica*Russula amoena* Quél. (1881)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sprva podvihan in nato zravn klobuk z udrtim osredjem, ki je pisanih barv od rumenkaste do vijolične in rjave, bet je bel, lističi pa smetanasti. Mikorizna vrsta z iglavci in listavci, prostotrosnica, ima vonj po ribah, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



289



290



291



292



293



294

295

Vonjava golobica*Russula amoenolens* Romagn. (1952)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sprva polkroglast in nato zravnana sivorjav klobuk z lijakastim osredjem, bet je bel in v dnišču bakreno rjav, lističi pa so sivkasti, vonj pa ima po ribah ali siru. Mikorizna vrsta z listavci, predvsem hrasti, prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

297

Ozkolistna golobica*Russula chloroides* (Krombh.) Bres. (1900)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima na sploščenem belem do sivem klobuku močno podvihan rob in na osredju udrtino, bet je bel, lističi pa beli in z zelenim odsevom ter so na obrobju zaradi vmesnih lističev zelo gosti. Mikorizna vrsta z listavci in z iglavci, prostotrošnica, troši so na ozkih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

299

Razbarvana golobica*Russula exalbicans* (Per.) Mel. & Zv. (1927)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima izbočen in rahlo udrt klobuk, ki je sprva blede rdeč, kmalu pa se razbarva v sivo olivno barvo, bet in lističi so belkasti. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

296

Borova golobica*Russula cessans* A. Pearson (1950)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima zravnana vinsko ali mesno rdeč klobuk z udrtim osredjem, bet je bel, lističi pa rumeni ali okrašto oranžni. Mikorizna vrsta z listavci in z iglavci, prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

298

Modrolistna golobica*Russula delica* Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sploščen in na osredju lijest bel klobuk z rjavkastimi lisami, bet je kratek in bel, lističi beli in z modrikastim odtenkom, vonj pa po sadju. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci, prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

300

Smrdljiva golobica*Russula foetens* Pers. (1796)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima izbočen in na osredju rahlo udrt okrašto rjav klobuk, močan okrašt bet in bele do rjavo lisaste lističe ter zelo smrdi. Mikorizna vrsta raste v vseh gozdovih in v travi, prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem predelu Otoka.

Popis: 2016



295



296



297



298



299



300

301

Mlečnobela golobica
Russula galochroa (Fr.) Fr. (1874)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima izbočen in na osredju udrt klobuk mlečno bele barve, ki star postane okrašt, bet in lističi so beli. Mikorizna vrsta raste v listnatih in mešani gozdovih, med mahom, je prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

303

Črneča golobica
Russula nigricans Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima izbočen in na osredju udrt klobuk, ki je sprva siv, nato rjavo lisast in končno črneč, tudi bel bet in lističi sčasoma črnijo. Mikorizna vrsta z iglavci in listavci, raste na ilovnatih tleh, prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

305

Grebenasta golobica
Russula pectinata Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima rumen do okrašt izbočen klobuk z grebenastim in nažlebkanim obrobjem, na osredju je udrt, bet in lističi so beli, meso pa zelo smrdi. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

302

Rjavozelena golobica
Russula heterophylla (Fr.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima izbočen in na osredju udrt klobuk rjavozelene barve, bet in lističi so belkasti. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci, raste ob robu gozda, je prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

304

Baržunasta golobica
Russula nobilis Velen. (1920)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima baržunasto oz. žametu podobno površino klobuka, ki je rožnat do rdeč, bet in lističi so beli. Mikorizna vrsta z listavci, ki raste tudi v mešanih gozdovih, ima šibek vonj po kokosu, prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

306

Rjavobetna golobica
Russula pectinatoides Peck (1907)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima izbočen klobuk z udrtino na osredju, ki je rumeno do bakreno rjave barve, bet je bel in v dnu rjav ali rjasto lisast, lističi so beli. Mikorizna vrsta z iglavci in listavci, prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017



301



302



303



304



305



306

307

Malinova golobica
Russula romellii Maire (1910)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima izbočen in na osredju udrt klobuk malinove barve, bet je belkast, lističi pa so sprva smetanasti in kmalu rumenkasti, diši rahlo po sadju. Mikorizna vrsta raste v vseh vrstah gozdov, prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

309

Pozna zgručevka
Sarcomyxa serotina (Pers.) P. Karst. (1891)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

goba ima sprva polkrožen in nato školjkast klobuk olivne do rjavkaste barve, bet je zlatorumen, lističi pa rumeni in nato rjavi. Saprofit in prostotrošnica, ki raste gručasto in pozno na listavcih, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

311

Nenavadna razporka
Schizophora paradoxa (Schr.) Donk (1967)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razporarke (*Schizophoraceae*)

nenavadni trosnjak se kot obliž razraste na odpadnih vejah listavcev in ima razprtine oziroma podolgovate razpore z luknjicami, je trd in povzroča belo gnilobo. Saprofit in prostotrošnica, troši so v luknjicah na vrhnji labirintasti površini gobe. Najdena je bila na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

308

Sončna golobica
Russula solaris Ferd. & Winge (1924)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima izbočen in na osredju vdrt klobuk rumene do zlate barve, bet je bel do okrašt, lističi pa najprej beli in kmalu slamnato rumeni. Mikorizna vrsta z listavci, prostotrošnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

310

Škrlatna čašica
Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. (1907)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ognjarke (*Pyronemataceae*)

goba čašaste oblike in škrlatno rdeče barve je s kratkim betom pritrjena na trhle veje, meso je tanko in prožno, lepo diši. Saprofit in zaprtotrošnica s troši na notranji strani čašaste tvorbe, ki raste na zakopanem lesu listavcev. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2014

312

Navadna cepilistka
Schizophyllum commune Fr. (1815)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cepilistke (*Schizophyllaceae*)

sivobeli pahljačast ali školjkast trosnjak ima lističe, ki so na robu oz. ostrinkah podolžno razcepljeni, lističi so sprva sivi in kasneje rjavkasti ali vijoličasti. Parazit rad raste na listavcih, redko na iglavcih, prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016



313

Bradavičasta trdokožnica*Scloderma verrucosum* (Bull.) Pers.
(1801)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

trdokožarke (*Sclerodermataceae*)

svetlorjavi trosnjak je nepravilno kroglaste oblike in poln zrnatih rjavih bradavic ter ima trdo kožo oz. ovojnico. Mikorizna vrsta s humoznimi tlemi v listnatih gozdovih in prostotrosnica, troši so v celotni notranjosti gobe in izhajajo navzven, ko ovojnica zgoraj počí. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

315

Kosmata slojevka*Stereum gausapatum* (Fr.) Fr. (1874)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

slojevke (*Stereaceae*)

tanek trosnjak je pahljačasto priraščen na les listavcev in ima na kosmati površini več različno obarvanih slojev, od okrasto rjave do rdečkasto rjave barve, trosovnica spodaj je gladka in istih barv. Saprofit in parazit, prostotrosnica, troši pa so na spodnji strani gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

317

Žametasta slojevka*Stereum subtomentosum* Pouzar (1964)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

slojevke (*Stereaceae*)

trosnjak z žametasto površino ima klobuk klobučevinaste strukture, pahljačaste forme in z več koncentrično obarvanih slojev, od rumenega, oranžnega do okrasto rjavega. Saprofit in parazit, prostotrosnica, ki raste na listavcih, troši pa so na spodnji gladki strani. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2016

314

Brezlična kostenelka*Skeletocutis amorpha* (Fr.) Kotl. & Pouzar
(1958)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

bjerkanderke (*Bjerkanderaceae*)

trosnjak je pahljačasto oblikovan in ima rob valovit, površina je iz koncentričnih pasov raznih barv, od sive in okraste do sivorjave, trosovnica je iz luknjic in je na površini, na otip je kot okostenela, raste pa na iglavcih. Saprofit in prostotrosnica, troši nastajajo v luknjicah na vrhu trosnjaka. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016

316

Dlakava slojevka*Stereum hirsutum* (Willd.) Pers. (1800)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

slojevke (*Stereaceae*)

trosnjak z dlakavo površino in z več različno obarvanimi sloji, od rumenega, okraste in do rjavega, je pahljačasto priraščen na les listavcev, trosovnica na spodnjem delu je gladka. Saprofit in parazit, prostotrosnica, ki ima trose na spodnji strani. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

318

Smrekova storževka*Strobilurus esculentus* (Wulfen) Singer (1962)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima sprva izbočen in podvit klobuk, kmalu se zravnja in je rumeno rjav, tudi dolg in tanek bet je tak, lističi pa so beli. Saprofit in prostotrosnica, ki uspeva na smrekovih storžih, tudi na tistih zakopanih, troši so na dokaj gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



313



314



315



316



317



318

Ovenčana storževka

319

Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer (1962)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima sprva izbočen in nato zravn klobuk okraسته do rjavkaste barve, bet je dolg in tanek ter na vrhu belkast, nižje pa rumeno okrast, lističi so belkasti. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na borovih storžih, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2015

Zelenkasta strniščnica

321

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

strniščarke (*Strophariaceae*)

goba ima močno sluzav zelenkasto moder klobuk, ki je sprva zvonast in kmalu razprt ter grbast, bet je zelenkast in kmalu zbledi, ima obroček, lističi so sčasoma vijoličasto sivi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na razpadajočem lesu, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2016

Čašasta torilka

323

Tarzetta catinus (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers (1971)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ognjarke (*Pyronemataceae*)

gobica ima ime po torilu ali okrogli posodi, ki je čašaste forme, je bež do okraسته barve, trosovnica pa je notranja površina čašice, ki je blede bež. Saprofit in zaprtotrosnica, ki raste na golih tleh v parkih in v mešanih gozdih, trosi nastajajo na notranji površini čaše. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

Grenka storževka

320

Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer (1962)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

gobica ima sprva izbočen in nato razprostr klobuček od okraسته do sivorjave barve, bet je dolg in tanek ter na vrhu bela, proti dnu pa rumeno okrast, lističi pa so beli in kasneje sivi. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom, raste pa na odpadlih storžih, ima grenki okus. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2015

Ovčarska lupljivka

322

Suillus granulatus (L.) Roussel (1806)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima najprej stožčasto izbočen in nato zravn rumeno rjav klobuk, ki ima lupljivo sluzasto kožico, bet je rumenkast, luknjice pa so rumenkaste in izločajo bele kapljice. Mikorizna vrsta z iglavci, predvsem z bori, prostotrosnica, trosi so v luknjicah pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2016

Očrnjena sivolistka

324

Tephrocye atrata (Fr.) Donk (1962)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

gobica ima sprva izbočeni rjavi klobuček, ki se kasneje zravn in ima na osredju majhno vdrtino, sčasoma črni in je črno rjav, bet je dolg, tanek in rjav, lističi pa sivi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na pogoriščih in na oglju, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



319



320



321



322



323



324

325

Barjanska sivolistka*Tephrocye palustris* (Peck) Donk (1962)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

gobica ima sivorjav do roževinast izbočen klobuk z grbico na osredju, bet je tanek in dolg ter temno siv, lističi pa sivi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na močvirskih delih in barjih, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

327

Nageljnasta roža*Thelephora caryophyllea* (Schaeff.) Pers. (1801)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

rožarke (*Thelephoraceae*)

trošnjak je podoben cvetu nageljna, iz beta navzven zraste več pahljačastih vej, ki na vrhu skupaj tvorijo nekakšne čaše, je rjav ali tudi vijoličasto rjav. Mikorizna vrsta raste na humusnih tleh ali na lesnih ostankih, je prostotrosnica, trosi so na spodnji gladki strani vejic trošnjaka. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

329

Rjaveča ploskocevka*Trametes cervina* (Schwein.) Tom. (2008)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

trošnjak poličaste oblike ima sprva belkasto površino, ki kmalu rjavi, trosovnica spodaj ima labirintasto razvrščene bele luknjice, ki rjavijo. Saprofit ali parazit, prostotrosnica, ki skupinsko raste na štorih listavcev, trosi se nahajajo v luknjicah pod gobo. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

326

Cvetoča roža*Thelephora anthocephala* (Bull.) Fr. (1938)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

rožarke (*Thelephoraceae*)

trošnjak sivomodrikaste barve ima obliko cvetoče rože ali tudi grmička z lopatastimi vršički, na površini slednjih pa je trosovnica. Mikorizna vrsta raste na humusnih tleh, je prostotrosnica, trosi so na površini vršičkov razvejanih vejic trošnjaka. Najdena je bila na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

328

Čopičasta roža*Thelephora penicillata* (Pers.) Fr. (1821)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

rožarke (*Thelephoraceae*)

rjav trošnjak je podoben pahljačasti roži, z več belo obarvanimi čopičastimi vršički, je ploščato sedeč ali razlit, beta nima, spodnja vijolična in nagubana površina je trosovnica in raste na tleh ali koščkih lesa. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, trosi so na spodnji strani pahljačastih vej trošnjaka. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

330

Grbasta ploskocevka*Trametes gibbosa* (Pers.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

trošnjak poličaste oblike je kremasto bel in ima grbasto površino, trosovnica spodaj pa je luknjičasta oz. cevasta in labirintasta. Saprofit in parazit, prostotrosnica, trosi so v luknjicah na spodnji strani gobe, raste pa na listavcih. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015



325



326



327



328



329



330

331

Kosmata ploskocevka*Trametes hirsuta* (Wulfen) Lloyd (1924)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

trošnjak ima kosmato površino iz srebrnih dlakic, je ploski in poličasto priraščen na listavcih, površina je iz različno obarvanih koncentričnih krogov, od belkaste, okrase do rjave barve na robu, trosovnica je bela in luknjičasta. Saprofit in prostotrosnica, troši so v luknjicah. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

333

Puhasta ploskocevka*Trametes pubescens* (Schumach.) Pilát (1939)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

trošnjak ima puhasto površino klobuka, je poličast in priraščen na listavcih, površina je sprva kremaste in kmalu sive ali svetlo rjavkaste barve, trosovnica je luknjičasta in bela ter kasneje rjavkasta. Saprofit, parazit in prostotrosnica, troši so v luknjicah na spodnji strani. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

335

Pisana ploskocevka*Trametes versicolor* (L.) Lloyd (1921)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

trošnjak je pahljačaste oblike, tanek in na robu valovit, ima površino pisanih barv in koncentrično urejenih, od sive, rumene, modrikaste do rjave. Saprofit in parazit, prostotrosnica, ki raste na listavcih, troši so v okrastru in luknjičasti trosovnici na spodnji strani. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2015

332

Kolobarčasta ploskocevka*Trametes ochracea* (Pers.) Gilb. & Ryvarden (1987)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

trošnjak je ploščat in poličasto priraščen na skorje listavcev, ima kolobarjasto površino in vsi koncentrični kolobarji niso različnih barv, temveč so okrastru, sivi ali rjavkasti. Saprofit in parazit, prostotrosnica, troši so v okrastru luknjicah. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

334

Vrbova ploskocevka*Trametes suaveolens* (L.) Fr. (1838)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

trošnjak raste na vejah vrb, je polkrožne oblike in sprva siv ter kmalu okrastru rjav, je stransko priraščen na osnovo, trosovnica pa je luknjičasta in bela do siva. Saprofit in parazit, prostotrosnica, troši so v luknjicah na spodnji strani trošnjaka. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2015

336

Listasta drhtavka*Tremella foliacea* Pers. (1800)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

drhtavkarke (*Tremellaceae*)

trošnjak je želatinasta in drhteča vijoličasto rjava do rjava goba, površina je nakodrana ali listasta, trosovnica pa je na celi površini. Saprofit in parazit, prostotrosnica, ki raste na odmrlih delih listavcev, troši so na celi površini gobe. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



331



332



333



334



335



336

337

Rumena drhtavka
Tremella mesenterica Retz. (1769)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

drhtavkarke (*Tremellaceae*)
trosnjak je drhtav oz. tresoč, živo rumena površina je močno zgubana in gladka ter je hkrati trosovnica, trosnjak je priraščen na odmrle dele listavcev. Saprofit in parazit, prostotrosnica, troši so na gubasti površini gobe. Najdena na vzhodnem delu Otoka.
Popis: 2017

339

Kraška kolobarnica
Tricholoma myomyces (Pers.) J.E. Lange (1933)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)
goba ima sprva zvonasto izbočen in kasneje zravnčan grbast klobuk mišje sive barve, bet je bel, lističi so najprej beli in kmalu sivi, uspeva pa pod listavci in iglavci na Krasu. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.
Popis: 2016

341

Pegasta kolobarnica
Tricholoma pardinum (Pers.) Quél. (1873)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)
goba ima sprva polkrožen in nato zravnčan klobuk s podvihanim robom, je sivkasta in s temnimi luskami ter pegami, bet je bel ali okrašt, lističi pa beli, okraști ali rahlo olivni. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, ki raste pod listavci in iglavci, troši so na lističih pod klobukom. Najdena je na srednjem delu Otoka.
Popis: 2015

338

Papirasta apnenka
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (1972)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ploskocevarke (*Coriolaceae*)
trosnjak ima obliko rozete ali pahljače, je tanek kot papir in ima meso bele barve kot apno, površina je iz koncentričnih pasov raznih barv, od vijoličaste, okraste, rjave do črne. Saprofit in prostotrosnica, troši so v luknjičasti trosovnici spodaj, ki je najprej vijolična in kasneje rjavkasta. Najdena na srednjem delu Otoka.
Popis: 2016

340

Žarolistna kolobarnica
Tricholoma orirubens Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)
goba ima izbočen klobuk z močno podvitim robom, na osredju je rahlo udrta, sivkaste barve in s skoraj črnimi luskami, bet je bel, lističi pa najprej beli in nato sivi. Mikorizna vrsta z listavci, prostotrosnica, troši so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.
Popis: 2016

342

Rumeneča kolobarnica
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)
goba ima sprva stožčast in kmalu sploščen klobuk z majhno grbo na osredju, je siva do sivo rjava, bet je bel, beli lističi pa dobijo ob robu citronsko rumene lise. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, raste ob poteh mešanih gozdov, troši so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.
Popis: 2017



337



338



339



340



341



342

343

Prstena kolobarnica

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.
(1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba ima sprva zvonasto izbočen in kasneje zravn klobuk s podvihanim robom, ki je siv in luskast, bet je bel do siv, lističi pa so sprva beli in kmalu prsteno sivi ter nimajo rumenih odtenkov. Mikorizna vrsta, ki raste v iglastem gozdu, prostotrošnica, trosi pa so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

345

Svetloroba trobljica

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet (1876)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

postrančarke (*Crepidotaceae*)

goba ima sprva polkroglast in nato zravn klobuk lisičje barve ter značilen svetli rob, bet je okrast do lisičje rjavkast, lističi pa so rumeno rjavi. Saprofit in prostotrošnica, ki raste na zdrobljenih lesnih ostankih, trosi so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2014

347

Velika trobljica

Tubaria praestans (Romagn.) M.M. Moser
(1978)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

postrančarke (*Crepidotaceae*)

goba ima sprva polkroglast in nato izbočen klobuk rjasto- do kostanjevo rjave barve, je največja med trobljicami, bet je belkast do rjastorjav, lističi pa so rjaste barve. Saprofit in prostotrošnica, ki raste v močvirnatih in vlažnih predelih in na lesnih koščkih, trosi pa so na lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

344

Rdečkasta trhlenka

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer
(1939)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba ima luskat rdečkast klobuk, sprva ima polkroglasto obliko in kmalu zvonasto, bet je rumen in proti dnu škrlatno luskat, lističi pa so rumeni in zelo gosti. Saprofit in prostotrošnica, ki raste na borovih panjih in koreninah, trosi se nahajajo na lističih pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2015

346

Zimska trobljica

Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon (1973)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

postrančarke (*Crepidotaceae*)

goba ima izbočen do zravn klobuk rdeče rjave barve, bet je tanek in rdeče rjav, lističi pa so skoraj cimetaste barve. Saprofit in prostotrošnica, ki začne rasti že v zimskem času na ostankih lesa in želodov, trosi so na redkih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

348

Velika nožničarka

Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout
& Enderle (1986)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

goba ima belkast do sivkast klobuk jajčasto zvonaste oblike, ki se kmalu razpre, bet je bel in ga v dnu obdaja lupina, lističi pa so rožnati. Saprofit in parazit, prostotrošnica, ki raste na organskih odpadkih v parkih in v vrtovih, trosi so na zelo širokih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016



343



344



345



346



347



348

349

Rdečebetni polstenec*Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara (2008)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima sprva polkroglast in nato izbočen klobuk rjavkaste barve, ki je star blazinast na dotik, bet je na vrhu rumen, proti dnišču je rdeč, luknjice so olivno zelenkaste barve. Mikorizna vrsta uspeva z listavci in iglavci, prostotrosnica, trosi se nahajajo v luknjicah pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2015

351

Zaviti širokolistar*Xerula radicata* (Relhan) Dörfelt (1975)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba ima vdrt sluzast klobuk svetlo rjave ali rumeno rjave barve, ki je sprva stožčast in kasneje sploščen, rjavkast bet je zelo dolg in tanek, lističi so beli. Saprofit, ki raste na razpadajočem lesu in tleh v vseh gozdovih, prostotrosnica, trosi se nahajajo na širokih lističih pod klobukom. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2015

353

Dolgobetna lesenjača*Xylaria longipes* Nitschke (1867)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pečkarice (*Pyrenomycetideae*)

trošnjak je kijasto oblikovan z zaokroženimi konicami, je sprva siv in kmalu črn, meso je belo in trdo kot les, bet je dolg, trosovnica pa je na površini trošnjaka. Saprofit in zaprtotrosnica, trosi se nahajajo na površini gobe, raste na razpadajočem lesu listavcev. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

350

Rdeči polstenec*Xerocomellus rubellus* (Krombh.) Šutara (2008)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima sprva polkrožen rdeč do škrlaten klobuk, ki se počasi ravna in je star polsten, bet je rumen in proti dnišču rdeče črtast, luknjice pa so rumene in z olivnimi odtenki. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, ki raste pod iglavci, trosi so v luknjičasti trosovnici pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2016

352

Vitka lesenjača*Xylaria hypoxylon* (L.) Grev. (1824)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pečkarice (*Pyrenomycetideae*)

goba ima rogljasto oblikovane in sploščene konice, ki so vitke in trde kot les, skoraj cela ali v zgornjem delu in zlasti na konicah je kredasto bela (pokrita s konidiji oz. trosi). Saprofit, ki raste na razpadajočem lesu, zaprtotrosnica, trosi so na zunanji površini konic. Najdena na vzhodnem delu Otoka.

Popis: 2013

354

Kopučasta lesenjača*Xylaria polymorpha* (Pers.) Grev (1824)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

pečkarice (*Pyrenomycetideae*)

goba ima ime po kopuči oz. strnjeni gruči gobic, ki imajo kijasto obliko, gornja stran je zaobljena, je črna, meso pa je belo in trdo, bet je kratek. Saprofit, ki raste na razpadlih štorih in na hlodih listavcev, zaprtotrosnica, trosi so na zunanjem delu gobe. Najdena na zahodnem delu Otoka.

Popis: 2016



349



350



351



352



353



354

PRILOGA

Seznam Zavarovanih vrst gliv in Rdeči seznam gliv Slovenije ter Začasni rdeči seznam ogroženih gliv Evrope

Uredba o zavarovanih prostoživečih vrstah gliv določa **41 zavarovanih vrst gliv**, ki jih je v Sloveniji prepovedano pobirati. Naveden je tudi **Rdeči seznam gliv Slovenije**, ki obsega **111 gliv** in spadajo med ogrožene vrste.

a) Zavarovane vrste gliv po Uredbi o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv

Seznam gliv je objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/2011, dne 22.7.2011. V prilogi uredbe je taksativno naštetih **41 zavarovanih vrst gliv** v Sloveniji. Te so:

1. *Amanita caesarea* (Scop.) Pers. (1801) Link, **Knežja mušnica**,
2. *Amanita strobiliformis* (Paul.) Bertillon, **Velikoluska mušnica**,
3. *Amanita verna* Lam. (1783), **Pomladanska mušnica**,
4. *Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar (1957), **Lepljivi zlatopor**,
5. *Boletus dupainii* Boud. (1902), **Dupainov goban**,
6. *Boletus fragrans* Vittad. (1835), **Dišeči goban**,
7. *Boletus regius* Krombh. (1832), **Kraljevi goban**,
8. *Boletus satanas* Lenz (1831), **Vražji goban**,
9. *Boletus torosus* Fr., **Težki goban**,
10. *Bondarzewia mesenterica* (Schaeff.) Kreisel (1984), **Gorska bondarčevka**,
11. *Buchwaldoboletus hemichrysus* (Berk. & M.A. Curtis) Pilát (1969), **Rumeni privihanec**,
12. *Buchwaldoboletus lignicola* (Kallenb.) Pilát (1969), **Jelov privihanec**,
13. *Calvatia gigantea* (Batsch) Lloyd (1904), **Orjaška plešivka**,
14. *Camarops tubulina* ((Alb. & Schwein.) Shear (1938), **Počrnela bolinka**,
15. *Catathelasma imperiale* (Fr.) Singer (1940), **Kolobarna dvoventnica**,
16. *Clathrus ruber* P. Micheli ex Pers. (1801), **Navadna mrežnica**,
17. *Cortinarius praestans* Cordier (1870), **Nagubana koprenka**,
18. *Dentipellis fragilis* (Pers.) Donk (1962), **Drobljivi kožozob**,
19. *Elaphocordyceps ophioglossoides* (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora, **Kačonova glavatka**,

20. *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst. (1881), **Svetlikava pološčenska,**
21. *Gomphus clavatus* (Pers.) Gray (1821), **Čokata žilolistka,**
22. *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray (1821), **Velika zraščenka,**
23. *Hericium alpestre* Pers. (1825), **Jelkov bradovec,**
24. *Hericium coralloides* (Scop.) Pers. (1794), **Koralasti bradovec,**
25. *Hericium erinaceus* (Bull.) Pers. (1797), **Resasti bradovec,**
26. *Hymenochaete cruenta* (Pers.) Donk (1959), **Rdeča usnjevka,**
27. *Laricifomes officinalis* (Vill.) Kotl. & Pouzar (1957), **Lekarniška macesnovka,**
28. *Leccinellum crocipodium* (Letell.) Bresinsky & Manfr. Binder (2003), **Žlahtni ded,**
29. *Leptoporus mollis* (Pers.) Quél. (1886), **Mehka skutovka,**
30. *Leucopaxillus macrorhizus* (Sacc.) Sacconi & Lazzari (1980), **Glavata velepodvihanka,**
31. *Leucopaxillus tricolor* (Peck) Kühner (1926), **Tribarvna velepodvihanka,**
32. *Mitrula paludosa* Fr. (1816), **Močvirska kapica,**
33. *Phylloporus rhodoxanthus* (Schwein.) Bres. (1900), **Rdeči prekatnik,**
34. *Pluteus hispidulus* (Fr.) Gillet (1876), **Čopasta ščitovka,**
35. *Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr. (1821), **Hrastov luknjičar,**
36. *Porphyrellus porphyrosporus* (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert (1931), **Navadni porfirnik,**
37. *Russula zvarae* Velen. (1922), **Zvarova golobica,**
38. *Tricholoma caligatum* (Viv.) Ricken (1914), **Krokodilja kolobarnica,**
39. *Verpa bohemica* (Krombh.) J. Schröt. (1893), **Češki smrčkovec,**
40. *Verpa digitaliformis* Pers. (1822), **Poveznjeni smrčkovec,**
41. *Vibrissea truncorum* (Alb. & Schwein.) Fr. (1822), **Oranžna potočka.**

Zgoraj omenjene vrste gob je v Sloveniji prepovedano nabirati !

V veljavi je še Uredba o varstvu samoniklih gliv iz Uradnega lista RS, št. 57/1998, objavljena 14.8. 1998, ki opozarja na naslednje:

- prepovedano je namerno uničevanje gob in podgobja ter nabiranje podgobja vseh vrst samoniklih gliv. To so divje rastoče gobe, ki jih najdemo v gozdovih, na travnikih in drugod;
- kdor nabira gobe, mora spoštovati naslednja pravila: goba mora imeti razvidne

tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče zanesljivo določiti vrsto; prepovedana je takšna uporaba pripomočkov za nabiranje gob, ki lahko poškodujejo rastišče ali podgobje; gobe je treba grobo očistiti že na rastišču; gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži;

- v enem dnevu posameznik lahko nabere največ 2 kilograma gob in eno, ki je težja od 2 kg;
- če se pravila ne upoštevajo, so fizične osebe lahko kaznovane z globo.

b) Rdeči seznam gliv Slovenije

Dosegljiv je v Uradnem listu RS, št. 42/2010, dne 28.5.2010. Navezuje se na Zakon o ohranjanju narave in hkrati dopolnjuje »Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam«. Na rdečem seznamu gliv so naslednje vrste gliv:

1. *Amanita caesarea* (Scop.) Pers. (1801), **knežja mušnica**, kategorija ogroženosti: R,
2. *Amanita ovoidea* (Bull.) Link (1833), **jajčasta mušnica**, kategorija ogroženosti: R,
3. *Amanita strobiliformis* (Paulet ex Vittad.) Bertill. (1866), **velikoluska mušnica**, kategorija ogroženosti: R,
4. *Amanita verna* (Bull.) Lam. (1783), **pomladanska mušnica**, kategorija ogroženosti: R,
5. *Antrodia fragrans* (A. David & Torti) A. David & Torti (1986), **dišeča trhlička**, kategorija ogroženosti: R,
6. *Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich (1982), **cvetoča grmulja**, kategorija ogroženosti: R,
7. *Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar (1957), **lepljivi zlatopor**, kategorija ogroženosti: R,
8. *Bankera violascens* (Alb. & Schwein.) Pouzar (1955), **vijoličasta bankera**, kategorija ogroženosti: V,
9. *Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod (1889), **črni gobanovec**, kategorija ogroženosti: R,
10. *Boletus dupainii* Boud. (1902), **dupainov goban**, kategorija ogroženosti: R,
11. *Boletus fragrans* Fr. (1838), **dišeči goban**, kategorija ogroženosti: R,
12. *Boletus regius* Krombh. (1832), **kraljevi goban**, kategorija ogroženosti: R,
13. *Boletus satanas* Lenz (1831), **vražji goban**, kategorija ogroženosti: R,
14. *Boletus torosus* Fr. & Hök (1835), **težki goban**, kategorija ogroženosti: R,
15. *Bondarzewia mesenterica* (Schaeff.) Kreisel (1984), **gorska bondarčevka**, kategorija ogroženosti: R,
16. *Buchwaldoboletus hemichrysus* (Berk. & M.A. Curtis) Pilát (1969), **rumeni privihanec**, kategorija ogroženosti: V,
17. *Buchwaldoboletus lignicola* (Kallenb) Pilát (1969), **jelov privihanec**, kategorija ogroženosti: V,

18. *Calocybe carnea* (Bull.) Donk (1962), **mesnobarvna lepoglavka**, kategorija ogroženosti: V,
19. *Caloscypha fulgens* (Pers.) Boud. (1885), **žareča kupica**, kategorija ogroženosti: V,
20. *Calvatia gigantea* (Batsch.) Lloyd (1904), **orjaška plešivka**, kategorija ogroženosti: R,
21. *Camarops tubulina* (Alb. & Schwein.) Shear (1938), **počrnela bolinka**, kategorija ogroženosti: K,
22. *Catathelasma imperiale* (Fr.) Singer (1940), **kolobarna dvoventčnica**, kategorija ogroženosti: R,
23. *Clathrus ruber* P. Micheli ex Pers. (1801), **navadna mrežnica**, kategorija ogroženosti: R,
24. *Clavaria vermicularis* Scop. (1772), črvičasta kijevka, kategorija ogroženosti: R,
25. *Clitocybe alexandri* (Gillet) Gillet (1884), **zelenikasta livka**, kategorija ogroženosti: R,
26. *Coprinus picacea* (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001), **pisana tintovka**, kategorija ogroženosti: R,
27. *Cortinarius praestans* Cordier (1870), **nagubana koprenka**, kategorija ogroženosti: I,
28. *Dentipellis fragilis* (Pers.) Donk (1962), **drobljivi kožozob**, kategorija ogroženosti: K,
29. *Dermoloma cuneifolium* (Fr.) Singer ex Bon (1986), **klinolistna žametovka**, kategorija ogroženosti: V,
30. *Elaphocordyceps ophioglossoides* (Ehrh.) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora (2007), **kačonova glavatka**, kategorija ogroženosti: K,
31. *Entoloma bloxamii* (Berk. & Broome) Sacc. (1887), **modrikasta rdečelistka**, kategorija ogroženosti: V,
32. *Entoloma incanum* (Fr.) Hesler (1967), **zelenkasta rdečelistka**, kategorija ogroženosti: V,
33. *Entoloma porphyrophaeum* (Fr.) P. Karst (1879), **porfirasta rdečelistka**, kategorija ogroženosti: I,
34. *Entoloma prunuloides* (Fr.) Quél. (1872), **mokarična rdečelistka**, kategorija ogroženosti: I,
35. *Fistulina hepatica* (Schaeff.) With. (1792), **jetrasta cevača**, kategorija ogroženosti: R,
36. *Fomitopsis rosea* (Alb. & Schwein.) P. Karst. (1881), **rožnata kresilača**, kategorija ogroženosti: V,
37. *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst. (1881), **svetlikava pološčenka**, kategorija ogroženosti: R,
38. *Ganoderma pfeifferi* Bres. (1889), **bakrenasta pološčenka**, kategorija ogroženosti: V,
39. *Geoglossum cookeanum* Nannf. (1942), **puhasti jezik**, kategorija ogroženosti: I,
40. *Geoglossum fallax* E.J.Durand (1908), **varljivi jezik**, kategorija ogroženosti: I,
41. *Geoglossum glutinosum* Pers. (1796), **lepljivi jezik**, kategorija ogroženosti: I,
42. *Gomphus clavatus* (Pers.) Gray (1821), **čokata žilolistka**, kategorija ogroženosti: R,
43. *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray (1821), **velika zraščenka**, kategorija ogroženosti: R,
44. *Gyrodon lividus* (Bull.) Fr. (1838), **navadni jelšar**, kategorija ogroženosti: R,
45. *Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr. (1849), **pomladanski hrček**, kategorija ogroženosti: R,
46. *Gyromitra gigas* (Krombh.) Cooke (1878), **orjaški hrček**, kategorija ogroženosti: E,
47. *Gyromitra parma* (J.Breitenb. & Maas Geest.) Kotl. & Pouzar (1974), **ščitasti hrček**, kategorija ogroženosti: E,

48. *Gyroporus castaneus* (Bull.) Quél. (1886), **rjavi bledotrosnik**, kategorija ogroženosti: R,
49. *Gyroporus cyanescens* (Bull.) Quél. (1886), **modreči bledotrosnik**, kateg. ogroženosti: R,
50. *Hapalopilus croceus* (Pers.) Donk (1933), **žafnanasti mehkopor**, kategorija ogroženosti: E,
51. *Hericium alpestre* Pers. (1825), **jelkov bradovec**, kategorija ogroženosti: R,
52. *Hericium coralloides* (Scop.) Pers. (1794), **koralasti bradovec**, kategorija ogroženosti: V,
53. *Hericium erinaceus* (Bull.) Pers. (1797), **resasti bradovec**, kategorija ogroženosti: R,
54. *Hydnellum aurantiacum* (Batsch.) P. Karst. (1879), **oranžna ježevka**, kategorija ogroženosti: R,
55. *Hydnellum caeruleum* (Pers.) P. Karst. (1879), **višnjeva ježevka**, kategorija ogroženosti: R,
56. *Hydnellum compactum* (Pers.) P. Karst. (1879), **klena ježevka**, kategorija ogroženosti: I,
57. *Hydnellum suaveolens* (Scop.) P. Karst. (1879), **vonjava ježevka**, kategor. ogroženosti: V,
58. *Hygrocybe aurantiosplendens* R. Haller Aar.(1954), **oranžnordeča vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
59. *Hygrocybe calyptriformis* (Berk. & Broome) Fayod (1889), **rožnata vlažnica**, kategorija ogroženosti: V,
60. *Hygrocybe citrinovirens* (J.E.Lange) Jul. Schaeff. (1947), **zelenkasta vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
61. *Hygrocybe colemanniana* (A. Bloxam) P.D.Orton & Watling (1969), **rjava vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
62. *Hygrocybe fornicata* (Fr.) Singer (1951), **oblokasta vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
63. *Hygrocybe glutinipes* (J.E.Lange) R. Haller Aar. (1956), **sluzobetna vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
64. *Hygrocybe helobia* (Arnolds) Bon (1976), **močvirska vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
65. *Hygrocybe ingrata* J.P.Jensen & F.H.Møller (1945), **zavržena vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
66. *Hygrocybe intermedia* (Pers.) Fayod (1969), **modrikasta vlažnica**, kategor. ogroženosti: V,
67. *Hygrocybe irrigata* (Pers.) Bon (1976), **orošena vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
68. *Hygrocybe lacmus* (Schumach.) P.D.Orton & Watling (1889), **rožnata vlažnica**, kategorija ogroženosti: V,
69. *Hygrocybe nitrata* (Pers.) Wünsche (1877), **klorova vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
70. *Hygrocybe ovina* (Bull.) Kühner (1926), **ovčja vlažnica**, kategorija ogroženosti: R,
71. *Hygrocybe pratensis* (Pers.) Bon (1976), **travniška vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
72. *Hygrocybe punicea* (Fr.) P.Kumm. (1871), **velika vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
73. *Hygrocybe quieta* (Kühner) Singer (1951), **zažetotrosna vlažnica**, kategor. ogroženosti: I,
74. *Hygrocybe spadicea* (Scop.) P.Karst (1879), **planinska vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
75. *Hygrocybe splendidissima* (P.D.Orton) M.M.Moser (1967), **bleščeča vlažnica**, kategorija

ogroženosti: I,

76. *Hygrocybe vitellina* (Fr.) P.Karst (1879), **rumenjačna vlažnica**, kategorija ogroženosti: I,
77. *Hygrophorus camarophyllus* (Alb. & Scwein.) Dumée, Grandjean & n Maire (1912), **švedska polževka**, kategorija ogroženosti: R,
78. *Hygrophorus capreolarius* Kalchbr., **vinska polževka**, kategorija ogroženosti: R,
79. *Hygrophorus speciosus* Peck (1878), **lepa polževka**, kategorija ogroženosti: R,
80. *Hymenochaete cruenta* (Pers.) Donk (1959), **rdeča usnjevka**, kategorija ogroženosti: K,
81. *Lactarius lilacinus* (Lasch) Fr. (1838), **lilasta mlečnica**, kategorija ogroženosti: V,
82. *Lactarius musteus* Fr. (1838), **moštna mlečnica**, kategorija ogroženosti: V,
83. *Laricifomes officinalis* (Vill.) Kotl. & Pouzar (1957), **lekarniška macesnovka**, kategorija ogroženosti: E,
84. *Leccinum crocipodium* (Letell.) Bresinsky & Manfr. Binder (2003), **žlahtni dedek**, kategorija ogroženosti: I,
85. *Leccinum holopus* (Rostk.) Watling (1960), **beli ded**, kategorija ogroženosti: R,
86. *Leccinum thalassinum* Pilat & Dermek (1974), **modrinasti ded**, kategorija ogroženosti: V,
87. *Leptoporus mollis* (Pers.) Quél. (1886), **mehka skutovka**, kategorija ogroženosti: K,
88. *Leucopaxillus macrorhizus* (Lasch) Sacconi & Lazzari (1980), **glavata velepodvihanka**, kategorija ogroženosti: R,
89. *Leucopaxillus tricolor* (Peck) Kühner (1926), **tribarvna velepodvihanka**, kategorija ogroženosti: R,
90. *Mitrula paludosa* Fr. (1816), **močvirska kapica**, kategorija ogroženosti: K,
91. *Phylloporus rhodoxanthus* (Schwein.) Bres. (1900), **rdeči prekatnik**, kategorija ogroženosti: R,
92. *Phyllotopsis nidulans* (Pers.) Singer (1936), **gnezdasti listar**, kategorija ogroženosti: E,
93. *Pluteus hispidulus* (Fr.) Gillet (1876), **čopasta ščitovka**, kategorija ogroženosti: K,
94. *Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr. (1821), **hrastov luknjičar**, kategorija ogroženosti: R,
95. *Porphyrellus porphyrosporus* (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert (1931), **navadni porfirnik**, kategorija ogroženosti: R,
96. *Pseudoinonotus dryadeus* (Pers.) T.Wagner & M.Fisch. (2001), **roseči luknjevec**, kategorija ogroženosti: V,
97. *Pseudoplectania vogesiaca* (Pers.) Seaver (1928), **vogeška polpletenka**, kategorija ogroženosti: R,
98. *Pycnoporellus fulgens* (Fr.) Donk (1971), **bliskov gostoluknjičar**, kategorija ogroženosti: R,
99. *Russula rhodopoda* Zvára (1927), **rdečebetna golobica**, kategorija ogroženosti: R,
100. *Russula seperina* Dupain (1913), **istrska golobica**, kategorija ogroženosti: V,
101. *Russula zvarae* Velen. (1922), **zvarova golobica**, kategorija ogroženosti: K,
102. *Sarcodon joeides* (Pass.) Battaille (1924), **nenavadni ježevec**, kategorija ogroženosti: V,

103. *Suillus flavidus* (Fr.) J. Presl (1846), **rumena lupljivka**, kategorija ogroženosti: V,
104. *Suillus tridentinus* (Bres.) Singer (1945), **tridentinska lupljivka**, kategorija ogroženosti: R,
105. *Tricholoma apium* Jul. Schäff. (1925), **začimbena kolobarnica**, kategorija ogroženosti: R,
106. *Tricholoma caligatum* (Viv.) Ricken (1914), **krokodilja kolobarnica**, kategorija ogroženosti: R,
107. *Tricholosporum goniospermum* (Bres.) Guzman ex T.J. Baroni (1982), **navadna križnotrosnica**, kategorija ogroženosti: R,
108. *Verpa bohemica* (Krombh.) J. Schroet. (1893), **češki smrčkovec**, kategorija ogroženosti: I,
109. *Verpa digitaliformis* Pers. (1822), **poveznjeni smrčkovec**, kategorija ogroženosti: K,
110. *Vibrissea truncorum* (Alb. & Schwein.) Fr. (1822), **oranžna potočka**, kategorija ogroženosti: K,
111. *Volvariella bombycina* (Schaeff.) Singer (1951), **svilasta nožničarka**, kategorija ogroženosti: R.

Velike črke na koncu vrste z imeni gliv označujejo kategorije ogroženosti po IUCN (1972), njihov pomen pa je naslednji:

E (Endangered) - **prizadeta vrsta**. V to skupino sodijo najbolj ogrožene vrste. Njihova številčnost upada in ob nadaljevanju vzrokov ogroženosti lahko izumrejo.

V (Vulnerable) - **ranljiva vrsta**. Ranljive vrste so sestavni del biotopov, katerih ekološko ravnotežje je občutljivo že na manjše človekove vplive (npr. mrazišča, močvirja, topli izviri, barja). Z neprimernim poseganjem v biotop lahko posredno uničimo glive.

R (Rare) - **redka vrsta**. Glive, ki niso neposredno ogrožene, njihovo pojavljanje pa je zanesljivo v največ petih kvadrantih srednjeevropskega kartiranja; velikost kvadranta je 5,8 x 5,6 km (v Sloveniji je 613 kvadrantov); obravnavamo jih kot redke. Kadar ugotovimo, da so ogrožene, jih uvrstimo v eno od prejšnjih kategorij, sicer pa njihovo številčnost le spremljamo, da smo ob dejanski ogroženosti pripravljeni za varstveno ukrepanje.

K (Insufficiently Known) - **nezadostno znana vrsta**. Pomožna kategorija, ki vključuje vrste, za katere obstaja možnost, da pripada eni izmed kategorij ogroženosti, vendar je na razpolago premalo podatkov za zanesljivo varstveno opredelitev. V to skupino so uvrščene vrste, za katere je na razpolago premalo podatkov za opredelitev ogroženosti.

I - **neopredeljena vrsta**. Kategorija ogroženosti v katero se uvrstijo vrste, za katere se domneva, da so ogrožene na območju Slovenije, vendar je na razpolago premalo podatkov, da bi jih lahko uvrstili v eno od kategorij ogroženosti, navedenih zgoraj.

Na koncu bi na kratko predstavili še mednarodna združenja, ki skrbijo za varovanje gliv. Eno takih je **Evropsko združenje za varstvo gliv** (ECCF – European Council for the Conservation of Fungi). *Oceno ogroženost posameznih vrst določajo posamezna merila Svetovne zveze za varstvo narave* - IUCN (International Union for the Conservation of Nature). IUCN je bila ustanovljena leta 1948 pod imenom *International Union for*

Protection of Nature (IUPN), leta 1956 se je preimenovala v *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*, od zasedanja Generalne skupščine leta 1990 v Perthu (Avstralija) pa se vedno bolj uveljavlja krajši opisni naslov *The World Conservation Union*. Kratica IUCN se s tem ne spreminja. Slovenija je članica IUCN od leta 1993. Vanjo je včlanjena *Agencija RS za okolje* kot vladna agencija. Posamezniki tvorno sodelujejo v različnih komisijah (zlasti v *WCPA*, *SSC*, *CEC*).

c) **Začasni rdeči seznam ogroženih gliv Evrope**

V začasnem rdečem seznamu ogroženih gliv Evrope, *Towards a Red List of Endangered European Macrofungi*. - In: Pegler, D. (ed.): *Fungi of Europe, Investigation, Recording and Conservation*. The Royal Botanic Gardens, Kew. (Ing, 1993), so glive razdeljene, glede na stopnjo ogroženosti, v štiri skupine:

- (1) **skupina A** – vrste gliv, katerih populacije se hitro zmanjšujejo na celotnem ozemlju Evrope; v mnogih državah so glive skupine A že izumrle, zato je tem glivam treba posvetiti posebno pozornost;
- (2) **skupina B** – postopno zmanjševanje populacij v celotni Evropi; ponekod jim grozi izumrtje, zato jim je nujno posvetiti zmerno pozornost;
- (3) **skupina C** – splošno zmanjševanje številčnosti, razdrobljene populacije; skrb za njihovo varovanje je v primerjavi s prvima dvema skupinama gliv manjše;
- (4) **skupina D** – zmanjševanje populacij v nekaterih območjih; možna so lokalna izumrtja nekaterih vrst iz te skupine, vendar predvsem na robu razširjenosti posameznih vrst.

Skupina A:

Št.	Latinsko ime
1.	<i>Bankera fuligineoalba</i>
2.	<i>Boletopsis leucomelaena</i>
3.	<i>Boletus junquilleus</i>
4.	<i>Boletus regius</i>
5.	<i>Boletus rhodoxanthus</i>
6.	<i>Boletus satanas</i>
7.	<i>Cotylidia pannosa</i>
8.	<i>Geastrum campestre</i>
9.	<i>Geastrum fornicatum</i>
10.	<i>Geoglossum peckianum</i> (difforme)
11.	<i>Gomphus clavatus</i>
12.	<i>Hapalopilus</i> (<i>Aurantioporus</i>) <i>croceus</i>
13.	<i>Hygrocybe spadicea</i>
14.	<i>Hydnellum ferrugineum</i>

15.	Phellodon confluens
16.	Poronia punctata

Skupina B:

Št.	Latinsko ime
1.	Aleurodiscus disciformis
2.	Armillaria ectypa
3.	Boletus fechtneri
4.	Boletus impolitus
5.	Boletus queletii
6.	Bovista limosa
7.	Bovista paludosa
8.	Bovistella radicata
9.	Buglossoporus pulvinus
10.	Catathelasma imperiale
11.	Chamaemyces fracidus
12.	Cortinarius bulliardii
13.	Cortinarius violaceus
14.	Disciseda bovista
15.	Disciseda candida
16.	Entoloma bloxamii (madidum)
17.	Fomitopsis rosea
18.	Geastrum berkeleyi
19.	Geastrum corollinum (recolligens)
20.	Geastrum elegans (badium)
21.	Geastrum schmidelii (nanum)
22.	Geoglossum simile
23.	Hericius erinaceus
24.	Hydnellum aurantiacum
25.	Hydnellum caeruleum
26.	Hydnellum peckii
27.	Hydnellum scrobiculatum
28.	Hygrocybe aurantiosplendens
29.	Hygrocybe lacmus
30.	Hygrocybe ovina
31.	Hygrocybe perplexa (sciophana)
32.	Hygrocybe radiata
33.	Hygrophorus mesotephurus
34.	Hygrophorus pudorinus

35.	Hygrophorus russula
36.	Lactarius mairei
37.	Lactarius musteus
38.	Leucopaxillus tricolor
39.	Lopharia spadicea
40.	Lycoperdon caudatum (pedicellatum)
41.	Melanophyllum eyrei
42.	Microglossum olivaceum
43.	Myriostoma coliforme
44.	Onnia tomentosa
45.	Phellodon niger
46.	Phellodon tomentosus
47.	Phylloporus rhodoxanthus
48.	Polyporus umbellatus
49.	Porpoloma spinulosum
50.	Pseudorhizina sphaerospora
51.	Pulveroboletus gentilis (craesinus)
52.	Pulveroboletus lignicola
53.	Ramariopsis crocea
54.	Rhodotus palmatus
55.	Russula pumila
56.	Sarcodon fuligineoviolaceus
57.	Sarcodon glaucopus
58.	Sarcodon scabrosus
59.	Sarcosoma globosum
60.	Spathularia flavida
61.	Suillus flavidus
62.	Thuemenidium atropurpureum
63.	Tricholoma acerbum
64.	Tricholoma apium
65.	Tricholoma aurantium
66.	Tricholoma colossus

Skupina C:

Št.	Latinsko ime
1.	Agrocybe firma
2.	Amanita franchetii (aspera)
3.	Amanita friabilis
4.	Astraeus hygrometricus

5.	<i>Boletinus cavipes</i>
6.	<i>Boletus aereus</i>
7.	<i>Boletus appendiculatus</i>
8.	<i>Boletus fragrans</i>
9.	<i>Boletus radicans</i> (albidus)
10.	<i>Caloscypha fulgens</i>
11.	<i>Camarophylloopsis schulzeri</i>
12.	<i>Cantharellus cinereus</i>
13.	<i>Camarops tubulina</i>
14.	<i>Clavaria zollingeri</i>
15.	<i>Climacodon septentrionalis</i>
16.	<i>Clitocybe josserandii</i>
17.	<i>Coltricia cinnamomea</i>
18.	<i>Cordyceps capitata</i>
19.	<i>Coriolopsis gallica</i>
20.	<i>Cortinarius anthracinus</i>
21.	<i>Cortinarius canabarpa</i>
22.	<i>Cortinarius cinnabarinus</i>
23.	<i>Cortinarius cyanites</i>
24.	<i>Cortinarius orellanus</i>
25.	<i>Cortinarius praestans</i>
26.	<i>Cortinarius sebaceus</i>
27.	<i>Cortinarius sodagnitus</i>
28.	<i>Cudonia circinans</i>
29.	<i>Cyathus stercoreus</i>
30.	<i>Dentipellis fragilis</i>
31.	<i>Dichomitus campestris</i>
32.	<i>Entoloma euchroum</i>
33.	<i>Entoloma excentricum</i>
34.	<i>Entoloma griseocyaneum</i>
35.	<i>Entoloma prunuloides</i>
36.	<i>Entoloma roseum</i>
37.	<i>Funalia trogii</i>
38.	<i>Galerina stagnina</i>
39.	<i>Ganoderma pfeifferi</i>
40.	<i>Ganoderma resinaceum</i>
41.	<i>Geastrum coronatum</i>
42.	<i>Geastrum floriforme</i>
43.	<i>Geastrum melanocephalum</i>
44.	<i>Geastrum minimum</i>

45.	<i>Geastrum pectinatum</i>
46.	<i>Geastrum quadrifidum</i>
47.	<i>Geastrum rufescens (vulgatum)</i>
48.	<i>Geastrum striatum</i>
49.	<i>Geoglossum fallax</i>
50.	<i>Geoglossum glutinosum</i>
51.	<i>Geoglossum umbratile (nigritum)</i>
52.	<i>Gomphidius maculatus</i>
53.	<i>Grifola frondosa</i>
54.	<i>Gyromitra gigas</i>
55.	<i>Haploporus odorus</i>
56.	<i>Hericium clathroides</i>
57.	<i>Hydnellum compactum</i>
58.	<i>Hydnellum concrescens</i>
59.	<i>Hydnellum spongiosipes</i>
60.	<i>Hygrocybe fornicata</i>
61.	<i>Hygrocybe ingrata</i>
62.	<i>Hygrocybe insipida</i>
63.	<i>Hygrocybe intermedia</i>
64.	<i>Hygrocybe lepida (cantharellus)</i>
65.	<i>Hygrocybe obrussea (quieta)</i>
66.	<i>Hygrocybe nitrata (murinacea)</i>
67.	<i>Hygrocybe punicea</i>
68.	<i>Hygrocybe subglobispora</i>
69.	<i>Hygrocybe unguinosa</i>
70.	<i>Hygrophorus arbustivus</i>
71.	<i>Hygrophorus calophyllus</i>
72.	<i>Hygrophorus camarophyllus</i>
73.	<i>Hygrophorus gliocyclus (ligatus)</i>
74.	<i>Hygrophorus hypothejus (aureus)</i>
75.	<i>Hygrophorus nemoreus</i>
76.	<i>Hygrophorus purpurascens</i>
77.	<i>Hypocreopsis lichenoides</i>
78.	<i>Inocybe godeyi</i>
79.	<i>Inonotus hispidus</i>
80.	<i>Ischnoderma resinosum</i>
81.	<i>Lactarius acris</i>
82.	<i>Lactarius aspideus</i>
83.	<i>Lactarius controversus</i>
84.	<i>Lactarius hyginus</i>

85.	<i>Lactarius resimus</i>
86.	<i>Lactarius violascens</i>
87.	<i>Laricifomes officinalis</i>
88.	<i>Lentinellus ursinus</i>
89.	<i>Lentinus adhaerens</i>
90.	<i>Lepiota cortinarius</i>
91.	<i>Lepiota fuscovinacea</i>
92.	<i>Lepiota grangei</i>
93.	<i>Lepiota pseudofelina</i>
94.	<i>Leucocortinarius bulbiger</i>
95.	<i>Leucopaxillus gentianeus</i>
96.	<i>Limacella glioderma</i>
97.	<i>Limacella guttata</i>
98.	<i>Lycoperdon mammiforme</i>
99.	<i>Lycoperdon marginatum</i>
100.	<i>Lyophyllum transforme</i>
101.	<i>Marasmius hudsonii</i>
102.	<i>Microglossum viride</i>
103.	<i>Mutinus caninus</i>
104.	<i>Mycenastrum corium</i>
105.	<i>Omphalina sphagnicola</i>
106.	<i>Omphalotus olearius</i>
107.	<i>Onygena equina</i>
108.	<i>Otidea concinna</i>
109.	<i>Oudemansiella (Xerula) pudens</i>
110.	<i>Perenniporia fraxinea</i>
111.	<i>Phellodon melaleucus</i>
112.	<i>Phyllotus (pleurocybella) porrigens</i>
113.	<i>Pisolithus arhizus (arenarius)</i>
114.	<i>Pluteus aurantiorugosus</i>
115.	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>
116.	<i>Porpoloma metapodium</i>
117.	<i>Psathyrella caput-medusae</i>
118.	<i>Pulcherricium (Terana) coeruleum</i>
119.	<i>Ramaria botrytis</i>
120.	<i>Ramaria formosa</i>
121.	<i>Ramariopsis pulchella</i>
122.	<i>Russula minutula</i>
123.	<i>Sarcodon imbricatus</i>
124.	<i>Sarcodon leucopus</i>

125.	<i>Scytinostroma portentosum</i>
126.	<i>Sparassis laminosa</i>
127.	<i>Strobilomyces floccopus</i>
128.	<i>Stropharia albocrenulata</i>
129.	<i>Trametes suaveolens</i>
130.	<i>Trichoglossum hirsutum</i>
131.	<i>Trichoglossum variabile</i>
132.	<i>Tricholoma focale</i>
133.	<i>Tricholoma sejunctum</i>
134.	<i>Tricholoma squarrulosum</i>
135.	<i>Tulostoma brumale</i>
136.	<i>Tulostoma fimbriatum</i>
137.	<i>Tulostoma melanocyclum</i>
138.	<i>Tyromyces (Aurantioporus) fissilis</i>
139.	<i>Urnula craterium</i>
140.	<i>Urnula hiemalis</i>
141.	<i>Verpa conica</i>
142.	<i>Vibrissea truncorum</i>
143.	<i>Volvariella bombycina</i>
144.	<i>Volvariella caesiotincta</i>
145.	<i>Xylobolus frustulatus</i>

Skupina D:

Št.	Latinsko ime
1.	<i>Albatrellus ovinus</i>
2.	<i>Albatrellus (Scutiger) pes-caprae</i>
3.	<i>Amanita caesarea</i>
4.	<i>Amylocystis lapponica</i>
5.	<i>Antrodia crassa</i>
6.	<i>Battarrea phalloides</i>
7.	<i>Boletus torosus</i>
8.	<i>Bovista graveolens</i>
9.	<i>Clavariadelphus truncatus</i>
10.	<i>Cortinarius cedretorum</i>
11.	<i>Cortinarius scaurus</i>
12.	<i>Cotylidia undulata</i>
13.	<i>Dermoloma josserandii</i>
14.	<i>Entoloma hirtum</i>
15.	<i>Floccularia straminea</i>

16.	<i>Geastrum hungaricum</i>
17.	<i>Geastrum saccatum</i>
18.	<i>Geastrum triplex</i>
19.	<i>Geoglossum sphagnophilum</i> (glabrum)
20.	<i>Gloeoporus dichrous</i>
21.	<i>Hohenbuehelia longipes</i>
22.	<i>Holwaya mucida</i>
23.	<i>Hygrophorus marzuolus</i>
24.	<i>Hygrophorus poetarum</i>
25.	<i>Inonotus dryophilus</i>
26.	<i>Laurilia sulcata</i>
27.	<i>Lentinellus vulpinus</i>
28.	<i>Lepiota lignicola</i>
29.	<i>Lindtneria trachyspora</i>
30.	<i>Montagnea arenaria</i>
31.	<i>Multiclavula mucida</i>
32.	<i>Phellinus tremulae</i>
33.	<i>Pholiota squarrosoides</i>
34.	<i>Piptoporus pseudobetulinus</i>
35.	<i>Pulveroboletus hemichrysus</i>
36.	<i>Pycnoporellus alboluteus</i>
37.	<i>Ramaria fagetorum</i>
38.	<i>Russula aquosa</i>
39.	<i>Russula borealis</i>
40.	<i>Russula helodes</i>
41.	<i>Sarcodon joeides</i>
42.	<i>Sarcodon martioflavus</i>
43.	<i>Sarcodontia crocea</i>
44.	<i>Squamanita schreieri</i>
45.	<i>Steccherinum robustius</i>
46.	<i>Stereopsis vitellina</i>
47.	<i>Thuemenidium</i> (<i>Geoglossum</i>) <i>arenarium</i>
48.	<i>Torrendia pulchella</i>
49.	<i>Tulostoma niveum</i>
50.	<i>Tyromyces</i> (<i>Loweomyces</i>) <i>fractipes</i>
51.	<i>Tyromyces placenta</i>

Literatura in viri informacij

1. Damjan, D. (2010): **Mariborski otok**. Samozaložba, Kamnica.
2. Ing, B. (1993): **Towards a Red List of Endangered European Macrofungi**. - In: Pegler, D. (ed.): Fungi of Europe, Investigation, Recording and Conservation. The Royal Botanic Gardens, Kew.
3. Jurc, D., Piltaver, A., Ogris, N. (2005): **Glive Slovenije. Vrste in razširjenost**. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.
4. Jurc, D. et al. (2013): **Možnosti in omejitve pri nabiranju gob v gozdovih in razvoj gomoljkarstva v Sloveniji**, Gozdarski Inštitut Slovenije, Inštitut za sistematiko višjih gliv, Kmetijski inštitut, Mikološka zveza Slovenije, Ljubljana.
5. Kaligarič, M., Bakan, B. (2009): **Rastline Mariborskega otoka. Mestna občina, Maribor**.
6. Knez, A., Gostenčnik, M., Blažič, K. (2010): **Kopališče Mariborski otok nekoč, danes, jutri. Bilten ob 80-letnici kopališča mariborski otok**. Hopa, d.o.o., Maribor.
7. Poler, A. (1990): **Gremo po gobe!** Založba Obzorja, Maribor.
8. Poler, A. (1986): **Nabirajmo užitne gobe. ČZP Kmečki glas, Ljubljana**.
9. Poler, A. (1986): **Obvarujmo se strupenih gob**. Založba Obzorja, Maribor.
10. Poler, A., Vrščaj, D., Boh, A. (1998): **Seznam gliv Slovenije**. Zveza gobarskih društev Slovenije, Ljubljana.
11. Poler, A. (1996): **Sistemska razvrstitev gliv**. Skripta za determinatorje. Osebna objava.
12. Poler, A. (2002): **Veselo po gobe**. Mohorjeva družba, Celovec.
13. Šerod, S., Piltaver, A. (2009): **Glive travniških površin kot bioindikator za ohranjanje biodiverzitete**. Brošura. Cinkarna Celje d.d., Celje.
14. Šerod, S., Arzenšek, B., Piltaver, A., Poler, A., Javornik, J., Boh, A., Ivanovič, A. (2013): **Operativni seznam gliv Slovenije**. Mikološka zveza Slovenije, Ljubljana.
15. **Gozdarski vestnik**. (teme o gobah)
16. **Vodič – Razstava svežih gob**. (1985): Brošura. Gobarska družina Maribor, Maribor
17. **Zloženka Naravoslovna pot Mariborski otok**, (2013): Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave.
18. **Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot**. (Ur.l. RS, št. 111/04, 70/06).
19. **Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam**. (Ur.l.

RS, št. 82/02).

20. **Uredba o varstvu samoniklih gliv.** (Ur.l. RS, št. 57/98).
21. **Uredba o zavarovanih prstoživečih vrstah gliv.** (UL RS št. 58/2011).
22. **Uredba o ekološko pomembnih območjih.** (Ur.l. RS, št. 48/04).
23. **Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).** (Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08).
24. **Zakon o ohranjanju narave.** (Ur.L. RS, št. 96/04).
25. **Zakon o gozdovih.** (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON in 67/02).
26. **Fotografije gliv v brošuri iz drugih spletnih virov:**
Antrodia ramentacea, www.funghiitaliani.it
Aurantioporus croceus, www2.nrm.se
Callistosporium olivascens, www.naturamediterraneo.com
Coprinellus ephemerus, pacobarrajon.com
Coprinus marculentus, www.123pilze.de
Cortinarius rufo-olivaceus, www.gobenabovskem.si
Entoloma conferendum, www.first-nature.com
Entoloma excentricum, www.bing.com
Gymnopus brassicolens, www.123pilze.de
Hebeloma hiemale, www.mushroomexpert.com
Hebeloma versipelle, users.skynet.be
Hemimycena cucullata, funghiteramani.blogspot.com
Inocybe adaequata, www.mykoweb.com
Inocybe corydalina, hu.wikipedia.org
Inocybe godeyi, www.biolib.cz
Inocybe napipes, www.biopix.com
Inocybe obscurobadia, www.funghiitaliani.it
Inocybe phaeodisca, www.asturnatura.com
Inocybe pyriodora, www.mykoweb.com
Lentinellus ursinus, www.messiah.edu
Lepiota oreadiformis, www.damyko.info
Marasmius anomalus, www.discoverlife.org
Melanophyllum haematospermum, www.mykoweb.com
Mollisia cinerea, www.mykoweb.com
Mycoacia uda, gribisrael.narod.ru
Panaeolus fimicola, www.shroomery.org
Pholiotina teneroides, www.mycodb.fr
Pluteus ephebeus, www.mykologie.net
Pluteus plautus, www.inaturalist.org

Polyporus arcularius, www.anbg.gov.au

Rickenella swartzii, www.mykoweb.com

Russula pectinata, 1.bp.blogspot.com

Tephrocybe atrata, 4.bp.blogspot.com

Thelephora caryophyllea, www.fungoceva.it

Tubaria praestans, asociacionvallisoletanademicologia.com

26. **Informacije o Mariborskem otoku**, sl.wikipedia.org

27. **Spletna stran Gobarskega društva Lisička Maribor**, www.gobe.si

28. **Zloženke učnih poti Uršank in Bolfenk**. Dostopne na spletnih straneh
www.gobe.si

Kazalo vrst

Agaricus essettei 36

- moelleri 36

- semotus 36

- sylvicola 36

Amanita citrina 36

- pantherina 36

- phalloides 38

- strobiliformis 38

- vaginata 38

Antrodia ramentacea 38

Antrodiella fragrans 38

- hoehnelii 38

- semisupina 40

apnenka, papirasta 148

Armillaria borealis 40

- cepistipes 40

- gallica 40

- mellea 40

- ostoyae 40

Artomyces pyxidatus 42

Ascocoryne sarcoides 42

Atheniella flavoalba 42

Aurantioporus croceus 42

Auricularia auricula-judae 42

- mesenterica 42

Auriscalpium vulgare 44

belka, navadna 64

Bisporella citrina 44

Bjerkandera adusta 44

- fumosa 44

bjerkandera, čokata 44

- osmojena 44

blazinovec, hrastov 64

bledivka, rdečkasta 94

bledotrosnik, rjavi 76

Boletus calopus 44

- luridus 44

- pulverulentus 46

- reticulatus 46

Bovista dermoxantha 46

bradavička, cinobrista 114

Callistosporium olivascens 46

Calocera cornea 46

Calocybe gambosa 46

cepilistka, navadna 138

Ceratiomyxa fruticulosa 48

Cerrena unicolor 48

Chamaemyces fracidus 48

Chlorociboria aeruginascens 48

Chroogomphus rutilus 48

Ciboria batschiana 48

Clavulina coralloides 50

Climacocystis borealis 50

Clitocybe angustissima 50

- augeana 50

- dealbata 50

- gibba 50

- odora 52

- phaeophthalma 52

Clitopilus prunulus 52

- scyphoides 52

Coprinellus disseminatus 52

- ephemerus 52

- micaceus 54

Coprinopsis atramentaria 54

- lagopus 54

- picacea 54

Coprinus comatus 54

- impatiens 54

- marculentus 56

- silvaticus 56

Cortinarius anomalus 56

- anserinus 56

- decipiens 56

- elegantissimus 56

- fulgens 58

- glaucopus 58
- hinnuleus 58
- incisus 58
- infractus 58
- purpurascens 58
- purpurascens var.
 largosuides 60
- rufo-olivaceus 60
- sodagnitus 60
- talus 60
- venetus 60
- Crepidostus mollis 60
- variabilis 62
- Crucibulum laeve 62
- Cylindrobasidium evolvens 62

- čašica, škrlatna 138
- čeladica, bučikasta 108
- ivjebetna 110
- krvobetna 110
- lasastobetna 108
- mlečna 110
- nagubana 110
- navadna 112
- redkvičasta 112
- Renejeva 112
- sivorjava 108
- skorjina 110
- strupena 112
- zefirna 112
- žoltosočna 110
- čeladka, voskasta 42
- česnovka, dolgobetna 112
- črnilovka, bombažnata 114
- zgubana 114
- črnivec, kosmati 94
- črnilovka, dimastolistna 130
- ljubka 130
- sivorjava 130
- sloka 128

- stonoga 130
- vinskiordeča 128
- zbledela 128
- Dacrymyces palmatus 62
- stillatus 62
- Daedaleopsis confragosa 62
- tricolor 64
- Daldinia concentrica 64
- Datronia mollis 64
- Delicatula integrella 64
- dežniček, gladki 98
- parkovni 98
- smrdljivi 98
- zoprni 98
- kostanjasti 98
- Diatrype stigma 64
- Dichomitus campestris 64
- drhtavka, listasta 146
- rumena 148
- Dumontinia tuberosa 66
- dvotroska, rumena 44
- Echinoderma asperum 66
- echinaceum 66
- hystrix 66
- Entoloma conferendum 66
- excentricum 66
- nitidum 68
- rhodopolium 68
- rhodopolium f.
 nidosum 68
- sericeum 68
- turbidum 68
- Exidia glandulosa 68
- Exidiopsis calcea 70
- Flammulina velutipes 70
- Fomes fomentarius 70
- Fomitiporia punctata 70
- robusta 70

Fomitopsis pinicola 70

Funalia gallica 72

Ganoderma applanatum 72

Geastrum quadrifidum 72

- triplex 72

glivopor, hrastov 70

- ploščati 70

Gloeophyllum sepiarium 72

- trabeum 72

goban, leponogi 44

- poletni 46

- spreminjavi 46

- svinjski 44

golobica, baržunasta 136

- borova 134

- črneča 136

- grebenasta 136

- malinova 138

- mlečnobela 136

- modrolistna 134

- ozkolistna 134

- razbarvana 134

- rjavobetna 136

- rjavozelena 136

- smrdljiva 134

- sončna 138

- vabljiva 132

- vonjava 134

gologlavka, modrobetna 130

Gomphidius glutinosus 74

- maculatus 74

gostolistka, črtasta 106

- navadna 106

- ozkobetna 106

govnar, gnojiščni 114

- koničasti 114

- pisani 116

govnarka, košenična 114

grahovka, razbarvana 100

grivača, grebenasta 50

grmulja, cvetoča 42

Gymnopilus hybridus 74

- junoninus 74

Gymnopus alkalivirens 74

- brassicolens 74

- foetidus 76

- dryophilus 76

- erythropus 76

- hariolorum 76

Gyroporus castaneus 76

Hebeloma crustuliniforme 76

- hiemale 78

- leucosarx 78

- longicaudum 78

- mesophaeum 78

- sinapizans 78

- vaccinum 78

- versipelle 80

Helvella crispa 80

- ephippium 80

Hemimycena cucullata 80

- lactea 80

Heterobasidion annosum 80

hladetinka, paličasta 48

Hygrocybe conica 82

Hygrophorus carpini 82

- cossus 82

- eburneus 82

- poetarum 82

Hymenochaete corrugata 82

- rubiginosa 84

Hyphoderma radula 84

Hyphodontia quercina 84

Hypholoma fasciculare 84

- fasciculare var.

pusillum 84

- sublateritium 84

Hypoxylon fragiforme 86

- fuscum 86

- multiforme 86

iglovka, rumena 114

Inocybe abjecta 86

- acuta 86

- adaequata 86

- aghardii 88

- albomarginata 88

- asteospora 88

- bongardii 88

- corydalina 88

- dulcamara 88

- godeyi 90

- hirtella 90

- maculata 90

- mixtilis 90

- napipes 90

- obscurobadia 90

- petiginosa 92

- phaeodisca 92

- pyriodora 92

- rimosa 92

- squamata 92

- umbratica 92

Inonotus nodulosus 94

kadilček, mali 46

kelihovec, želodov 48

kolesnica, bledovijoličasta 98

- poprova 100

- umazana 100

- vijoličasta 100

kolobarnica, kraška 148

- pegasta 148

- prstena 150

- rumeneča 148

- žarolistna 148

koprenka, beneška 60

- gležnjasta 60

- goljufiva 56

- jelenčja 58

- kolobarniška 58

- lužninska 60

- nepravilna 56

- razcepljena 58

- scefrana 58

- sladkobna 56

- škrlateča 58

- škrlateča, kijasti različek 60

- Vrščajeva 60

- zala 56

- žareča 58

korenarka, pegasta 132

- spotegnjena, zasukani raz. 132

- žaltava, roženosiva oblika 130

korenovec, črni 74

- sehlični

- smradni

- zeljarski 74

- vitki

kostenelka, brezlična 140

kresilača, smrekova 70

kresilka, bukova 70

Kretzschmaria deusta 94

kukmak, hostni 36

- Moellerjev 36

- odsekani 36

- pritlikavi 36

Laccaria laccata 94

Lacrymaria lacrymabunda 94

Lactarius acerrimus 94

- deterrimus 94

- evosmus 96

- pyrogalus 96

- uvidus 96

- zonarius 96

Lentinellus ursinus 96

Lenzites betulina 96

lesenjača, vitka 152

- dolgobetna 152

- kopučasta 152

lenzovka, brezova 96

Lepiota castanea 98

- cristata 98

- cristatoides 98

- josserandii 98

- oreadiformis 98

Lepista glaucocana 98

- nuda 100

- ricekii 100

- sordida 100

lepoglavec, modrikasti 132

lepoglavka, majniška 46

livka, janeževa 52

- pobeljena 50

- rjavkasta 50

- vlažnoroba 50

- vodenasta 52

- vrtnarska 50

lojevka, bela 70

lonček, navadni 62

lončevka, sivkasta 108

loputar, jesenski 80

- sedlasti 80

luknjač, grčavi 94

luknjičar, gomoljavi 126

- raznolični 126

- rombasti 124

- satjasti 126

- ščetinasti 126

- zimski 126

lupinar, sivi 38

lupljivka, ovčarska 142

luskinček, žlebičasti 120

Lycogala epidendrum 100

Lycoperdon perlatum 100

- pratense 100

- pyriforme 102

- umbrinum 102

Lyophyllum connatum 102

- decastes 102

- fumosum 102

- immundum 102

- loricatum 104

mahoživka, dvobarvna 132

Marasmius anomalus 104

- cohaerens 104

- torquescens 104

- wynnei 104

medlenka, dolgobetna 78

- dvobarvna 78

- luskobetna 80

- redkvičasta 78

- solzeča 76

- toporoba 78

- vrbina 78

- zimska 78

Megacollybia platyphylla 104

Melanoleuca grammopodia 106

- melaleuca 106

- pseudoluscina 106

Melanophyllum

haematospermum 106

Melogramma spiniferum 106

Meripilus giganteus 106

Merulius tremellosus 108

mlečnica, kolobarčasta 96

- kratkobetna 94

- leskina 96

- sluzasta 96

- vonjava 96

Mollisia cinerea 108

mokarica, drobna 52

- navadna 52

Morchella esculenta 108

mraznica, čebulasta 40

- črnomekinasta 40

- rumenovenčna 40

- severnjaška 40

- sivorumena 40
 mušnica, citronasta 36
 - panterjeva 36
 - velikoluska 38
 - zelena 38
 Mycena acicula 108
 - aetites 108
 - capillaripes 108
 - crocata 110
 - flos-nivium 110
 - galericulata 110
 - galopus 110
 - haematopus 110
 - olida 110
 - pura 112
 - renati 112
 - rosea 112
 - vulgaris 112
 - zephrus 112
 Mycenitis alliaceus 112
 Mycoacia uda 114

nasršenka, tankoroba 72
 Nectria cinnabarina 114
 nogavičar, orošeni 48
 nožničarka, velika 150

oglarica, slojevita 64
 opnovka, hrastova 118
 - mesnordeča 118
 - siva 118
 - trepetlikova 118
 ostrigar, bukov 120
 - poletni 122
 Oudemansiella
 hygrophoroides 114
 ožganka, črneča 94

Panaeolina foenicisii 114

Panaeolus acuminatus 114
 - fimicola 114
 - papilionaceus 116
 Panellus mitis 116
 - stipticus 116
 panjevka, zimsko 70
 Parasola conopilus 116
 - plicatilis 116
 Paxillus involutus 116
 - rubicundulus 118
 Peniophora cinerea 118
 - incarnata 118
 - polygonia 118
 - quercina 118
 Peziza succosa 118
 - varia 120
 - vesiculosa 120
 Phellinus igniarius 120
 - trivialis 120
 Pholiotina teneroides 120
 plamenka, hibridna 74
 - junonina 74
 Pleurotus ostreatus 120
 - pulmonarius 122
 ploskocevka, grbasta 144
 - kolobarčasta 146
 - kosmata 146
 - pisana 146
 - puhasta 146
 - rjaveča 144
 - vrbova 146
 plutač, navadni 120
 - vrbov 120
 Pluteus aurantiorugosus 122
 - boudieri 122
 - cervinus 122
 - ephebeus 122
 - exiguus 122
 - nanus 124
 - pellitus 124
 - plautus 124

- romellii 124
- thomsonii 124
- podvihanka, jelševa 118
- navadna 116
- polčeladica, bela 80
- smetanasta 80
- pološčenka, sploščena 72
- polstenec, rdečebetni 152
- rdeči 152
- polžar, bakrenasti 48
- polževka, bela 82
- gabrova 82
- pesniška 82
- prelčeva 82
- Polyporus arcularius* 124
- brumalis 126
- ciliatus 126
- leptcephalus 126
- mori 126
- tuberaster 126
- poroznica, severnjaška 50
- Postia caesia* 126
- fragilis 128
- stiptica 128
- subcaesia 128
- postrančica, raznolična 62
- zdrizasta 60
- prašnica, betičasta 100
- hruškasta 102
- ilglična 102
- travniška 100
- predirnik, ploščati 64
- Psathyrella atomata* 128
- bipellis 128
- candolleana 128
- corrugis 130
- leucotephra 130
- multipedata 130
- spadiceogrisea 130
- Psilocybe caerulipes* 130
- razcepljenka, Aghardova 88
- belkasta 92
- beloroba 88
- Bongardova 88
- črtasta 86
- dišeča 92
- Godejeva 90
- igličevna 90
- klobučevinasta 88
- luskata 92
- mandljeva 90
- ostrogrba 86
- ozkocistidna 90
- pegasta 90
- rdečeča 86
- repasta 90
- sivoroba 92
- svetloroba 92
- zašiljena 92
- zoprna 88
- zvezdastotrosna 88
- razporka, nenavadna 138
- rdečelistka, bleščeča 68
- križnotrosna 66
- modra 68
- nesomerna 66
- nizka 68
- nizka, smrdeča oblika 68
- šotiščna 68
- Rhodocollybia butyracea* f.
- asea 130
- maculata 132
- proluxa var. distorta 132
- Rhodocybe gemina* 132
- Rickenella swartzii* 132
- roža, cvetoča 144
- čopičasta 144
- nageljnasta 144
- rožički, rogasti 46
- Rugosomyces ionides* 132

rusoglavka, zvegana 132

Russula amoena 132

- *amoenolens* 134

- *cessans* 134

- *chloroides* 134

- *delica* 134

- *exalbicans* 134

- *foetens* 134

- *galochroa* 136

- *heterophylla* 136

- *nigricans* 136

- *nobilis* 136

- *pectinata* 136

- *pectinatoides* 136

- *romelli* 138

- *solaris* 138

Sarcomyxa serotina 138

Sarcoscypha coccinea 138

Schizophora paradoxa 138

Schizophyllum commune 138

Scleroderma verrucosum 140

sehlica, nepravilna 104

- trdobetna 104

- vijoličasta 104

- volčičja 104

Skeletocutis amorpha 140

sirovka, smrekova 94

sivolistka, barjanska 144

- očrnjena 142

skledica, mehurjasta 120

- raznolična 120

- sočna 118

skorjevec, ploski 62

skorjoder, jagodasti 86

- krastasti 86

- malinasti 86

skutovec, krhki 128

- modri 126

- modrikasti 128

- trpki

slinar, pegasti 74

- veliki 74

slojevka, dlakava 140

- kosmata 140

- žametasta 140

smrček, užitni 108

solzar, kapljasti 62

- pahljačasti 62

Stereum gausapatum 140

- *hirsutum* 140

- *subtomentosum* 140

storževka, grenka 142

- ovenčana 142

- smrekova 140

strgalkar, otočkasti 84

strniščnica, zelenkasta 142

Strobilurus esculentus 140

- *stephanocystis* 142

- *tenacellus* 142

Stropharia aeruginosa 142

Suillus granulatus 142

ščitovka, bela 124

- čebulasta 122

- drobcena 122

- jelenova 122

- prelestna 122

- pritlikava 124

- Romellova 124

- Thomsonova 124

- zrničasta 124

- žametasta 122

širokolistar, zaviti 152

širokolistka, belkasta 114

Tarzettia catinus 142

temnolistka, bodičasta 106

Tephrocyebe atrata 142

- *palustris* 144

Thelephora anthocephala 144

- *caryophyllea* 144

- penicillata 144
 tintnica, gozdna 56
 - oglatotrosna 56
 - velika 54
 - veneča 54
 tintovec, minljivi 52
 - razsejani 52
 - sljudnati 54
 tintovka, pisana 54
 - plišasta 54
 - prava 54
 torilka, čašasta 142
 Trametes cervina 144
 - gibbosa 144
 - hirsuta 146
 - ochracea 146
 - pubescens 146
 - suaveolens 146
 - versicolor 146
 tramovka, labirintasta 72
 - sivorjava 72
 trdokožnica, bradavičasta 140
 Tremella foliacea 146
 - mesenterica 148
 trgača, bukova 106
 trhlenka, rdečkasta 150
 trhllica, skorjina 38
 trhlička, bukova 38
 - dišeča 38
 - slojevita 40
 Trichaptum biforme 148
 Tricholoma myomyces 148
 - orirubens 148
 - pardinum 148
 - scalpturatum 148
 - terreum 150
 Tricholomopsis rutilans 150
 trnovka, bodičasta 66
 - čvrstoluska 66
 - hrapava 66
 trobljica, svetloroba 150

- velika 150
 - zimska 150
 trohnož, jelov 80
 Tubaria furfuracea 150
 - hiemalis 150
 - praestans 150

uhljevka, bezgova 42
 - brestova 42
 usnjevka, zgrbančena 82
 - trdolesna 84

velekokorenovka, širokolistna 104
 velezraščenska, črneča 106
 vlažnica, koničasta 82
 Volvariella gloiocephala 150
 zajček, beli 102
 - rjavi 102
 - sivi 102
 - trdokožni 104
 - umazani 102
 zalogarica, gomoljasta 66
 zamazanka, žlezasta 68
 zelenivec, zelenkasti 48
 zgručev, mili 116
 - trpki 116
 zgručevka, pozna 138
 zgubanec, drhtavi 108
 zlatoluknjičar, žafranasti 42
 zobnica, hrastova 84
 zvezdica, četverokraka 72
 - ovratniška 72
 zvitocevka, rdečeča 62
 - tribarvna 64
 zvitoluknjičar, pepelasti 48
 zvitopor, navadni 64
 želatinka, mesnata 42
 žilavka, medvedja 96

žlička, navadna 44

žoltotroska, olivna 46

žveplenjača, navadna 84

- navadna, drobní različek 84

- opečnata 84

Xerocomellus chrysenteron 152

- *rubellus* 152

Xerula radicata 152

Xylaria hypoxylon 152

- *longipes* 152

- *polymorpha* 152

