

GLIVE MARIBORSKEGA MESTNEGA PARKA

Slavko Šerod

Darko Hajnšek

Eva Zupan

Mihela Žunko

Bojan Dobrotič

Maribor, 2025

GLIVE MARIBORSKEGA MESTNEGA PARKA

Uredniški odbor:

Slavko Šerod, Darko Hajnšek, Eva Zupan, Mihela Žunko, Bojan Dobrotič

Oblikovanje:

Slavko Šerod, Grafiti Studio

Založnik:

Gobarsko društvo Lisička Maribor

Izdajo omogočila:

Mestna občina Maribor

Naklada:

300 izvodov

Tisk:

Grafiti Studio

Maribor, 2025

Projekt sofinancira Mestna občina Maribor

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor

635.8

GLIVE mariborskega mestnega parka / Slavko Šerod ... [et al.].
- Maribor : Gobarsko društvo Lisička, 2025

ISBN 978-961-94908-5-3
COBISS.SI-ID 253315587

Vsebina

Uvod	5
Splošno o glivah in monitoringu	7
Splošno o mariborskem Mestnem parku	9
Kratek opis rastlin, živali in gliv v Mestnem parku	11
Zanimivosti iz sveta gliv	13
Podatkovna baza Boletus informaticus	15
Spisek gliv, ki smo jih našli v Mestnem parku v 5 letih	16
Pregled vrst gliv v Mestnem parku	29
Literatura in viri informacij	181

Uvod

Na javnem razpisu Mestne občine Maribor je bil odobren 5-letni projekt "Monitoring gliv v mariborskem Mestnem parku". Na osnovi dosedanjega preučevanja gliv lahko ocenimo, da je pestrost gliv mariborskega Mestnega parka velika. Projekt smo zaključili leta 2025. Namen projekta je bil spoznavati pestrost gliv Mestnega parka, ozaveščati ciljne skupine in izdelati brošuro o glivah Mestnega parka.

Pri monitoringu gliv smo redno zbirali podatke o gobjem bogastvu Mestnega parka, z ozaveščanjem ciljnih skupin pa želimo doseči boljše poznavanje gliv. Vidne dele gliv (gobe oz. trosnjake) smo popisovali z uporabo programske opreme Boletus informaticus, ki je v lasti Gozdarskega inštituta Slovenije. Določali smo jih terensko in tudi kabinetno, s pomočjo strokovne literature in ključev za določitev gliv ter z mikroskopskim opazovanjem. Na številnih razstavah gob v regiji in po Sloveniji smo obiskovalce seznanjali s projektom in večina je bila presenečena nad velikim številom vrst, ki smo jih našli na tako majhnem prostoru.

V času 5-letnega monitoringa smo uspeli najti, določiti in popisati 448 različnih vrst gliv. Posebnost so najdbe gliv iz seznama zavarovanih prstoživečih vrst gliv oz. z rdečega seznama ogroženih vrst gliv Slovenije in tudi najdbe gliv, ki so navedene v začasnem rdečem seznamu ogroženih gliv Evrope. Rdeči seznam gliv je bil objavljen v UL RS št. 42/2010 in obsega 111 ogroženih vrst gliv z različnim statusom ogroženosti, med drugim tudi za zavarovane vrste gliv Slovenije, ki so posebej navedene v Uredbi o zavarovanih prstoživečih vrstah gliv (UL RS št. 58/2011) in obsega 41 najbolj ogroženih vrst gliv v Sloveniji, ki jih je prepovedano nabirati. Za pomoč pri nastanku brošure se zahvaljujemo Mestni občini Maribor, Zavodu RS za varstvo narave, OE Maribor, članom Gobarskega društva Lisička Maribor, Veroniki Tratnik za strokovno pomoč in vsem, ki so k nastanku brošure kakor koli pripomogli.

Namen brošure je seznanjanje o glivah, ki uspevajo v Mestnem parku, predvsem prebivalce Maribora, pa tudi širše, in spodbujanje zavzemanja za naravo na širšem mariborskem območju, prav tako tudi krepitev ekološke zavesti, ki temelji na spoštovanju narave. Javna predstavitev bogatega nabora gliv je nedvomno zanimivo sporočilo o prisotnosti naravnih organizmov, ki živijo v skupnosti z drugimi organizmi, tako rastlinskimi kot živalskimi. Brošura naj vsakomur, ki se zanima za lepote narave, služi kot slikovit vodnik osnovnih informacij o glivah, ki so si izborile prostor v Mestnem parku, ne prav velikem območju, a bogato obdarjenem. Služi naj vsem, ki so željni raziskovanj, a nimajo dovolj dobrih predznanj. Morda bo kdo odkril kakšno novo vrsto in veselilo nas bo, če nas bo o tem obvestil, saj narava vedno lahko pripravlja presenečenja. Publikacija je tudi prispevek Gobarskega društva Lisička Maribor

k predstavitvi naravnega bisera, kakršen je mariborski Mestni park, na katerega je mesto lahko upravičeno ponosno. Enako ponosni naj bodo tudi zanamci, ki jim bomo skušali park zapustiti neokrnjen in čim bolj ohranjen ter bogat, saj smo v parku le opazovalci in gobe zgolj opazujemo, ne nabiramo.

Uredniški odbor

Splošno o glivah in monitoringu

Organizem, osebek, živo bitje, individuuum - so izrazi za najmanjšo enoto v naravi, ki je sposobna samostojnega življenja. Organizem je npr. mikroskopsko majhna, brezjedrna celica prokariota, ali enocelično telo planktonske alge, pa tudi večcelično telo več ton težkega telesa sinjega kita ali sekvoje. Za vse organizme je značilno, da v njih prepoznamo procese, s katerimi opisujemo življenje. Ti procesi so rast in razvoj, presnova snovi iz ene oblike v drugo, produkcija novih celic v telesu, razmnoževanje, odzivi na dražljaje itd. Ker je za vse procese potrebna energija, vsi organizmi za preživetje potrebujejo stalni dotok energije, katere viri pa so različni. V osnovi organizmi energijo dobijo bodisi neposredno iz svetlobe, bodisi z razgradnjo anorganske ali organske snovi. Pri tem so avtotrofi organizmi, ki organsko snov naredijo iz anorganske; fotoavtotrofi energijo za proizvodnjo organske snovi dobijo od sonca in to so zelene rastline, proces pa se imenuje fotosinteza. Kemoavtotrofi energijo dobijo z razgradnjo anorganskih snovi, sam proces proizvodnje organske snovi s pomočjo energije iz anorganske snovi pa se imenuje kemotsinteza in med take organizme spadajo bakterije. Heterotrofi pa so organizmi, ki energijo dobijo iz že narejene organske snovi in sem spadajo: živali, glive, bakterije in nekatere zajedavske rastline.


Organizmi so razdeljeni v več skupin, ki jim pravimo kraljestva (*Regnum*). Glive (*Fungi*, *Mycota*) so visoko specializirana živa bitja, ki niso rastline, živali, bakterije ali protisti. Uvrščamo jih v skupino večceličnih organizmov, ki imajo v celicah jedro - evkarioti. Glive nimajo plastidov (organel v rastlinskih celicah, udeleženih v sintezi, in pri skladiščenju pomembnih spojin) in ne vsebujejo listnega zelenila (klorofila). Zato niso sposobne, tako kot rastline, iz sončne svetlobe sintetizirati organske snovi iz anorganskih, ampak si morajo hrano črpati iz okolja. Hranijo se z razkrajanjem in vsrkavanjem (absorbiranjem) hrane skozi celično steno. Organizme, ki energijo pridobivajo iz energijsko bogatih organskih molekul, ki jih zaužijejo, imenujemo heterotrofni organizmi. Glive ne oblikujejo tkiv, telo ni razčlenjeno v steblo, liste in korenine, torej je steljka (*talus*). Glive običajno oblikujejo eno vrsto spolnih trosišč (*teleomorf*) in eno ali več oblik nespolnih trosišč (*anamorf*). Pojav, da ima določen organizem (ena vrsta!) več razmnoževalnih oblik, imenujemo *pleomorfizem*. Glivo, kot biološko enoto, imenujemo *holomorf* (*teleomorf* + en ali več *anamorfov*). Vsaka oblika trosišč ima lahko veljavno znanstveno ime in zato jo lahko uvrščamo v različne višje taksonomske enote.

Spremljanje pojavljanja gliv (monitoring) se običajno izvaja na enega od dveh načinov, bodisi v okviru v naprej določenih ploskev ali vzdolž začrtanih linijskih transektov. Površinske ploskve so ena najpogostejše uporabljenih metod v ekologiji za količinsko opredelitev števila vrst na enoto površine in za zagotavljanje podlage za primerjavo površin s statističnimi metodami. Metode, ki temeljijo na transektih, pa so predvsem

uporabne za preučevanje, kako se populacije spreminjajo glede na okoljske gradiente. Popisna ploskev je jasno definirana in razmejena na osnovi topografskih značilnosti in ima tudi natančno določeno izhodiščno točko. Popisovalec začne popisovanje na izhodiščni točki in opravi popis tako, da obhodi določen predel terena v okviru ploskve in se postopoma vrne na izhodiščno točko, kjer popis tudi zaključi. Pri tem se izogiba gosti podrasti, širokim vrzelim in gozdnim posekam. Priporočljivo je, da pri ponovnih obhodi popisovalec izbere vedno drugo traso poti tako, da ne hodi po lastnih stopinjah predhodnega oglada in da se izogiba stalnim, uhojenim potem in kolovozom.

Pri monitoringu gliv smo odvisni predvsem od gob oz. trosnjakov, ki predstavljajo vidni del gliv in preko teh lahko sklepamo na njihovo prisotnost. Vendar trosnjaki predstavljajo le kratkotrajno fazo v razvojnem ciklusu glive. Monitoring zaradi nerednega pojavljanja trosnjakov zato zahteva ponovljivo vzorčenje in intenzivno terensko delo. Izhodišča za pripravo programa monitoringa so bila: dolgoročna naravnost, racionalnost, enostavnost in normiranost. Pri popisih smo beležili imena opaženih vrst gliv (vrstno ime in rodovno ime). Strokovno določanje gliv so opravljali determinatorji Gobarskega društva Lisička Maribor, terminologijo pa mikološka komisija v Mikološki zvezi Slovenije.

Pri monitoringu gliv mariborskega Mestnega parka smo najdbe razdelili v tri območja: južni del parka (1), vzhodno-zahodni del parka (2) in severni del parka (3), slika 1.



Slika 1: Tri območja monitoringa gliv, južni del (1), vzhodno-zahodni del (2) in severni del (3) (Vir: Google)

Splošne značilnosti pojavljanja trosnjakov: rast večine gob v zmernem podnebnem pasu z izraženimi letnimi časi je pogojena z vegetacijsko sezono in umeščena v določen letni čas. V tem obdobju lahko pričakujemo, da se bodo trosnjaki pojavili. Dejanski začetek gobje rasti pa sprožijo določeni okoljski dejavniki, v prvi vrsti vlaga in temperatura. Sezona rasti gob pri nas traja od zgodnje pomladi do pozne jeseni, večina pa se jih pojavi septembra in oktobra. Gobe rastejo hitro, dejansko lovimo trenutke v njihovem razvojnem ciklu. Obdobje intenzivne rasti lahko traja od nekaj dni do nekaj tednov.

Posamezni mejniki v sezoni rasti gob: novo sezono rasti gob zaznamuje marčna polževka, po domače marčnica, ki se pojavi, še preden drevesa ozelenijo. Nato se aprila pojavijo predstavniki zaprtotrosnic: smrčki ali po domače mavrahi. Pojav prve poletne rasti gob začnejo značilni predstavniki prostotrosnic: navadna lisička in poletni goban ter golobice. Sledi obdobje poletnega mirovanja (vročina, suša), obdobje jesenske rasti pa sledi pojavu izdatnejših padavin in ohladitev, takrat pa dejansko lahko najdemo največ različnih vrst gob. Poznojesenska rast se nadaljuje po odpadanju listja in pojavu zmrzali, do zimskega mirovanja. Kljub temu lahko pozimi najdemo še kar nekaj vrst gob, npr. zimske panjevke, bukove ostrigarje in tudi bezgove uhljevke. V splošnem gobe rastejo čez vse leto. Večina jih raste na tleh, ostale pa na drevesih oz. na štorih in razpadajočih delih dreves.

Splošno o letnih nihanjih pojavljanja gob: pri gobah so značilna velika letna nihanja pojavljanja gob, ki jih nihče ne zna zanesljivo napovedovati. Pojav gob je vedno pogojen z vremenskimi razmerami (s padavinami, vlago in s temperaturo), vendar pa padavine in vremenske razmere niso zadosten pogoj za dobro gobjo letino. Te se pojavijo približno na 5 do 7 let. Izjemne gobje letine so redek pojav in ga je možno opazovati na 12 do 15 let ali več.

Splošno o mariborskem Mestnem parku

Mariborski Mestni park, ki se razteza severno od starega jedra Maribora, je več kot le zeleni prostor - je zgodovinska, naravna in kulturna dediščina, ki že stoletja oblikuje identiteto mesta. S površino približno 54 hektarjev, ki vključuje Mestni park, območje Treh ribnikov, Kalvarijo in Piramido, predstavlja edinstveno stičišče urbanega življenja in naravne lepote. Njegova zgodovina sega v 19. stoletje, ko je bil zasnovan kot javni park v duhu takratnih evropskih krajinskih vrtov, danes pa služi kot oaza miru, rekreacije in biotske raznovrstnosti.

Začetki parka so povezani z obdobjem po letu 1860, ko je Maribor, takrat del Avstro-Ogrske, doživel gospodarski in kulturni razcvet. Mestne oblasti so želele ustvariti prostor, ki bi meščanom ponujal oddih od industrializacije in hkrati poudarjal naravno bogastvo regije. Park je nastal na območju nekdanjih pašnikov in vinogradov, ki so obdajali griče Kalvarije in Piramide. V tem obdobju so zasadili številna eksotična drevesa, kot so tulipanovec, pavlovnija in sekvoje, ki še danes krasijo park in pričajo o viziji takratnih načrtovalcev. Trije ribniki, izkopani v 19. stoletju, so dodali vodni element, ki je parku vdahnil poseben čar in privabil vodne ptice ter druge živali. Skozi desetletja je park preživel vojne, spremembe političnih sistemov in urbanizacijo, a ohranil svojo prvotno funkcijo - biti zeleno srce Maribora.

Mestni park je dom izjemne biotske raznovrstnosti, ki privlači tako naravoslovce kot običajne obiskovalce. Med približno 100 vrstami dreves najdemo domače vrste, kot so hrast, lipa in kostanj, ter tuje, kot so rogovilar, sofora in japonski macesen. Ta raznolikost ustvarja pogoje za bogato podrast in gobjo floro, ki vključuje vrste, kot so gobane, lisičke in štorovke, zlasti v vlažnih jesenskih mesecih. Območje Treh ribnikov je habitat za vodne ptice, kot so race, ter dvoživke, vključno z navadno krastačo in rosnicami. Gozdni predeli privabljajo netopirje, veverice in pestre vrste ptic, medtem ko suhi travniki na gričih gostijo metulje, kot je črtasti medvedek. Park tako ni le estetski užitek, temveč tudi pomemben ekosistem v urbanem okolju.

Poleg naravne vrednosti ima park tudi globok kulturni in družbeni pomen. Kalvarija s svojo baročno cerkvijo in Piramida, kjer stoji kapela, spominjata na zgodovinske vinogradniške tradicije, saj so ti griči nekoč bili prekriti z vinskimi trtami - nekatere med njimi rastejo še danes. Park je prizorišče številnih dogodkov, od sprehodov in piknikov do kulturnih prireditev, kot so koncerti in festivali. Otroci se igrajo na igriščih, starejši posedajo na klopeh, tekači in kolesarji pa uživajo v urejenih poteh. Akvarij-terarij ob Treh ribnikih dodatno bogati izobraževalno ponudbo, saj obiskovalcem približa eksotične živalske vrste in ozavešča o pomenu ohranjanja narave.

Kljub svoji lepoti Mestni park ni brez izzivov. Urbanizacija, onesnaženje in podnebne spremembe vplivajo na njegov ekosistem - suše ogrožajo rastline, hrup pa moti živali. Vzdrževanje parka zahteva stalno skrb, saj je potrebno uravnotežiti naravno ohranjanje z javno rabo. Mestne oblasti in prostovoljci si prizadevajo za obnovo poti, sajenje novih dreves in zaščito habitatov, a prihodnost parka bo odvisna od zavedanja skupnosti o njegovi vrednosti. V času, ko se mesta širijo, je ohranjanje takšnih zelenih površin ključno za kakovost življenja in zdravje prebivalcev.

Mariborski Mestni park je več kot le prostor za oddih - je živi muzej narave, zgodovine in družbenega življenja. S svojo raznolikostjo rastlin in živali, zgodovinskim ozadjem ter vlogo v vsakdanu Mariborčanov uteleša harmonijo med človekom in naravo. Ob sprehodu skozi njegove drevorede, ob poslušanju šumenja listja in opazovanju

življenja na ribnikih se zdi, kot da čas tu teče počasneje. Park nas opominja, da je narava dragocen del našega življenja, ki ga moramo ceniti in varovati za prihodnje generacije. V njem se zrcali duša Maribora - ponosna, zelena in neukrotljiva.

Kratek opis rastlin, živali in gliv v Mestnem parku

Mariborski Mestni park, ki se razprostira na približno 54 hektarjih severno od starega mestnega jedra Maribora in je prava zelena oaza, bogata z raznolikim rastlinstvom in živalstvom. V parku uspeva okoli 100 vrst domačih in tujih listavcev, kot so rogovilar (*Gymnocladus*), pavlovnija (*Paulownia*), tulipanovec (*Liriodendron*) in sofora (*Sophora*), ter številni iglavci, med drugim sekvoja (*Sequoia*), japonski macesen (*Larix kaempferi*), cemprin (*Pinus cembra*) in čuga (*Tsuga*). Posebnost parka je osamljeno drevo, ki izstopa v krajini, na južnih pobočjih Kalvarije in Piramide pa raste vinska trta, ki dodaja parku vinogradniški pridih. Parkovne površine dopolnjujejo urejeni cvetlični nasadi, kot je Rožni grič, in kostanjevi ter orehovi drevoredi, ki so del zgodovinske zasnove parka iz 19. stoletja.

Živalstvo v parku je prav tako raznoliko in privlačno. Območje Treh ribnikov in vodnih površin nudi dom vodnim pticam, kot so race in ponirki, v ribnikih pa plavajo okrasni japonski krapi. Park je pomemben habitat za dvoživke, kot so navadna krastača, sekulja in rosnica, ki jih je mogoče opaziti zlasti med spomladanskimi selitvami. Med plazilci najdemo kače, kot so modras, navadni gož in smokulja, ter kuščarice, denimo navadni zelenec in pozidna kuščarica. Netopirji, vključno z vrstami, kot so obvodni in belorobi netopir, najdejo zatočišče v starih drevesih in ob ribnikih, kjer lovijo žuželke. Ptičje življenje je bogato z gozdnimi vrstami, kot so ščinkavec in brglez, ter vodnimi pticami, medtem ko suhi travniki in gozdni robovi privabljajo metulje, kot sta črtasti medvedek in petelinček. Prisotne so tudi veverice, ki pogosto razveselijo obiskovalce s svojo radovednostjo.

Mariborski park tako združuje naravno pestrost z zgodovinskim pomenom, saj ponuja zavetje številnim rastlinskim in živalskim vrstam ter hkrati služi kot priljubljeno rekreacijsko in izobraževalno območje za obiskovalce.

Park, ki obsega območje Mestnega parka, Treh ribnikov, Kalvarije in Piramide, je naravno bogato okolje, kjer uspevajo različne gobje vrste. Ker specifični popisi gob v parku doslej še niso bili opravljeni in dostopni v javnih virih, smo se te naloge lotili v Gobarskem društvu Lisička v okviru monitoringa gliv Mestnega parka. Park z več kot 100 vrstami dreves, kot so kostanji, hrasti, lipe in iglavci, ter vlažnimi predeli ob Treh

ribnikih ustvarja ugodne pogoje za razvoj gliv, zlasti tistih, ki so vezane na les, tla in simbiozo z drevesi.

Med pogostimi gobami, ki jih lahko najdemo v takšnih okoljih, so jesenski gobani (*Boletus edulis*), ki uspevajo v simbiozi z listavci in iglavci, kot so hrasti in smreke, prisotni v parku. Ob vlažnih jesenskih dneh bi lahko opazili tudi navadne lisičke (*Cantharellus cibarius*), ki rastejo na travnatih površinah in v bližini gozdnih robov. Poletni gobani (*Boletus reticulatus*) so prav tako verjetni, saj imajo radi toplejše poletne mesece in simbiozo z listavci, kot je kostanj. Na vlažnih tleh ob ribnikih ali pod drevesi pa lahko najdemo golobice (*Russula spp.*), ki so raznolike po barvi in pogosto rastejo v mešanih gozdovih. Med njimi so užitne vrste, kot je zelenkasta golobica (*Russula virescens*), a tudi neužitne ali strupene, kot je bljuvna golobica (*Russula emetica*).

Na odmrlem lesu starih dreves, ki jih v parku ne manjka, uspevajo saprofitne glive, kot je sivorumena mraznica (*Armillaria mellea*), znana po svojih medeno rumenih trosnjakih in zajedavskem vplivu na oslabljen drevesa. Prav tako lahko srečamo polževke (*Hygrophorus spp.*), ki rastejo na travnikih in so pogoste v parkih z vlažnimi tlemi. Ob ribnikih in v senčnih predelih pa se razveselimo smrčkov (*Morchella spp.*), ki se pojavljajo spomladi na vlažnih, humoznih tleh, čeprav so redkejši.

Jeseni, ko padavine in ohladitve ustvarijo optimalne razmere, park gosti še druge vrste, kot so mlečnice (*Lactarius spp.*), prepoznavne po mlečku, ki izteka ob prelomu, npr. rdečerjava mlečnica (*Lactarius rufus*), ki raste pod iglavci. Na tratah najdemo dišeče sehlice (*Marasmius oreades*), ki tvorijo značilne pravljiske kroge. Pozimi, v blažjih obdobjih, pa so prisotne redke vrste, kot je zimsko panjevka (*Flammulina velutipes*), ki raste na odmrlem lesu.

Ker je park urbano in zavarovano območje, je pomembno opozoriti, da nabiranje gob tu ni dovoljeno. Tudi priporočljivo ni, zaradi morebitnega onesnaženja tal. Gobja raznolikost je odvisna od letnih vremenskih razmer - sušna obdobja zmanjšajo rast, medtem ko vlažni meseci, zlasti september in oktober, prinesejo obilje. Natančen seznam vrst za Mariborski park je na voljo v brošuri, opisani primeri pa odražajo tipično gobjo floro določenih habitatov, kar parku dodaja še eno plast naravne pestrosti.

Zanimivosti iz sveta gliv

Skrivnostni prebivalci narave

Gobe so eno najbolj fascinantnih in skrivnostnih kraljestev narave. Čeprav jih pogosto povezujemo s preprostimi organizmi, ki rastejo na vlažnih tleh ali odmrlem lesu, so v resnici izjemno raznolike, kompleksne in ključne za življenje na Zemlji. Niso ne rastline ne živali, temveč spadajo v lastno kraljestvo (*Fungi*), ki skriva neverjetne zgodbe, od njihovega evolucijskega razvoja do nenavadnih lastnosti in vpliva na človeštvo.

Gobe kot arhitekti ekosistemov

Ena najbolj osupljivih značilnosti gob je njihova vloga v naravi. Pod zemljo tvorijo ogromne mreže micelija - nitastih struktur, ki delujejo kot nekakšen „internet narave“. Te mreže, imenovane tudi mikorizne povezave, omogočajo komunikacijo med rastlinami, saj prenašajo hranila in signale med drevesi v gozdu. Največji znani organizem na svetu je pravzaprav goba – črnomekinasta mraznica (*Armillaria ostoyae*) v Oregonu v ZDA, ki se razteza na 965 hektarjih in je stara več kot 2400 let. Ta „pošastna goba“ dokazuje, kako ti organizmi tiho, a mogočno oblikujejo ekosisteme, razgrajujejo organske snovi in omogočajo kroženje hranil.

Smrtonosne in zdravilne moči

Gobe so polne nasprotij - nekatere so smrtonosne, druge pa rešujejo življenja. Med najbolj zloglasnimi je zelena mušnica (*Amanita phalloides*), ki povzroči večino smrtnih zastrupitev z gobami po svetu. Njen nedolžen videz skriva toksine, ki uničijo jetra in ledvice, pogosto brez možnosti rešitve. Po drugi strani pa so gobe, kot je penicilinska plesen (*Penicillium spp.*), spremenile medicino z odkritjem antibiotikov. Tudi danes raziskovalci preučujejo gobe, kot je trpki zgručevec (*Panellus stipticus*), ki sveti v temi, ali zdravilne vrste, kot je svetlikava pološčanka (*Ganoderma lucidum*), znana kot reishi, ki ga v tradicionalni kitajski medicini uporabljajo za krepitev imunskega sistema. Te dvojne narave gob - strup ali zdravilo - so človeštvo že stoletja navdihovale z občudovanjem in strahom.

Nenavadne prilagoditve

Svet gob je poln čudесnih prilagoditev. Nekatere vrste, kot je navadna mrežnica (*Clathrus ruber*), oddajajo vonj po gnijočem mesu, da privabijo muhe, ki raznašajo njihove trose. Druge, kot so glavatci (*Cordyceps spp.*), so naravni paraziti, ki napadejo

žuželke, jih „zombificirajo“ in iz njihovih teles poženejo trosnjaki. Obstajajo pa tudi gobe, ki lovijo - nematode ujamejo z lepljivimi mrežami ali zankami, kar kaže na neverjetno raznolikost njihovih preživetvenih taktik. Te lastnosti nas opominjajo, da so gobe veliko več kot le statični organizmi; so aktivni igralci v boju za preživetje.

Gobe v kulturi in kulinariki

Gobe so že od nekdaj vtakane v človeško kulturo. V pravljicah so pogosto prikazane kot domovi vil ali čarobni krogi, povezani z mistiko. V resnici so ti „pravljичni krogi“, ki jih tvorijo vrste, kot je dišeča sehlica (*Marasmius oreades*), posledica širjenja micelija pod zemljo. V kulinariki so gobe cenjene po vsem svetu - od gomoljik (tartufov), ki veljajo za eno najdražjih živil, do skromnih lisičk in jurčkov, ki bogatijo jesenske jedi. Vendar pa skrivajo tudi pasti; zamenjava užitne golobice z njeno strupeno sorodnico lahko hitro postane usodna, kar nabiralce uči spoštovanja do njihovega znanja in narave.

Prihodnost z gobami

V zadnjih letih so gobe stopile v ospredje kot rešiteljice okoljskih izzivov. Micelij se uporablja za izdelavo biorazgradljivih materialov, kot so embalaža in celo usnje, ki nadomeščajo plastiko. Raziskave kažejo, da nekatere vrste, kot je bukov ostrigar (*Pleurotus ostreatus*), lahko razgradijo naftne madeže ali težke kovine, kar odpira vrata do „mikoremediacije“ - čiščenja onesnaženih območij z gobami. Hkrati psihedelične gobe, kot gologlavke, vzbujajo zanimanje v medicini za zdravljenje depresije in tesnobe, kar nakazuje, da nas čaka še veliko odkritij o njihovem potencialu.

Svet gob je poln presenečenj, ki nas učijo ponižnosti do narave. Od njihovih skrivnih podzemnih mrež do sposobnosti, da uničujejo ali zdravijo, gobe utelešajo skrivnost in moč življenja. So tihi partnerji rastlin, mojstri preživetja in navdih za znanost ter umetnost. Ko naslednjič stopimo v gozd in zagledamo gobo, ki kuka izpod listja, se spomnimo, da pred nami ni le preprost organizem, temveč bitje z zgodbo, ki sega milijone let nazaj in obljublja še mnoge skrivnosti za prihodnost. Gobe niso le del narave - so njena čarobna nit, ki povezuje vse živo.

Podatkovna baza Boletus informaticus

Podatkovna baza gliv Boletus informaticus je računalniški program, ki omogoča vnos podatkov o glivah po Sloveniji in je namenjen sistematičnemu beleženju gliv, njihove razširjenosti in podatkov o njihovem rastišču. V bazi niso le shranjeni vsi zapisi gliv, najdenih vrst na področju države, temveč program omogoča še različne obdelave gradiva, različne načine izpisa in kartografske predstavitve najdišč v mreži srednje-evropskega kartiranja flore (t.i. SRE koordinatna podatka X in Y) in v mreži UTM (Universal Transverse Mercator). Vsak podatek o vrsti glive in najdišču je avtoriziran in pri opisu razširjenosti je naveden avtor, pri čemer je vsak avtor sam odgovoren za pravilnost podatkov. Vsi podatki so elektronsko arhivirani in urejeni, posodobljeno poimenovani in prikazani na kartah Slovenije. Objavljeni rezultati so zajeti tudi v tiskani obliki, v monografiji Glive Slovenije - Vrste in razširjenost (2005).

V rezultatih so samo tisti podatki, za katere je naveden: znan določevalac, čas in kraj nabiranja. Prikazana je tudi razširjenost različnih vrst gliv v mreži srednje-evropskega florističnega kartiranja, naveden kvadrant najdišča, pa tudi določevalac glive, leto in mesec najdbe ter tip podatka. Obrazci za vnos zapisa o glivi v podatkovno zbirko BI, so dostopni za evidentirane določevalce gliv na spletni strani.

Poimenovanje gliv v brošuri je posodobljeno po mednarodni podatkovni zbirki Index Fungorum, CABI Bioscience database, v času nastanka brošure. Index Fungorum velja za eno največjih zbirk imen gliv (Jurc, Piltaver, Ogris, 2005), ki jo stalno izpopolnjujejo in nadgrajujejo, v njej pa je trenutno okoli pol milijona zapisov o imenih gliv.

Spisek gliv, ki so bile najdene v mariborskem Mestnem parku v petih letih monitoringa

V spodnji tabeli je spisek najdenih vrst gliv v času izvajanja 5-letnega monitoringa:

	Latinsko ime	Slovensko ime
1.	<i>Abortiporus biennis</i>	dvoletni polluknjičar
2.	<i>Agaricus bisporus</i>	dvotrosni kukmak
3.	<i>Agaricus bitorquis</i>	mestni kukmak
4.	<i>Agaricus campestris</i>	travniški kukmak
5.	<i>Agaricus moelleri</i>	Möllerjev kukmak
6.	<i>Agaricus placomyces</i>	oblogasti kukmak
7.	<i>Agaricus semotus</i>	pritlikavi kukmak
8.	<i>Agaricus sylvaticus</i>	gozdni kukmak
9.	<i>Agaricus sylvicola</i>	hostni kukmak
10.	<i>Agaricus xanthodermus</i>	karbolni kukmak
11.	<i>Aleuria aurantia</i>	oranžna latvica
12.	<i>Alnicola citrinella</i>	citronasta močvirka
13.	<i>Amanita argentea</i>	srebrni lupinar
14.	<i>Amanita battarrae</i>	dvobarvni lupinar
15.	<i>Amanita ceciliae</i>	pozlačeni lupinar
16.	<i>Amanita citrina</i>	citronasta mušnica
17.	<i>Amanita echinocephala</i>	ostrokrpa mušnica
18.	<i>Amanita eliae</i>	Elijeva mušnica
19.	<i>Amanita excelsa</i>	podaljšana mušnica
20.	<i>Amanita fulva</i>	rjavi lupinar
21.	<i>Amanita gemmata</i>	medlorumena mušnica
22.	<i>Amanita muscaria</i>	rdeča mušnica
23.	<i>Amanita phalloides</i>	zelena mušnica
24.	<i>Amanita rubescens</i>	rdečkasta mušnica
25.	<i>Amanita strobiliformis</i>	velikoluska mušnica
26.	<i>Amanita vaginata</i>	sivi lupinar
27.	<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	betičasta livkarica
28.	<i>Antrodiella serpula</i>	bukovinska trhlička
29.	<i>Apioperdon pyriforme</i>	hruškasta prašnica

30.	<i>Arcyria cinerea</i>	pepelasta kelihovka
31.	<i>Armillaria gallica</i>	rumenovenčna mraznica
32.	<i>Armillaria mellea</i>	sivorumena mraznica
33.	<i>Armillaria ostoyae</i>	črnomekinasta mraznica
34.	<i>Artomyces pyxidatus</i>	cvetoča grmulja
35.	<i>Ascocoryne sarcoides</i>	mesnata želatinka
36.	<i>Astraeus hygrometricus</i>	vlagomerni zvezdež
37.	<i>Atheniella flavoalba</i>	voskasta travnica
38.	<i>Auricularia auricula-judae</i>	bezgova uhljevka
39.	<i>Auricularia mesenterica</i>	brestova uhljevka
40.	<i>Auriscalpium vulgare</i>	navadna žlička
41.	<i>Biscogniauxia mediterranea</i>	južna skorjederka
42.	<i>Biscogniauxia nummularia</i>	novčičasta skorjederka
43.	<i>Bjerkandera adusta</i>	osmojena bjerkandera
44.	<i>Bjerkandera fumosa</i>	čokata bjerkandera
45.	<i>Bolbitius titubans</i>	olivnorumeni smetiščar
46.	<i>Boletus badiorufus</i>	vresin goban
47.	<i>Boletus edulis</i>	jesenski goban
48.	<i>Boletus reticulatus</i>	poletni goban
49.	<i>Botryobasidium aureum</i>	zlatorumena raševinovka
50.	<i>Bovista plumbea</i>	sivokožni kadilček
51.	<i>Bovista pusilla</i>	mali kadilček
52.	<i>Bulgaria inquinans</i>	nečedna bolgarka
53.	<i>Butyriboletus appendiculatus</i>	rumeni maslenec
54.	<i>Butyriboletus regius</i>	kraljevi maslenec
55.	<i>Byssomerulius corium</i>	oranžni pokrivač
56.	<i>Caloboletus radicans</i>	grenki postavnež
57.	<i>Calocera cornea</i>	rogasti rožiček
58.	<i>Calocybe gambosa</i>	majniška lepoglavka
59.	<i>Calonarius dibaphus</i>	pisani koprenar
60.	<i>Calonarius elegantior</i>	izbrani koprenar
61.	<i>Calonarius elegantissimus</i>	zali koprenar
62.	<i>Calycina citrina</i>	rumena skodelnica
63.	<i>Candolleomyces candolleanus</i>	zbledela kandolovka
64.	<i>Cantharellus cibarius</i>	navadna lisička

65.	<i>Cantharellus ferruginascens</i>	rjaveča lisička
66.	<i>Cantharellus friesii</i>	žametna lisička
67.	<i>Cantharellus pallens</i>	pobeljena lisička
68.	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	rdečeča zelenolistka
69.	<i>Chondrostereum purpureum</i>	škrlatni skladovec
70.	<i>Chroogomphus helveticus</i>	švicarski polžar
71.	<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	veliki kijec
72.	<i>Clavariadelphus truncatus</i>	odsekani kijec
73.	<i>Clavulina cinerea</i>	siva grivača
74.	<i>Clavulina coralloides</i>	koralasta grivača
75.	<i>Clavulina rugosa</i>	brazdasta grivača
76.	<i>Clitocella popinalis</i>	pokapani mokovec
77.	<i>Clitocybe nebularis</i>	poprhnjena livka
78.	<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	vodenasta livka
79.	<i>Clitopilus prunulus</i>	navadna mokařica
80.	<i>Connopus acervatus</i>	kopučasti koničar
81.	<i>Conocybe apala</i>	mlečnobela stožka
82.	<i>Conocybe tenera</i>	ožlebičena stožka
83.	<i>Coprinellus disseminatus</i>	razsejani tintovec
84.	<i>Coprinellus domesticus</i>	domači tintovec
85.	<i>Coprinellus impatiens</i>	veneči tintovec
86.	<i>Coprinellus micaceus</i>	sljudnati tintovec
87.	<i>Coprinellus truncorum</i>	štorov tintovec
88.	<i>Coprinopsis atramentaria</i>	prava tintovka
89.	<i>Coprinopsis lagopus</i>	plišasta tintovka
90.	<i>Coprinopsis picacea</i>	pisana tintovka
91.	<i>Coprinus comatus</i>	velika tintnica
92.	<i>Coriolopsis gallica</i>	tankorobi nasršenec
93.	<i>Cortinarius anomalus</i>	nepravilna koprenka
94.	<i>Cortinarius betulinus</i>	brezova koprenka
95.	<i>Cortinarius bivelus</i>	zastrta koprenka
96.	<i>Cortinarius caperatus</i>	pšenična koprenka
97.	<i>Cortinarius cumatilis</i>	sinja koprenka
98.	<i>Cortinarius mucosus</i>	sluzava koprenka
99.	<i>Cortinarius torvus</i>	polzastrta koprenka

100.	<i>Cortinarius traganus</i>	lilasta koprenka
101.	<i>Craterellus cornucopioides</i>	črna trobenta
102.	<i>Craterellus lutescens</i>	žolta trobenta
103.	<i>Craterellus tubaeformis</i>	lijasta trobenta
104.	<i>Craterellus undulatus</i>	nagubana trobenta
105.	<i>Crepidotus applanatus</i>	sploščena postrančica
106.	<i>Crepidotus crocophyllus</i>	žafraanastolistna postrančica
107.	<i>Crepidotus mollis</i>	zdrizasta postrančica
108.	<i>Crepidotus variabilis</i>	raznolična postrančica
109.	<i>Crucibulum laeve</i>	navadni lonček
110.	<i>Cyathus striatus</i>	črtkani košek
111.	<i>Cyclocybe cylindracea</i>	nažlebkana topolovka
112.	<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	pahljačasta solzovka
113.	<i>Dacrymyces stillatus</i>	kapljasta solzovka
114.	<i>Daedalea quercina</i>	hrastova labirintnica
115.	<i>Daedaleopsis confragosa</i>	rdečeča zvitocevka
116.	<i>Daedaleopsis tricolor</i>	tribarvna zvitocevka
117.	<i>Daldinia childiae</i>	hruškasta óglarka
118.	<i>Daldinia concentrica</i>	slojevita oglarka
119.	<i>Delicatula integrella</i>	navadna belka
120.	<i>Dendrothele acerina</i>	javorjeva lišajevka
121.	<i>Diatrype decorticata</i>	obližasti predirnik
122.	<i>Echinoderma echinaceum</i>	bodičasta trnovka
123.	<i>Entholoma rhodopolium</i>	nizka rdečelistka
124.	<i>Exidia glandulosa</i>	žlezasta zamazanka
125.	<i>Exidia nigricans</i>	smrekova zamazanka
126.	<i>Fistulina hepatica</i>	jetrasta cevača
127.	<i>Flammulina velutipes</i>	zimska panjevka
128.	<i>Fomes fomentarius</i>	bukova kresilka
129.	<i>Fomitiporia robusta</i>	hrastov glivopor
130.	<i>Fomitopsis pinicola</i>	smrekova kresilača
131.	<i>Fuligo septica</i>	čreslov cvet
132.	<i>Galerina sphagnum</i>	šotna kučmica
133.	<i>Ganoderma adspersum</i>	debela pološčenka
134.	<i>Ganoderma applanatum</i>	sploščena pološčenka

135.	<i>Ganoderma lucidum</i>	svetlikava pološčenka
136.	<i>Ganoderma pfeifferi</i>	bakrenasta pološčenka
137.	<i>Ganoderma resinaceum</i>	smolena pološčenka
138.	<i>Geastrum fimbriatum</i>	resičasta zvezdica
139.	<i>Geastrum minimum</i>	drobcena zvezdica
140.	<i>Geastrum striatum</i>	brazdasta zvezdica
141.	<i>Gliophorus irrigatus</i>	orošena vlažničarka
142.	<i>Gloeophyllum odoratum</i>	dišeča tramovka
143.	<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	sivorjava tramovka
144.	<i>Gloeophyllum trabeum</i>	labirintasta tramovka
145.	<i>Gomphidius roseus</i>	rožnati slinar
146.	<i>Gymnopilus penetrans</i>	predirna plamenka
147.	<i>Gymnopus androsaceus</i>	nitasti korenovec
148.	<i>Gymnopus aquosus</i>	žleborobi korenovec
149.	<i>Gymnopus brassicolens</i>	zeljarski korenovec
150.	<i>Gymnopus dryophilus</i>	vitki korenovec
151.	<i>Gymnopus erythropus</i>	sehlični korenovec
152.	<i>Gymnopus foetidus</i>	smrdeči korenovec
153.	<i>Gymnopus fusipes</i>	hrastov korenovec
154.	<i>Hapilopilus rutilans</i>	cimetastai mehkopor
155.	<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	solzeča medlenka
156.	<i>Hebeloma leucosarx</i>	vrbina medlenka
157.	<i>Hebeloma mesophaeum</i>	dvobarvna medlenka
158.	<i>Hebeloma ochroalbidum</i>	bledikasta medlenka
159.	<i>Hebeloma sacchariolens</i>	sladkobna medlenka
160.	<i>Hebeloma sinapizans</i>	redkvičasta medlenka
161.	<i>Helvella acetabulum</i>	pomladanski loputar
162.	<i>Helvella crispa</i>	jesenski loputar
163.	<i>Hemimycena cucullata</i>	bela polčeladica
164.	<i>Hemimycena lactea</i>	smetanasta polčeladica
165.	<i>Heterobasidion annosum</i>	borov trohnož
166.	<i>Hohenbuehelia atrocaerulea</i>	modrikasti ostrigovec
167.	<i>Hortiboletus bubalinus</i>	rumenorjavi vrtnikovec
168.	<i>Hortiboletus engelii</i>	hrastov vrtnikovec
169.	<i>Hortiboletus rubellus</i>	rdeči vrtnikovec

170.	<i>Hydnellum compactum</i>	klena ježevka
171.	<i>Hydnum repandum</i>	rumeni ježek
172.	<i>Hydnum rufescens</i>	rdečkasti ježek
173.	<i>Inocybe obsecta</i>	črtasta razcepljenka
174.	<i>Inocybe acuta</i>	ostrogrba razcepljenka
175.	<i>Inocybe albomarginata</i>	beloroba razcepljenka
176.	<i>Inocybe assimilata</i>	šopasta razcepljenka
177.	<i>Inocybe asterospora</i>	zvezdastotrosna razcepljenka
178.	<i>Inocybe cincinnata</i>	naluskana razcepljenka
179.	<i>Inocybe corydalina</i>	zoprna razcepljenka
180.	<i>Inocybe dulcamara</i>	klobučevinasta razcepljenka
181.	<i>Inocybe flocculosa</i>	kosmičasta razcepljenka
182.	<i>Inocybe fraudans</i>	dišavna razcepljenka
183.	<i>Inocybe fuscidula</i>	žarkasta razcepljenka
184.	<i>Inocybe geophylla</i>	prstenolistna razcepljenka
185.	<i>Inocybe godeyi</i>	Godejeva razcepljenka
186.	<i>Inocybe griseovelata</i>	sivoovojna razcepljenka
187.	<i>Inocybe haemacta</i>	sivozelena razcepljenka
188.	<i>Inocybe lacera</i>	raztrgana razcepljenka
189.	<i>Inocybe napipes</i>	repasta razcepljenka
190.	<i>Inocybe obscurobadia</i>	ozkocistidna razcepljenka
191.	<i>Inocybe sindonia</i>	slamnatorumena razcepljenka
192.	<i>Inocybe splendens</i>	lepa razcepljenka
193.	<i>Inonotus cuticularis</i>	nanizani luknjač
194.	<i>Inonotus nodulosus</i>	grčavi luknjač
195.	<i>Inosperma erubescens</i>	rdečkasti razcepljenec
196.	<i>Jackrogersella cohaerens</i>	grozdasti bulovec
197.	<i>Kretzschmaria deusta</i>	črneča ožganka
198.	<i>Laccaria amethystina</i>	vijoličasta bledivka
199.	<i>Laccaria laccata</i>	rdečkasta bledivka
200.	<i>Laccaria tortilis</i>	sloka bledivka
201.	<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	kosmati črnivec
202.	<i>Lactarius acerrimus</i>	kratkobetna mlečnica
203.	<i>Lactarius aurantiacus</i>	oranžna mlečnica
204.	<i>Lactarius blennius</i>	bukova mlečnica

205.	<i>Lactarius camphoratus</i>	kafrna mlečnica
206.	<i>Lactarius circellatus</i>	gabrova mlečnica
207.	<i>Lactarius decipiens</i>	varljiva mlečnica
208.	<i>Lactarius deliciosus</i>	užitna sirovka
209.	<i>Lactarius deterrimus</i>	smrekova sirovka
210.	<i>Lactarius fuliginosus</i>	čadasta mlečnica
211.	<i>Lactarius pallidus</i>	medla mlečnica
212.	<i>Lactarius pyrogalus</i>	leskina mlečnica
213.	<i>Lactarius rufus</i>	rdečerjava mlečnica
214.	<i>Lactarius quietus</i>	hrastova mlečnica
215.	<i>Lactarius semisanguifluus</i>	navadna sirovka
216.	<i>Lactarius serifluus</i>	vodenasta mlečnica
217.	<i>Lactarius subdulcis</i>	sladkasta mlečnica
218.	<i>Lactarius tabidus</i>	sfrknjena mlečnica
219.	<i>Lactifluus piperatus</i>	poprov mlečnik
220.	<i>Lactifluus vellereus</i>	polsteni mlečnik
221.	<i>Laeticutis cristata</i>	zeleneči razpokanec
222.	<i>Laetiporus sulphureus</i>	žvepleni lepoluknjičar
223.	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>	gabrov dedek
224.	<i>Leccinum aurantiacum</i>	trepetlikov turek
225.	<i>Lentinellus flabelliformis</i>	pahljačasta žilavka
226.	<i>Lentinus arcularius</i>	rombasta strnjenka
227.	<i>Lenzites betulina</i>	brezova lenzovka
228.	<i>Leotia lubrica</i>	zdrizasta kapičarka
229.	<i>Lepiota castanea</i>	kostanjasti dežniček
230.	<i>Lepiota clypeolaria</i>	obuti dežniček
231.	<i>Lepiota cristata</i>	smrdljivi dežniček
232.	<i>Lepiota cristatoides</i>	zoprni dežniček
233.	<i>Lepiota forquignonii</i>	olivnorjavi dežniček
234.	<i>Lepiota helveola</i>	pogubni dežniček
235.	<i>Lepiota ignivolvata</i>	rdečedniščni dežniček
236.	<i>Lepiota subincarnata</i>	rožnati dežniček
237.	<i>Lepista densifolia</i>	hostna kolesnica
238.	<i>Lepista glaucocana</i>	bledovijoličasta kolesnica
239.	<i>Lepista nuda</i>	vijoličasta kolesnica

240.	<i>Leucoagaricus leucothites</i>	rožnolistni kukmakovec
241.	<i>Leucoagaricus subcretaceus</i>	mekinasti kukmakovec
242.	<i>Leucocybe connata</i>	bela svetloglavka
243.	<i>Lycogala epidendrum</i>	razbarvana grahovka
244.	<i>Lycoperdon molle</i>	rjava prašnica
245.	<i>Lycoperdon perlatum</i>	betičasta prašnica
246.	<i>Lyophyllum decastes</i>	rjavi zajček
247.	<i>Lyophyllum immundum</i>	umazani zajček
248.	<i>Lyophyllum loricatum</i>	trdokožni zajček
249.	<i>Macrolepiota excoriata</i>	poljski dežnik
250.	<i>Macrolepiota mastoidea</i>	grbičasti dežnik
251.	<i>Macrolepiota permixta</i>	sramežljivi dežnik
252.	<i>Macrolepiota procera</i>	orjaški dežnik
253.	<i>Mallocybe agardhii</i>	Agardhova naluskanka
254.	<i>Marasmius bulliardii</i>	Bulliardova sehlica
255.	<i>Marasmius cohaerens</i>	trdobetna sehlica
256.	<i>Marasmius epodius</i>	padalasta sehlica
257.	<i>Marasmius oreades</i>	dišeča sehlica
258.	<i>Marasmius rotula</i>	ovratniška sehlica
259.	<i>Marasmius wynneae</i>	vijoličasta sehlica
260.	<i>Megacollybia platyphylla</i>	širokolistna velekoronovka
261.	<i>Melanoleuca melaleuca</i>	navadna gostolistka
262.	<i>Melogramma spiniferum</i>	bukova trgača
263.	<i>Meripilus giganteus</i>	črneča velezraščenska
264.	<i>Mucidula mucida</i>	sluzasta porcelanka
265.	<i>Muscinipta laevis</i>	mahov pahljačnik
266.	<i>Mutinus caninus</i>	pasji klinček
267.	<i>Mycena aetites</i>	sivorjava čeladica
268.	<i>Mycena capillaripes</i>	lasastobetna čeladica
269.	<i>Mycena cinerella</i>	pepelasta čeladica
270.	<i>Mycena citrinomargonata</i>	rumenoroba čeladica
271.	<i>Mycena crocata</i>	žoltosočna čeladica
272.	<i>Mycena epipterygia</i>	prevlečena čeladica
273.	<i>Mycena fagetorum</i>	bukovinska čeladica
274.	<i>Mycena filopes</i>	jodoformova čeladica

275.	<i>Mycena galericulata</i>	nagubana čeladica
276.	<i>Mycena galopus</i>	mlečna čeladica
277.	<i>Mycena inclinata</i>	pripognjena čeladica
278.	<i>Mycena leptcephala</i>	klorova čeladica
279.	<i>Mycena meliigena</i>	lubjeva čeladica
280.	<i>Mycena olivaceomarginata</i>	pašniška čeladica
281.	<i>Mycena polygramma</i>	nažlebičena čeladica
282.	<i>Mycena pseudocorticola</i>	modra čeladica
283.	<i>Mycena pura</i>	redkvičasta čeladica
284.	<i>Mycena renati</i>	Renejeva čeladica
285.	<i>Mycena rosea</i>	strupena čeladica
286.	<i>Mycena silvae-nigrae</i>	alkalna čeladica
287.	<i>Mycena stipata</i>	šopasta čeladica
288.	<i>Mycena urania</i>	sivomodra čeladica
289.	<i>Mycetinis alliaceus</i>	dolgobetna česnovka
290.	<i>Mycetinis scorodoni</i>	začimbna česnovka
291.	<i>Nectria cinnabarina</i>	cinobrasta bradavička
292.	<i>Neofavolus alveolaris</i>	satjasta novostrnjenka
293.	<i>Neolentinus lepideus</i>	luskata nazobčanka
294.	<i>Otidea onotica</i>	oslovsko uho
295.	<i>Oxyporus corticola</i>	trepetlikin gostopor
296.	<i>Panaeolina foenisecii</i>	košenična govsnarka
297.	<i>Panellus stipticus</i>	trpki zgručevac
298.	<i>Panus conchatus</i>	školjkasti strnjenec
299.	<i>Panus neostriatus</i>	pusti strnjenec
300.	<i>Paralepista flaccida</i>	ohlapni kolesnik
301.	<i>Parasola conopsea</i>	stožčasta črnilovka
302.	<i>Parasola plicatilis</i>	zgubana črnilovka
303.	<i>Paxillus involutus</i>	navadna podvihanka
304.	<i>Paxillus rubicundulus</i>	jelševa podvihanka
305.	<i>Phaeolus schweinitzii</i>	žoltorobi rjavopor
306.	<i>Phallus impudicus</i>	smrdljivi mavrahovec
307.	<i>Phellinus igniarius</i>	vrbov plutač
308.	<i>Phellinus pomaceus</i>	sadni plutač
309.	<i>Phlebia rufa</i>	zvegana žilnica

310.	<i>Phlebia tremellosa</i>	drhtava žilnica
311.	<i>Phlegmacium triumphans</i>	okrašena sluzarka
312.	<i>Pholiota gummosa</i>	prožni luskinar
313.	<i>Pholiota limonella</i>	limonasti luskinar
314.	<i>Pholiota squarrosa</i>	hrapavi luskinar
315.	<i>Pleurocybella porrigens</i>	zleknjena školjkarica
316.	<i>Pleurotus dryinus</i>	hrastov ostrigar
317.	<i>Pleurotus pulmonarius</i>	poletni ostrigar
318.	<i>Plicaturopsis crispa</i>	bukova žilika
319.	<i>Pluteus cervinus</i>	jelenova ščitovka
320.	<i>Pluteus leoninus</i>	rumena ščitovka
321.	<i>Pluteus nanus</i>	pritlikava ščitovka
322.	<i>Pluteus petasatus</i>	klobukasta ščitovka
323.	<i>Pluteus romellii</i>	Romellova ščitovka
324.	<i>Pluteus roseipes</i>	rožnobetna ščitovka
325.	<i>Pluteus salicinus</i>	vrbova ščitovka
326.	<i>Pluteus semibulbosus</i>	čebulasta ščitovka
327.	<i>Postia tephroleuca</i>	pepelinosivi skutovec
328.	<i>Propolis farinosa</i>	naprašena vgreznjenka
329.	<i>Psathyrella piluliformis</i>	prosojna črnivka
330.	<i>Psathyrella spadiceogrisea</i>	sivorjava črnivka
331.	<i>Pseudoboletus parasiticus</i>	zajedalski pagoban
332.	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	navadna ledenka
333.	<i>Pseudoinonotus dryadeus</i>	roseči luknjevec
334.	<i>Pulvinula convexella</i>	rdečkasta blazinica
335.	<i>Ramaria botrytis</i>	rdeča griva
336.	<i>Ramaria flava</i>	rumena griva
337.	<i>Reticularia lycoperdon</i>	cvetačasta prašilka
338.	<i>Rheubarbariboletus armeniacus</i>	marelični škrlatnik
339.	<i>Rhodocollybia maculata</i>	pegasta korenarka
340.	<i>Rhytisma acerinum</i>	javorjeva obliževka
341.	<i>Rickenella fibula</i>	oranžnorumena mahoživka
342.	<i>Roridomyces roridus</i>	osluzena čeladnica
343.	<i>Russula adusta</i>	osmojena golobica
344.	<i>Russula aeruginea</i>	zelena golobica

345.	<i>Russula amoena</i>	vabljiva golobica
346.	<i>Russula amoenolens</i>	vonjava golobica
347.	<i>Russula atropurpurea</i>	škrlatna golobica
348.	<i>Russula aurea</i>	zlatolistna golobica
349.	<i>Russula betularum</i>	brezovinska golobica
350.	<i>Russula caerulea</i>	grbičasta golobica
351.	<i>Russula carpini</i>	gabrova golobica
352.	<i>Russula cavipes</i>	votlobetna golobica
353.	<i>Russula cessans</i>	borova golobica
354.	<i>Russula chloroides</i>	ozkolistna golobica
355.	<i>Russula claroflava</i>	rumena golobica
356.	<i>Russula curtipes</i>	kratkobetna golobica
357.	<i>Russula cyanoxantha</i>	modrikasta golobica
358.	<i>Russula decolorans</i>	siveča golobica
359.	<i>Russula delica</i>	modrolistna golobica
360.	<i>Russula emetica</i>	bljuvna golobica
361.	<i>Russula exalbicans</i>	razbarvana golobica
362.	<i>Russula faginea</i>	bukova golobica
363.	<i>Russula fellea</i>	žolta golobica
364.	<i>Russula foetens</i>	smrdljiva golobica
365.	<i>Russula fragilis</i>	krhka golobica
366.	<i>Russula fusconigra</i>	rjavočrna golobica
367.	<i>Russula grisea</i>	sivkasta golobica
368.	<i>Russula heterophylla</i>	rjavozelena golobica
369.	<i>Russula insignis</i>	mila golobica
370.	<i>Russula integra</i>	usnjasta golobica
371.	<i>Russula ionochlora</i>	siva golobica
372.	<i>Russula laeta</i>	spolzka golobica
373.	<i>Russula luteotacta</i>	rumeneča golobica
374.	<i>Russula minutula</i>	drobcena golobica
375.	<i>Russula nitida</i>	bleščava golobica
376.	<i>Russula ochracea</i>	okrasta golobica
377.	<i>Russula olivacea</i>	olivna golobica
378.	<i>Russula pallidospora</i>	rumenolistna golobica
379.	<i>Russula parazurea</i>	sivomodra golobica

380.	<i>Russula pectinatoides</i>	rjavobetna golobica
381.	<i>Russula risigallina</i>	marelična golobica
382.	<i>Russula romellii</i>	malinova golobica
383.	<i>Russula rosea</i>	trda golobica
384.	<i>Russula roseipes</i>	rožnobetna golobica
385.	<i>Russula sanguinaria</i>	češnjeva golobica
386.	<i>Russula solaris</i>	sončna golobica
387.	<i>Russula sororia</i>	sestrska golobica
388.	<i>Russula cuprea</i>	žgoča golobica
389.	<i>Russula vesca</i>	užitna golobica
390.	<i>Russula veternosa</i>	krhljiva golobica
391.	<i>Russula violeipes</i>	vijoličnobetna golobica
392.	<i>Russula virescens</i>	zelenkasta golobica
393.	<i>Schizophyllum commune</i>	navadna cepilistka
394.	<i>Schizopora paradoxa</i>	nenavadna razporka
395.	<i>Scleroderma areolatum</i>	mekinasta trdokožnica
396.	<i>Scleroderma bovista</i>	kroglasta trdokožnica
397.	<i>Scleroderma cepa</i>	gladka trdokožnica
398.	<i>Scleroderma citrinum</i>	navadna trdokožnica
399.	<i>Scleroderma verrucosum</i>	bradavičasta trdokožnica
400.	<i>Scutellinia minor</i>	drobna ščetinka
401.	<i>Scutellinia scutellata</i>	ščitasta ščetinka
402.	<i>Scutellinia trechispora</i>	hrapavotrosna ščetinka
403.	<i>Sparassis crispa</i>	borov glivec
404.	<i>Stemonitis fusca</i>	valujoča nitkarica
405.	<i>Stereum gausapatum</i>	kosmata slojevka
406.	<i>Stereum hirsutum</i>	dlakava slojevka
407.	<i>Stereum subtomentosum</i>	žametasta slojevka
408.	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	črni kuštravec
409.	<i>Suillellus luridus</i>	svinjski lupljivec
410.	<i>Suillellus mendax</i>	varljivi lupljivec
411.	<i>Suillus bovinus</i>	prožna lupljivka
412.	<i>Suillus grevillei</i>	macesnova lupljivka
413.	<i>Suillus luteus</i>	maslena lupljivka
414.	<i>Suillus placidus</i>	bela lupljivka

415.	<i>Suillus viscidus</i>	siva lupljivka
416.	<i>Tapinella atrotomentosa</i>	žametni podvihanec
417.	<i>Tephrocyebe rancida</i>	žarka sivolistka
418.	<i>Thaxterogaster croceocoeruleus</i>	žoltovišnjeva trebušarka
419.	<i>Thelephora penicillata</i>	čopičasta roža
420.	<i>Trametes gibbosa</i>	grbasta ploskocevka
421.	<i>Trametes hirsuta</i>	nakosmatena ploskocevka
422.	<i>Trametes ochracea</i>	kolobarčasta ploskocevka
423.	<i>Trametes pubescens</i>	puhasta ploskocevka
424.	<i>Trametes trogii</i>	navadna ploskocevka
425.	<i>Trametes versicolor</i>	pisana ploskocevka
426.	<i>Trametopsis cervina</i>	rjaveča ploskocevnica
427.	<i>Trichaptum biforme</i>	papirasta apnenka
428.	<i>Trichoderma citrinum</i>	citronasta blazinka
429.	<i>Tricholoma atrosquamosum</i>	črnoluska kolobarnica
430.	<i>Tricholoma columbetta</i>	golobičja kolobarnica
431.	<i>Tricholoma filamentosum</i>	rjavoluska kolobarnica
432.	<i>Tricholoma scalpturatum</i>	rumeneča kolobarnica
433.	<i>Tricholoma sciodes</i>	pogubna kolobarnica
434.	<i>Tricholoma ustale</i>	osmojena kolobarnica
435.	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	rdečkasta trhlenka
436.	<i>Tubaria furfuracea</i>	svetloroba trobljica
437.	<i>Tubifera ferruginosa</i>	oranžna ikrovka
438.	<i>Tylopilus felleus</i>	žolčasti grenivec
439.	<i>Vanderbylia fraxinea</i>	jesenova večnoluknjičarka
440.	<i>Vuilleminia comedens</i>	uničujoča viljeminka
441.	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	rdečebetni polstenec
442.	<i>Xerocomellus cisalpinus</i>	modreči polstenec
443.	<i>Xerocomellus porosporus</i>	topotrosni polstenec
444.	<i>Xerocomellus pruinatus</i>	poprhnjeni polstenec
445.	<i>Xerocomus subtomentosus</i>	navadna polstenka
446.	<i>Xylaria hypoxylon</i>	vitka lesenjača
447.	<i>Xylaria polymorpha</i>	kopučasta lesenjača
448.	<i>Xylodon sambuci</i>	bezgov zobnik

Pregled vrst gliv

V nadaljevanju so vse vrste gliv iz zgornjega seznama opisane in prikazane:

- z avtorskimi fotografijami članov društva,
- s fotografijami s spletne strani Gobarskega društva Lisička Maribor in
- s fotografijami iz drugih spletnih virov, ki so navedeni pri literaturi in virih informacij.

Fotografijam smo dodali tudi krajše opise gliv. Več podatkov o opisanih vrstah gliv pa je mogoče dobiti na spletni strani društva, www.gobe.si.

Obrazložitev za opise različnih vrst gliv – primer:

OPIS GLIVE:

Velikoluska mušnica

Amanita strobiliformis

(*Paulet ex Vittad.*) Bertill. (1866)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

Z, RS

spada med največje mušnice. Je bela, z velikimi, rombasto oblikovanimi luskami na klobuku, belimi lističi in belim betom, raste v večjem delu Evrope, na apnenčastih tleh. Mikorizna vrsta, prostorosnica. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021

POMEN:

Slovensko dvotirno (binarno) ime določene vrste glive (vrsta in rod)

Latinsko dvotirno (binarno) ime določene vrste glive z navedbo avtorja(ev) in letnico opisa (latinska imena gliv so posodobljena z mednarodno podatkovno bazo gliv, Index Fungorum, v času priprave brošure)

Zeleno osenčene rimske številke označujejo mesece rasti določene vrste glive

mušničarke – terminološka označba družine za določeno vrsto glive

Z – zavarovana vrsta glive

RS – gliva iz rdečega seznama gliv Slovenije

Kratek opis glive in mesta najdbe

Leto popisa določene vrste glive

(1) Dvoletni polluknjičar*Abortiporus biennis* (Bull.) Singer (1944)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

rožičarke (*Podoscyphaceae*)

goba ima školjkasto obliko trosnjaka, ki je nepravilno valovit, sprva bele barve, s starostjo postane okraštih do rjavih barv. Saprofit do šibki parazit in prostotrosnica, troši se nahajajo na belih luknjicah pod trosnjakom. Na pritisk trosovnica porjavi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(3) Mestni kukmak***Agaricus bitorquis* (Qué.) Sacc. (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima bel do sivo rumen klobuk, starejši ima čokoladno rjave lističe in beli bet z dvojnimi obročkoma. Spada med saprofite in prostotrosnice, troši so na sprva rožnatih in kasneje na tobačno rjavih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022**(5) Möllerjev kukmak***Agaricus moelleri* Wasser (1976)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima polkroglast klobuk s sploščenim temenom, kasneje je izbočen in prekrit s rjavimi luskami, bet je bel. Saprofit in prostotrosnica, troši se nahajajo na sprva rožnatih in kasneje na črno rjavih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(2) Dvotrosni kukmak***Agaricus bisporus* (J.E. Lange) Imb. (1946)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima polkroglast klobuk, ki je sprva bel nato prekrit s rjavimi luskami na beli podlagi. Bet je bel, nad obročkom rožnat. Saprofit in prostotrosnica, troši se nahajajo na sprva rožnatih in kasneje na črno rjavih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(4) Travniški kukmak***Agaricus campestris* L. (1753)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

bel klobuk postane rjavkast, rumenkast ali rdečkast, sprva pokrožen, izbočen, kasneje zravn, gladek ali nekoliko luskat, v sušnem obdobju površinsko razpok. Saprofit in prostotrosnica, troši so na rožnatih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2024**(6) Oblogasti kukmak***Agaricus placomyces* Peck (1878)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

suh klobuk je prekrit s sivkasto rjavim pigmentom, zlasti nad sredino; ko odrašča razpade in tvori pigmentne proge in vlakna. Spada med saprofite in prostotrosnice, troši so na sprva rožnatih in kasneje na tobačno rjavih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



1



2



3



4



5



6

(7) Pritlikavi kukmak*Agaricus semotus* Fr. (1863)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

zelo majhna goba z rožnatim izbočenim klobukom in z blede rumenim betom. Saprofit in prostotrosnica, troši so na sprva sivo rožnatih in kasneje na sivo črnih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(9) Hostni kukmak***Agaricus sylvicola* (Vittad.) Peck (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

bela goba s sploščenim temenom na klobuku in z dolgim pogosto ukrivljenim belim betom. Saprofit in prostotrosnica, troši so na rožnatih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(11) Oranžna latvica***Aleuria aurantia* (Pers.) Fuckel (1870)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ognjarke (*Pyronemataceae*)

trošnjak je čašaste oz. skledaste oblike, hitro postane nepravilen, plosko razširjen, prirasel na podlago brez beta, večinoma v skupinah. Saprofitna vrsta, ki s svojim razkrajanjem zemljo obogatijo z ogljikom in dušikom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2015**(8) Gozdni kukmak***Agaricus sylvaticus* Schäff. (1774)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

skoraj okrogel klobuk je izbočen, nato razprt in rahlo grbast. Na belkasti podlagi so proti temenu vse bolj goste, rjavo okrase, do temno rjave enakomerno razporejene luske, ki se prilegajo površini. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(10) Karbolni kukmak***Agaricus xanthodermus* Genev. (1876)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

plosko zravnani klobuk z gladko površino, brez sijaja, včasih s temnejšo sredino, v starosti včasih rahlo vlaknasto natrgan, rob dolgo podvihan, mestoma ovešen z ostanki bele ovojnice. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(12) Citronasta močvirka***Alnicola citrinella* P.-A. Mo.&A. de Ha. (2013)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koreninarke (*Hymenogastraceae*)

nepravilno sedlast klobuk je blede rumenkaste, kasneje do sivo rjave barve, osredje je temnejše, površina je fino dlakasta ali drobno luskata, v starosti je včasih razpokana. Saprofit in prostotrosnica, troši so na rožnatih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022



7



8



9



10



11



12

(13) Srebrni lupinar*Amanita argentea* Huijsman (1959)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

goba s sprva zvonastim in kasneje razprtim sivim klobukom ter belkastim betom, ki nima obročka. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrosnica, trosi so na belih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(15) Pozlačeni lupinar***Amanita ceciliae* (Berk. & Bro.) Bas (1984)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

ko lupina razpoka, ostane v obliki krpic na klobuku in sicer na gladki površini kot debele bele krpice, pozneje sive in končno črne, ki jih lahko z lahkoto odstranimo. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrosnica, trosi so na belih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(17) Ostrokrpa mušnica***Amanita echinocephala* (Vit.) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

površina klobuka je bela, pozneje okraša, srebrno siva, prekrita z debelimi, piramidastimi, v glavnem ostrimi in koničastimi bradavicami, ki v dežju rade odpadejo. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(14) Dvobarvni lupinar***Amanita battarrae* (Boud.) Bon (1985)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

stožčasto zvonast, rahlo lepljiv klobuk je rjavo sivkast, z rjavkastim obročem in nažlebkanim obrobjem. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrosnica, trosi so na belih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(16) Citronasta mušnica***Amanita citrina* (Berk. & Bro.) Bas (1984)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

skoraj v celoti citronasto rumena goba s sprva polkrožnim in kasneje z razprtim klobukom, pokritim s hrapavimi ostanki ovojnice, ima obroček na betu. Mikorizna vrsta z listavci ali iglavci in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(18) Elijeva mušnica***Amanita eliae* Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

površina mladega klobuka docela prekrita z belkastim ovojem, ki pa se naglo grudasto natrga, pri polno razvitem klobuku je površina gladka, brez leska, sredina oker z odtenki lososove do sivorumene, proti robu svetlejša do belkasta. Najdena na območju 3.

Popis: 2023



13



14



15



16



17



18

(19) Podaljšana mušnica*Amanita excelsa* (Fr.) Bertill. (1866)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

klobuk je na površini pepelno siv ali sajasto rjavkast, prekrit s svetlosivimi krpami, star pa je gol in ima gladko obrobje. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci, prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024**(21) Medlorumena mušnica***Amanita gemmata* (Fr.) Bertill. (1866)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

klobuk sprva polkrožen, nato razprt, bolj ali manj izrazitih rumenih barv, z ostanki bele ovojnice, le redko brez pik. Na obrobju nažlebkano, s tankim robom. Mikorizna vrsta, prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(23) Zelena mušnica***Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Lin. (1833)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

sprva kroglasta kepica, ovita v gladko, belo, kožasto lupino ali velum, ki pri nadaljnji rasti na vrhu počí, iz razpoke pa se dvigne polkrožen klobuk na dolgem betu. Na njem je pod lističi kožast obroček ali zastiralce, gomoljasto dnišče pa obdaja lupina. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(20) Rjavi lupinar***Amanita fulva* Fr. (1815)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

klobuk z grbico na temno rjavem temenu, proti robu svetlejši, rumeno-rdeče rjav, obrobje močno nažlebkano in brez ostankov ovojnice. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci, je prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(22) Rdeča mušnica***Amanita muscaria* (L.) Lam. (1783)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

mesnat klobuk postane zravnano in proti koncu z navzgor zavihanimi robovi, površina je rdeča in gladka, z belimi pikami, ki jih včasih odplakne dež. Mikorizna vrsta, prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(24) Rdečkasta mušnica***Amanita rubescens* Pers. (1797)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mušničarke (*Amanitaceae*)

spoznamo jo po sivih krpicah na klobučku, gladkem obrobju, nažlebkane zastiralcu, predvsem pa po rdečem mesu, zlasti v dnišču beta in na razjedah od črvov. Mikorizna vrsta, prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021



19



20



21



22



23



24

(25) Velikoluska mušnica*A. strobiliformis* (Paul. ex Vit.) Bert. (1866)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mušničarke (*Amanitaceae*) **Z, RS**

spada med največje mušnice. Je bela, z velikimi, rombasto oblikovanimi luskami na klobuku, belimi lističi in belim betom, raste v svetlih, pretežno listnatih gozdovih srednje Evrope, na apnenčastih tleh. Mikorizna vrsta, prostorosnica. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(27) Betičasta livkarica***Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.) Redh., Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (2002)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

polžarke (*Hygrophoraceae*)

klobuk je lijasto ugreznjen, včasih z rahlo grbico na sredini, rjave ali sivo rjave barve, obrobje svetlejš, v sredini mesnat, ob robu tanek, površina gladka. Spada med saprofite, ki rastejo v mešanih gozdovih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(29) Hruškasta prašničarka***Apioperdon pyriforme* (Schäff.) Vizzini, Vizzini & Ercole (2017)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

prašničarke (*Lycoperdaceae*)

goba ima hruškasto obliko in je sprva bela, nato cela rjava, bet je zašiljen, raste pa na trhljem lesu. Saprofit in prostotrosnica, trosi so v glavi trosnjaka in kot rjav prah uhajajo skozi odprtino na vrhu trosnjaka. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(26) Sivi lupinar***Amanita vaginata* (Bull.) Fr. (1783)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mušničarke (*Amanitaceae*)

zraste iz lupinastega ovoja, vendar nikoli nima zastiralca na betu, obrobje klobučka pa je že od vsega začetka močno nažlebkano. Spada med mikorizne vrste, je prostorosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Goba je bila najdena na območju 3.

Popis: 2024**(28) Bukovinska trhlička***Antrodiella serpula* (P. Karst.) Spirin & Niemelä (2006)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

bodičkarke (*Steccherinaceae*)

belkasta goba konzolne in polokrogle oblike, ki raste na lesu in povzroča belo trohnobo. Lignikolna gliva, parazit in prostotrosnica, ki raste na listavcih, trosi so na spodnjem delu klobuka. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(30) Pepelasta kelihovka***Arcyria cinerea* (Bull.) Pers. (1801)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kelihovkarke (*Arcyriaceae*)

trošnjaki so blede sive, rumeno-okker do oranžno-okker barve s trosovnico, ki je podolgovata in rastejo v šopih ali v skupinah drug ob drugem. Spadajo med saprofite, sluzaste plesni, ki jedo bakterije s površin lesa ali trohnečih ostankov. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024




25



26



27



28



29



30

(31) Rumenovenčna mraznica*Armillaria gallica* Marx. & Romagn. (1987)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

širokolistarke (*Physalacriaceae*)

šopasto rastoča goba z rjavimi klobuki in obročki oz. venci rumene barve na rjavih betih. Saprofit in parazit, ki raste na štorih listavcev in iglavcev, prostotrošnica, troši so na rjavih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(33) Črnomekinasta mraznica***Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink (1973)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

širokolistarke (*Physalacriaceae*)

šopasto rastoča goba z rjavkastimi klobuki in z luskami ter z belkastimi obročki z rjavo obrobo na betih. Saprofit in parazit, ki raste na listavcih in iglavcih, prostotrošnica, troši so na rjavkastih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(35) Mesnata želatinka***Ascocoryne sarcoides* (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson (1967)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

žlatinovke (*Gelatinodiscaceae*)

žlatinasta goba vijolično-rjavkaste barve raste na odmrlih delih listavcev. Trošnjak je udrt in ima kratek bet. Saprofit in zaprtotrošnica, troši se nahajajo na površini gobe. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(32) Sivorumena mraznica***Armillaria mellea* (Vahl) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

širokolistarke (*Physalacriaceae*)

šopasto rastoča goba sivorumene barve z luskami na klobukih in z beti z obročki. Saprofit in parazit z listavci ali iglavci in prostotrošnica, troši so na sprva belih in kasneje rjavkastih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(34) Cvetoča grmulja***Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich (1982)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

žličarke (*Auriscalpiaceae*) **RS**

lesna goba z grivastim trosnjakom okrase barve in z vejami ter z vršički v obliki dvignjene odprte dlani rok. Saprofit in prostotrošnica, troši so na površini vejic. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(36) Vlagomerni zvezdež***Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morgan (1889)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

belo sivi, ploščato okrogli in kroglasto zaprti, nekoliko mazavi, kasneje pa se na površini zemlje zvezdasto odprejo in razširijo ter razpočijo se v 5 do 10 olivno sivih ali rjavih krakov. Saprofit in prostotrošnica, troši so v notranjosti kroglice. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



31



32



33



34



35



36

(37) Voskasta travnica

Atheniella flavoalba (Fr.) Redh., Moncalvo,
Vilgalys, Desjard. & B.A. Perry (2012)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladičevke (*Mycenaceae*)

majhna gobica s stožčasto izbočenim svetlo rumenim klobukom z voskasto površino ter z dolgim in tankim betom. Saprofit in prostotrošnica, troši so na belih lističih, ki so pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021

(39) Brestova uhljevka

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. (1822)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

uhljarke (*Auriculariaceae*)

ušesu podobna sivo rjava goba z elastično strukturo in zelo kratkim betom. Saprofit ali parazit, ki raste na brestih in na drugih listavcih, prostotrošnica, troši so na spodnji strani trošnjaka. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024

(41) Mediteranska skorjederka

Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze
(1891)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

risbaričarke (*Graphostromataceae*)

trošnjak je rastlinski patogen nepravilno podolgovate oblike, ki se razraste v širokih kolonijah na skorji listnatih dreves, ima črno skorjo in hrapavo površino ter povzroča lesno trohnobo, skorja odмира in poka ter odpada. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(38) Bezgova uhljevka

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quel. (1886)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

uhljarke (*Auriculariaceae*)

ušesu podobna rjava goba z želatinasto tresočo strukturo raste na bezgih in ima žilavo ter prožno meso. Saprofit in parazit na listavcih in prostotrošnica, troši so na celotni notranji strani trošnjaka. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2025

(40) Navadna žlička

Auriscalpium vulgare Gray (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

žličarke (*Auriscalpiaceae*)

majhna rjavkasta gobica ima klobuk žličaste oblike in dolg tanek bet. Običajno raste pa na borovih storžih. Spada med saprofite in prostotrošnice, troši so na bodičasti trošovnici, ki je pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021

(42) Novčičasta skorjederka

Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze
(1891)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

risbaričarke (*Graphostromataceae*)

trošnjak je rastlinski patogen nepravilno novčičaste oblike, ki se razraste v širokih kolonijah na skorji bukovih dreves in ima sijočo črno skorjo ter hrapavo površino. Povzroča lesno trohnobo. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



37



38



39



40



41



42

(43) Osmojena bjerkandera*Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. (1879)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mrenovkarke (*Phanerochaetaceae*)

goba pepelnato sive barve raste kot pahljača na odmrlih delih listavcev in nima beta. Saprofit in prostotrosnica, troši so v luknjičasti trosovnici na spodnji strani. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(45) Olivnorumeni smetiščar***Bolbitius titubans (Bull.) Fr. (1838)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

smetiščarke (*Bolbitiaceae*)

klobuk s topo grbo na temenu, površina močno sluzava. Barva v suši zbledi v skoraj belo barvo ali pa je olivno zelena; rob do tretjine širine klobuka brazdasto našlebkano, rob oster, star valovit do natrgan. Saprofit in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022**(47) Jesenski goban***Boletus edulis Bull. (1782)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima vlažen, lepljivem klobuk, včasih je precej temno rjav, tako da je tudi meso pod kožico klobuka rdečkasto rjavo obarvano, redko pa je površina povsem gladka. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, troši so na beli luknjičasti trosovnici pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2016**(44) Čokata bjerkandera***Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. (1879)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mrenovkarke (*Phanerochaetaceae*)

trošnjak je konzolaste oblike in rad naseljuje vrbe, ne samo saprofitsko, temveč tudi kot parazit. Gobe običajno rastejo prekrivajoč se kot strešniki, pri čemer okoli in okoli obraščajo deblo. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(46) Vresin goban***Boletus badiorufus R. Heim (1960)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

cevarke (*Boletaceae*)

temno rumenorjav do rjavoškrlaten klobuk je sprva polkrogel, zavihan rob obrobljen s svetlim bledim obstojnim robom, bet je oker do blede rumenkast, prekrit z rjavimi pikami. Mikorizna vrsta z bori in hrasti. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(48) Poletni goban***Boletus reticulatus Schöff. (1774)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

cevarke (*Boletaceae*)

goba z žametastim klobukom svetlo rjave barve in s svetlo rjavim betom z rjavo mrežico. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, troši so na beli luknjičasti trosovnici pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



43



44



45



46



47



48

(49) Zlatorumena raševinovka*Botryobasidium aureum* Parmasto (1965)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

raševinovkarke (*Botryobasidiaceae*)

ohlapno priraščen trosnjak ustvari bombažno do luskasto prevleko z resupinatno trosovnico in različnimi površinskimi teksturami na substratu, ki je pretežno les. Spada med saprofite, trosi so na površini. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(51) Mali kadilček***Bovista pusilla* (Batsch) Pers. (1801)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

prašničarke (*Lycoperdaceae*)

majhna belkasta in okrogla gobica raste na travnikih in pašnikih. Saprofitna vrsta in prostotrosnica, trosi so v celotni notranjosti gobe, trosnjak je sprva bel, končno pa se spremeni v rjavi prah. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022**(53) Rumeni maslenec***Butyriboletus appendiculatus* (Schöff.) D. Arora & J.L. Frank (2014)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

gobanom podobna goba, ki ima že od vsega začetka rasti rumeno trosovnico, rjav klobuček, rumene cevke pod klobukom (tam so trosi) in rumen mrežast bet brez rdečkastih lis. Mikorizna vrsta z listavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(50) Sivokožni kadilček***Bovista plumbea* Pers. (1795)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

prašničarke (*Lycoperdaceae*)

majhna belkasta in okrogla gobica raste na travnikih in pašnikih. Ko se debela zunanja plast ali ovojnica odlušči, se pokaže notranji, sivi, tanki ovoj, ki dobi na vrhu luknjo, skozi katero pri dotiku uhajajo zreli trosi. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2017**(52) Nečedna bolgarka***Bulgaria inquinans* (Pers.) Fr. (1822)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

membranarke (*Phacidiaceae*)

trosnjaki (apoteciji) so želeju podobni črni diski, ki služijo za širjenje trosov in rastejo najpogosteje na hrastovih drevesih. Zunanja površina je polstena in temno rjava. Spadajo med saprofite do šibke rastlinske patogene. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2014**(54) Kraljevi maslenec***Butyriboletus regius* (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank (2014)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

en od naših najlepših gobanom podobnih gob z rožnato rdečim klobukom, živo rumeno trosovnico in betom, ki na pritisk ne pomodri. Mikorizna vrsta, ki raste v svetlih, toplih, listnatih gozdovih, na apnenčastih tleh. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



49



50



51



52



53



54

(55) Oranžni pokrivač

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto (1967)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

rašpovkarke (*Irpicaceae*)

Trosnjak tvori resupinat na substratu, ki je večinoma les, tanko plast, površina je nagubana, v začetku rasti bela, nato smetanaste in končno rjavkaste barve, rob je volnat, bel in se pogosto lušči od podlage. Saprofitna vrsta. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022

(57) Rogasti rožiček

Calocera cornea (Batsch) Fr. (1827)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

solzarke (*Dacrymycetaceae*)

Oranžno-rumeni trosnjak je zelo podoben pokončnim debelim iglicam, majhni rogci na konceh pa so proti vrhu zašiljeni. Saprofitna goba, ki raste na listavcih in prostotrosnica, trosi so na zunanji površini zgornjih delov vitkih in pokončnih rožičkov. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021

(59) Pisani koprenar

Calonarius dibaphus (Fr.) Niskanen & Liimat. (2022)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba se skoraj v celoti spreminja od vijoličastih do rožnato lilastih odtenkov. Klobuk je sprva polkroglast, pozneje se raztegne, a ostane izbočen in sluzast. Pod klobukom so gosti lističi, kjer so trosi, ki so rjave barve. Mikorizna z listavci in iglavci. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022

(56) Grenki postavnež

Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini (2014)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

Klobuk je polkrožen, nato blazinast, suh, blede siv ali rahlo rjavkast, s tankim spodvitim robom. Trosi so v cevkah pod klobukom. Bet ima daljše korenasto dnišče. Mikorizna z listavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024

(58) Majniška lepoglavka

Calocybe gambosa (Fr.) Donk (1962)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

zajčkarke (*Lyophyllaceae*)

Spomladi rastoča goba z belim ali rjavim klobukom in belim betom je zelo podobna kolobarnicam. Saprofit, ki raste na travnikih in pašnikih, prostotrosnica, trosi so na belih gostih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022

(60) Izbrani koprenar


Calonarius elegantior (Fr.) Niskanen & Liimat. (2022)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima zajeten klobuk slamnato do rumeno rjave barve in sluzasto lepljivo površino klobuka. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, raste v mešanih gozdovih, lističi in trosi so rjave barve. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



55



56



57



58



59



60

(61) Zali koprenar

Calonarius elegantissimus (Rob. Henry)
Niskanen & Liimat. (2022)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

obrobje sluzastega klobuka ima eleganten značilno rumenkast pas, ovoj na betu pa ima rjavo barvo. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, raste v listnatih gozdovih, lističi in trosi so rjave barve. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024

(63) Zbledela kandelovka

Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt.
& A. Melzer (2020)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

goba ima polkrožno izbočen do razprostrt klobuk blede kožnate barve, dolg tanek bet je bel, lističi pa sprva beli, nato rožnati in končno črnijo. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v mešanih gozdovih na štorih, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023

(65) Rjaveča lisička

Cantharellus ferruginascens P.D. Orton (1969)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

goba je bolj vitka oblika navadne lisičke, nekoliko bolj bledih barv in na ranjenih mestih oz. mestih dotika prične rjaveti. Mikorizna vrsta, ki raste posamično ali skupinsko predvsem pod hrasti. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024

(62) Rumena skodelnica

Calycina citrina (Hedw.) Gray (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

skodeličarke (*Pezizellaceae*)

majhne rumene gobice imajo klobuček v obliki skodelice in zelo majhen bet, raste pa na lesu listavcev. Saprofit in zaprtotrosnica, trosi se nahajajo na konkavni oz. vbočeni površini trosnjaka. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021

(64) Navadna lisička

Cantharellus cibarius Fr. (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

Ježarke (*Hydnaceae*)

gobe spoznamo po letvičastih lističih (tam so trosi), ki niso lističi, pač pa imajo bolj zaobljeno obliko. Potekajo daleč po betu navzdol, proti robu pa so viličasto razcepljeni. Mikorizna vrsta, ki raste posamično ali skupinsko pod iglavci ali listavci. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022

(66) Žametna lisička

Cantharellus friesii Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

goba ima živo oranžno obarvane, pogosto šopasto zraščene trosnjake, ki nekoliko spominjajo na navadno lisičko, vendar jih od nje loči značilna barva, kakor tudi manjša velikost. Mikorizna vrsta, ki raste posamično ali skupinsko predvsem pod bukvami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2017



61



62



63



64



65



66

(67) Pobeljena lisička*Cantharellus pallens* Pilát (1959)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

gobe so enake kot navadne lisičke, le da imajo bolj blede barve klobukov in rahel vonj po marelicah. Trosi so na letvicah pod klobukom. Spadajo med mikorizne vrste, ki rastejo posamično ali skupinsko pod iglavci ali listavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2017**(69) Škrlatni skladovec***Chondrostereum purpureum* (Pers.) Pouzar (1959)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kajfežuljarke (*Cyphellaceae*)

goba se pojavlja kot nekakšen obliž na vejah drevesa in tudi na ostankih dreves. Spada med parazite in povzroča glivično bolezen drevja. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024**(71) Veliki kijec***Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk (1933)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kijevčarke (*Clavariadelphaceae*)

goba ima kijasto do betičasto obliko, proti vrhu je širši in zaobljen, rumenkaste do sivo okraسته barve. Trosi so na zunanji površini trosnjaka. Spadajo med mikorizne vrste, ki rastejo v sožitju z listavci in iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(68) Rdeččča zelenolistka***Chlorophyllum rhacodes* (Vittad.) Vellinga (2002)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba je podobna dežnikom, le da pri njih meso na ranjenih mestih pordeči. Sprva je dokaj svetlo rjavo obarvana, z belim betom, kasneje pa površina klobuka razpoka v velike luske, ki jih dež lahko izpere in je vse bolj temna. Saprofit. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(70) Švicarski polžar***Chroogomphus helveticus* (Singer) M.M. Moser (1967)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

slinarke (*Gomphidiaceae*)

goba je v celoti lepo enakomerno oranžno oz. bakreno oranžno obarvana, ima suho površino klobuka, v starosti postane zaradi sluzi lepljiva. Trosi so na lisitcih pod klobukom. Parazitirajo lupljivke in koreninke. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(72) Odsekani kijec***Clavariadelphus truncatus* Donk (1933)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kijevčarke (*Clavariadelphaceae*)

goba je precej manjša od velikega kijca, od njega pa se razlikuje po ravno odsekanem temenu, ki sčasoma postane nekoliko udrt. Spadajo med mikorizne vrste, ki rastejo v sožitju z listavci in iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



67



68



69



70



71



72

(73) Siva grivača*Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt. (1888)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

goba je sivkaste barve, grmičasto zraščena, vejice pa rastejo iz skupnega beta in se na vrhu sploščijo ali pa nazobčajo. Saprofit in prostotrošnica raste v iglastih in listnatih gozdovih na tleh, trosi nastajajo na vrhu vejic. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(75) Brazdasta grivača***Clavulina rugosa* (Bull.) J. Schröt. (1888)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

goba ima visok in skoraj pokončen sorazmerno debel trosnjak, ki je naguban in nabrazdan po vsej dolžini, včasih na vrhu le malo razvejan, s širokimi brazdastimi vejami bele ali blede rumenkaste barve. Saprofit. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(77) Poprhnjena livka***Clitocybe nebularis* (Batsch) Quél. (1857)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarke (*Clitocybaceae*)

goba ima mesnat, sprva polkrožen klobuk, z močno spodvihanim robom, siv z belkastim poprhom, kasneje zravnani in v sredini udrt, površina je žametna, star klobuk je gladek in svetleč. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(74) Koralasta grivača***Clavulina coralloides* (L.) J. Schröt. (1888)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

goba je na vrhu grmičasta, sivkasto bele barve ali s sivkasto vijoličastim nadihom, iz skupnega beta poganjajo vejice, ki se tu in tam razdelijo, na vrhu pa sploščijo in nazobčajo, skoraj je podobna morskim koralam. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(76) Pokapani mokovec***Clitocella popinalis* (Fr.) Kluting, T.J. Baroni & Bergemann (2014)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

goba s klobukom in betom ima bel mokasti videz in tudi vonj ter okus po moki. Saprofit, ki raste v listnatih in iglastih gozdovih, najraje na apnenčastih tleh, tudi v parkih, posamično ali skupinsko. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(78) Vodenasta livka***Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper (1981)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarke (*Clitocybaceae*)

sivorjava goba ima lijast klobuk vodenega izgleda in okrastosiv bet, ki je korenasto zaključen. Saprofit in prostotrošnica, trosi so na okrastosivih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



73



74



75



76



77



78

(79) Navadna mokařica*Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

sivkasta goba ima razširjen klobuk z močno spodvitim robom in belkastim betom ter močno diši po moki. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na rdečkastih lističih pod klobukom (sprva so beli). Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(81) Mlečnobela stožka***Conocybe apala* (Fr.) Arnolds (2003)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

smetiščarke (*Bolbitiaceae*)

goba je skoraj povsem bela, ima vpadljivo visok konusno stožčasti klobuk, ki je na robovih nažlebkani in tanek dolg bet. Saprofit in prostotrosnica, lističi pod klobukom so belkasti do svetlo rjavi. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(83) Razsejani tintovec***Coprinellus disseminatus* (Pers.) J.E. Lange (1938)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

gobice imajo belkaste do sivkaste klobučke in bete ter rastejo razsejano v skupinah na štorih. Saprofit in prostotrosnica, trosi se nahajajo na počrnelih lističih pod klobukom in se ne utekočinijo. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(80) Kopusčasti koničar***Connopus acervatus* (Fr.) K.W. Hughes, Mather & R.H. Petersen (2010)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

široki klobučki so v mladosti polkrožni do zvončasti, pozneje skoraj razprostrti, tankomesnati, gladki, blede rjavkasti do rdeče rjavi, v starosti obledeli. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na rdečkastih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(82) Ožlebičena stožka***Conocybe tenera* (Schöff.) Fayod (1889)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

smetiščarke (*Bolbitiaceae*)

klobuk je sprva stožčaste oblike, pozneje zvonast, blede rjaste barve oz. cimetne barve, na sredini ima temno rjavo pego, tanek, gladek. Bet je po celi dolžini nažlebljen. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022**(84) Domači tintovec***Coprinellus domesticus* (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

majhna goba ima oranžen micelij, klobuk je blede cimetaste barve, raste posamično, povsod na trhljem lesu ali na domačih dvoriščih in tudi v starih stavbah ter na drobnih razpadajočih vejicah. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



79



80



81



82



83



84

(85) Veneči tintovec*Coprinellus impatiens* (Fr.) J.E. Lange (1938)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

klobuk ima zvončasto obliko in je mlad oranžno rjave barve, pozneje pa je od središča klobuka navzven temno sivo bež barve, na robu pa rjavo rdeč, hitro ovane. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(87) Štorov tintovec***Coprinellus truncorum* (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

goba raste pomladi na štorih, ponavadi posamično in ima včasih nožničasto dnišče beta ter rjav klobuk. Klobuk je zvončaste oblike, pozneje konično izbočen. Saprofit in prostotrosnica, trosi se nahajajo na počrnelih lističih pod klobukom in se ne utekočinijo. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(89) Plišasta tintovka***Coprinopsis lagopus* (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

goba ima kosmato plišast klobuk, ki je sprva bel in kasneje siv do rjav ter dolg bel bet. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na sprva belih in kasneje črnih lističih pod klobukom, ki se črno utekočinijo. Raste na gozdnem odpadku. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(86) Sljudnati tintovec***Coprinellus micaceus* (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

gobice rastejo šopasto in imajo stožčaste klobuke z barvo sljudnate gline ter bel bet. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na odmrlem lesu, trosi so na sprva belih in kasneje črnih lističih, ki so pod klobukom. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2025**(88) Prava tintovka***Coprinopsis atramentaria* (Bull.) Redhead (2001)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

goba ima siv jajčast klobuk in bel bet, raste pa v velikih šopih na ostankih lesa, vrtovih in parkih. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na sprva belih in kasneje črnih lističih pod klobukom, ki se utekočinijo. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(90) Pisana tintovka***Coprinopsis picacea* (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

goba z belimi zaplatami na rjavem klobuku zvonaste oblike ima pisan videz, bel bet pa ima luskice. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na bogatih tleh vseh gozdov, trosi so na sprva belih in kasneje črnečih lističih pod klobukom, ki se utekočinijo. Goba je najdena na območju 3.



85




86



87



88



89



90

(91) Velika tintnica*Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. (1797)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (Agaricaceae)

goba ima bel jajčasto podolgovat klobuk z luskami in dolg bel bet, raste pa na bogatih organsko polnih tleh, vrtovih in parkih. Saprofit in prostotrosnica, trosi se nahajajo na črnih lističih, ki se utekočinijo. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022**(93) Nepravilna koprenka***Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (Cortinariaceae)

goba ima izbočen klobuk, ki je v vlagi modro siv, v suhem pa rjavo bež barve, bet je pasast, koprena pa bela in hitro minljiva. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, raste v listnatih gozdovih, trosi so na cimetasto-rjavih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(95) Zastrta koprenka***Cortinarius bivelus (Fr.) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (Cortinariaceae)

goba ima značilen bet, ki je deloma zastrt z belo kopreno, ki sega do dnišča beta, pod klobukom pa je rjavkaste barve. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, raste v listnatih gozdovih, lističi in trosi so rjave barve. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(92) Tankorobi nasršenec***Coriopsis gallica (Fr.) Ryvarden (1973)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (Polyporaceae)

goba kot saprofit uspeva na odpadnih delih listnatih dreves, ima trosovnico polno luknjic, tanki rob trosnjaka in površino iz gostih dlak ali laskov oz. iz mehkih iglic, ki na osredju štrlijo nasršene navzven kot pri krtači. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(94) Brezova koprenka***Cortinarius betulinus J. Favre (1948)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (Cortinariaceae)

sprva sluzast izbočen klobuk se kmalu razširi, posušen je bleščeč, v sredini rumen do olivno oker, včasih z oranžnim odtenkom, na robu sivo moder, kmalu zbledi v sivo belo barvo. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, raste v listnatih gozdovih, predvsem pod brezami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(96) Pšenična koprenka***Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (Cortinariaceae)

mesnata okrasto rumena do okrasto rjava ali pšenično obarvana lističarka z značilnim poprhom na površini klobuka, teme je navadno belkasto poprhnjeno, na betu pa ima kožast obroček. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, raste v listnatih gozdovih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



91




92



93



94



95



96

(97) Sinja koprenka*Cortinarius cumatilis* Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

površina klobuka je gladka, svetleča v suhem stanju in sluzasta v vlagi, sinje modre do sivo vijolične barve, s staranjem postaja rjavkasto vijolična. Rob je dolgo časa podvihan in v mladosti pripet k betu z blede vijolično kopreno. Mikorizna z iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(99) Polzastrita koprenka***Cortinarius torvus* (Fr.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima na betu ovojnico, ki je dober razlikovalni znak te vrste. Sprva je dokaj svetlo rjavo obarvana, ima zelo mesnat klobuk in široko razmaknjene lističe. Mikorizna vrsta z listavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(101) Črna trobenta***Craterellus cornucopioides* (L.) Pers. (1825)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

goba ima značilno trobljasto obliko, tako da klobuček postopoma prehaja v vse bolj ozek bet, ki se tanjša proti dnišču, v dežju je vsa črna, suha pa je sivo rjavkastih odtenkov. Mikorizna z listavci. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(98) Sluzava koprenka***Cortinarius mucosus* (Bull.) J. Kickx f. (1867)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima sluzav oranžno rjavi klobuk in bel sluzav bet. Na betu je koprena, ki pokriva lističe do zrelosti, nato se pretrga in na njo v zrelosti padajo rjavi trosi, ki tvorijo rjav obroček. Mikorizna z iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(100) Lilasta koprenka***Cortinarius traganus* (Fr.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba ima sprva lilast, pozneje vijoličast in konveksno izbočen klobuk, ki postaja bolj in bolj blede vijoličaste in nato rjavkaste barve, površina je gladka, suha, svilnato vlaknata, svetleča. Mikorizna z iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(102) Žolta trobenta***Craterellus lutescens* (Fr.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

goba je trobentaste oblike, zgornji del ima obliko klobuka, katerega povrhnjica je vlaknasto luskasta, pri starih gobah pa gladka, je rjave ali sivo rjave barve na oranžni podlagi. Mikorizna je z iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



97



98



99



100



101



102

(103) Lijasta trobenta*Craterellus tubaeformis* (Fr.) Quél. (1888)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

goba ima lijest, rumeno rjav klobuk, sivkasto, letvičasto trosovnico in dolg rumen in votel bet. Raste posamično ali v skupinah pod iglavci, do pozne jeseni. Mikorizna je z mešanim drevjem. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(105) Sploščena postrančica***Crepidotus applanatus* (Pers.) P. Kum. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

postrančarke (*Crepidotaceae*)

Goba je okrasto rjavih barv, na površju nima odstranljive želatinaste prevleke, raste posamično ali skupinsko na iglavcih; navadno rastejo gobe druga nad drugo kot strešniki. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(107) Zdrizasta postrančica***Crepidotus mollis* (Schäff.) Staude (1857)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

postrančarke (*Crepidotaceae*)

goba ima školjkast klobuček bele ali okraسته barve, ki je prevlečen s tanko kožico, pod njo pa leži želatinasta plast, ki je raztegljiva in zdrizasta, lističi pa so enake barve kot klobuk in precej tanki ter gosti. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(104) Nagubana trobenta***Craterellus undulatus* (Pers.) E. Campo & Papetti, Boll. (2021)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

goba je podobna lisičkam, ima klobuk v obliki trobente, površina je nagubana, rob pa se pri starejših gobah vijugasto scefra. Mikorizna je z listnatim drevjem. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(106) Žafranastolistna postrančica***Crepidotus crocophyllus* Berk., (Berk.) Sacc.(1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

postrančarke (*Crepidotaceae*)

goba raste predvsem na listnatih drevesih v manjših skupinah in ima v zrelem stanju površino klobuka rjavkasto ter polno lusk. Saprofit na listnatih drevesih in redkeje na iglastih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(108) Raznolična postrančica***Crepidotus variabilis* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

postrančarke (*Crepidotaceae*)

klobuk je raznolik in sprva zvonast, nato školjkast oz. ostrigaste oblike in pripet stransko na substrat prek kratkega beta, ki kasneje izgine, nekatere gobice pa s površino klobuka dobesedno ležijo na veji in so v celoti vidni lističi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021



103



104



105



106



107



108

(109) Navadni lonček*Crucibulum laeve (Huds.) Kambly (1936)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

gnezdarke (Nidulariaceae)

drobna gobica je podobna lončku ali gnezdju in je na zunanji strani rjavkasta, na notranji pa okrašta, v njej pa so bele kroglice s trosi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na dračju ali odpadnih vejah, trosi so znotraj kroglic. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(111) Nažlebkana topolovka***Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini (2014)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

trobljičarke (Tubariaceae)

srednje velika goba z zelo odprtim in izbočenim klobukom, zelo mladi primerki so rdečkasto rjave barve, kasneje je svetlo rjave barve, okrašta proti središču klobuka. Raste pod topoli. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(113) Kapljasta solzovka***Dacrymyces stillatus Nees (1817)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

solzarke (Dacrymycetaceae)

goba je živo rumeno-oranžna in ima obliko kapljice, začne pa rasti kot majhna solzica in nima beta. Saprofit in prostotrosnica, ki je želatinasta, raste na iglavcih, trosi pa se nahajajo na zgubani površini. Saprofit. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(110) Črtkani košek***Cyathus striatus Willd. (1787)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

gnezdarke (Nidulariaceae)

goba je podobna ptičjemu gnezdecu z jajčeci, na notranji steni koška pa so jasno vidne vzdolžne črte. raste na strohnelem listju ali lesu, tudi na tleh, posamič ali skupinsko. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(112) Pahljačasta solzovka***Dacrymyces chrysospermus Berk. & M.A. Curtis (1873)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

solzarke (Dacrymycetaceae)

goba ima pahljačasto obliko, je vsa rumene barve, ima kratek bet in različno oblikovane klobučke, solzovka pa se imenuje zato, ker začne rasti na razpokah lesa kot drobna rumena solzica. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(114) Hrastova labirintnica***Daedalea quercina (L.) Pers. (1801)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

kresilače (Fomitopsidaceae)

raste konzolno ali kot polička nameščena na štoru (praviloma hrasta) in ima na spodnji strani labirintu podobno trosovnico. Raste vse leto kot vsaka trajnica na živih in odmrlih vejah ali deblih in panjih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



109



110



111



112



113



114

(115) Rdečecha zvitocevka

Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. (1888)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba ima mlada sivo do rumeno površino, pozneje pa vse bolj rdeči in raste kot polica na odmrlem drevesu listavcev. Saprofit in prostotrošnica, troši so v luknjicah oz. v zvitih cevkah pod površino. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021

(117) Hruškasta óglarka

Daldinia childiae J.D. Rog. & Y.M. Ju (1999)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

skorjederke (*Hypoxylaceae*)

skoraj kroglasta goba, katere notranjost ima koncentrične cone črnkastega in belkastega ali sivega mesa. Raste čez vse leto na listnatih drevesih, redkeje na iglavcih. Saprofit in zaprtotrošnica. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022

(119) Navadna belka

Delicatula integrella (Pers.) Fayod (1889)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

majhne snežnobeke gobice rastejo skupinsko na trohnečih štorih in humusu, bet je visok in tanek. Saprofit in prostotrošnica, troši so na belih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024

(116) Tribarvna zvitocevka

Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer (1941)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

na listavcih poličasto rastoča goba ima površino kolobarjasto in iz treh glavnih barv - cimetaste, rdečkaste in rdeče-rjave barve. Saprofit in prostotrošnica, troši nastajajo v luknjicah oz. cevkah pod površino. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023

(118) Slojevita óglarka

Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. (1863)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

skorjederke (*Hypoxylaceae*)

goba je nepravilno kroglaste oblike, na prerezu so lepo vidni številni tanki sloji, eden nad drugim od sredine navzven, ki so proti robu belkasti, nato srebrno sivi, sivi in na osredju črni, podobni barvi oglja. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(120) Javorjeva lišajevka

Dendrothele acerina (Pers.) P.A. Lemke (1965)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

skorjarke (*Corticaceae*)

trošnjaki so tanki, sprva kot otočki, kasneje se pogosto združijo v večje nepravilne dele, po površini so mokasti ali gladki, z ostrim robom, ki ne štrli iz podlage, kredasto beli, kasneje umazano beli. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



115



116



117



118



119



120

(121) Obližasti predirnik*Diatrype decorticata* (Pers.) Rappaz (1987)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

predirničarke (*Diatrypaceae*)

trošnjak je črna skorja brez dvignjenega roba. Površina ima globoke brazde. Večinoma uspevajo na bukvah, lahko pa tudi na drugih listavcih, vendar ne na hrastih ali brezah. Saprofit in zaprtotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(123) Nizka rdečelistka***Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

rdečelistarke (*Entolomataceae*)

goba nižje rasti od večine rdečelistk ima sivo rjav razprt klobuk z vdrtino na osredju, bel bet in rdečkaste lističe, raste pa na substratu v listnatem gozdu. Saprofit in prostotrošnica, troši so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(125) Smrekova zamazanka***Exidia nigricans* (With.) P. Roberts (2009)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

uhljjarke (*Auriculariaceae*)

skoraj črna goba ima neravno površino, je umazano želatinasta, uspeva večinoma na vejah smrek. Trosovnica je na gornji površini trošnjaka. Raste čez vse leto, je saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(122) Bodičasta trnovka***Echinoderma echinaceum* (J.E. Lange) Bon (1991)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima na klobuku smetanaste barve ostre koncentrično razporejene rjave trne, bet pa je gosto vlaknast. Saprofit in prostotrošnica, ki raste v mešanem gozdu, troši so na sprva smetanastih in kasneje rjavkastih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(124) Žlezasta zamazanka***Exidia glandulosa* (Bull.) Fr. (1822)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

uhljjarke (*Auriculariaceae*)

goba je umazano črna kot katran in povsem nagubana kot možgani in mehko želatinasta. Saprofit in prostotrošnica, ki raste na golem odpadnem lesu listavcev, troši so na površini gobe. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(126) Jetrasta cevača***Fistulina hepatica* (Schöff.) With. (1801)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima tudi obliko školjke ali govejega jezika, bet je zelo kratek ali pa ga ni, je rdečkasto rjavih barv, na prerezu številne cevke izločajo rdeč sok, raste pa na pravih kostanjih in hrastih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021



121



122



123



124



125



126

(127) Zimska panjevka*Flammulina velutipes (Curtis) Singer (1951)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

širokolistarke (*Physalacriaceae*)

goba uspeva v zimskem času, ima klobuk od rumene do rjave barve in kosmat bet, ki je sprva oranžno-okrast in kasneje črn. Saprofit in parazit, prostotrosnica, ki raste na panjih, štorih in deblih listavcev, trosi so na lističih rumene barve pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(129) Hrastov glivopor***Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä (1984)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

goba je večinoma pri strani prirasla na drevo, trda, polkrožna, starejša je na robovih polprosta, najstarejši deli so sivo črni in razpokani, drugod je rumeno okraستا do rjasto rjava, v notranjosti ima slojevito žafranasto rjasto rjavo meso. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(131) Čreslov cvet***Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. (1780)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mešičevkarke (*Physaraceae*)

trošnjaki so blazinasti, lupinasti, na površini žvepleno rumeni, včasih tudi okraستی, znotraj so vijoličasti in z apnenčasto skorjo, ki kmalu razpade v prah. Telo sluzavke je sestavljeno iz brezoblične protoplazemske gmote, ki se lahko prosto premika po tleh. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(128) Bukova kresilka***Fomes fomentarius (L.) Fr. (1849)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba poličaste in kopitaste oblike raste na bukvah in ima na trdi sivo-rjavi površini polkrožne koncentrične pasove. Agresivni parazit in prostotrosnica, trosi se nahajajo v luknjicah svetlo lešnikove barve. Saprofit in parazit, prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2025**(130) Smrekova kresilača***Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (1881)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ploskocevarke (*Coriolaceae*)

trda lesna goba je pisano obarvana in raste poličasto na smrekah, trosovnica pa je iz majhnih por rumeno-okraسته barve. Saprofit in parazit, prostotrosnica, trosi so v luknjicah v spodnjem delu. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(132) Šotna kučmica***Galerina sphagnorum (Pers.) Kühner (1935)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koreninarke (*Hymenogastraceae*)

sprva stožčast klobuk dobi osrednjo izboklino; je suh, blede rumen do rjavkast, opazno zbledi, ko se posuši, kar ustvari dvobarvni videz; rob obrobljen, okrašten z belkastimi tančicami, ko je goba mlada, vendar kmalu postane gol. Saprofit. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



127



128



129



130



131



132

(133) Debela pološčenska*Ganoderma adspersum (Schul.) Donk (1969)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (Polyporaceae)

debel trosnjak je konzolne oblike, se bočno zaraste na drevesih, ima trdo skorjo in je grčava, zgornja rjava površina je videti kot položčena. Saprofit in parazit, troši so v luknjicah, v spodnjem belem delu. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(135) Svetlikava položčenka***Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (1881)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (Polyporaceae) Z RS

goba ima kostanjevo rjavi oleseneli klobuki, ki se sveti kot polakiran, na spodnji strani pa ima belkasto trosovnico z luknjicami. Je lignikolna goba, saprofit in parazit, ki raste predvsem v listnatem gozdu. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(137) Smolena položčenka***Ganoderma resinaceum Boud. (1890)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (Polyporaceae)

goba ima trosnjak položčenega izgleda in različnih koncentrično razvrščenih odtenkov rjave barve, na robu pa ima tipični široki pas kremaste barve. Značilno je, da je notranjost gobe mehka, le smolnata skorja nekoliko otrdi. Saprofit in parazit. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(134) Sploščena položčenka***Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (1887)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (Polyporaceae)

goba je podobna sploščeni konzoli, ki raste na lesu listavcev in ima položčeno zgornjo površino rjave barve. Saprofit in parazit, prostotrošnica, troši so v luknjicah oz. belih porah v spodnjem delu gobe. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(136) Bakrenasta položčenka***Ganoderma pfeifferi Bres. (1889)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (Polyporaceae)

gobo spoznamo po velikem, značilno položčenem klobuku bakrene oz. rdeče rjave barve in po himeniju, ki v mladosti skriva z rumeno smolo prekrite luknjice. Raste na listavcih, v gozdovih in parkih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(138) Resičasta zvezdica***Geastrum fimbriatum Fr. (1829)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

zvezdarke (Geastraceae)

goba je sprva kroglasta in zraste pod zemljo, nato se zunanja ovojnica nad zemljo razpre v 5 do 9 (ali do 15) trikotnih krp, ki imajo značilno zvezdasto obliko, krpe oz. kraki pa so rumeno rjavi ali svetlo rjavi. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023



133



134



135



136



137



138

(139) Drobčna zvezdica*Geastrum minimum* Schwein. (1822)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

zvezdarke (*Geastraceae*)

goba je sprva kroglasta in raste pod zemljo, nato pa se zunanja ovojnica nad zemljo razpre oz. se od roba proti sredini raztrga v več trikotnih krakov s 6 do 11 kraki, ki imajo značilno zvezdasto obliko, in so svetlo rjavi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(141) Orošena vlažničarka***Gliophorus irrigatus* (Pers.) A.M. Ainsw. & P.M. Kirk (2013)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

polžarke (*Hygrophoraceae*)

goba ima sprva poloblast klobuk, ki se pozneje izboči in dobi izboklino na osredju. Je sajasto siv ali okraško siv do sivo rjav, sluzasto lepljiv, prosojno progast, na osredju temnejši, rob je svetlejši. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(143) Sivorjava tramovka***Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen) P. Karst. (1882)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

tramovkarke (*Gloeophyllaceae*)

goba ima trd rjavkast klobuk polkrožne do pahljačaste oblike, beta pa nima. Saprofit in prostotrošnica, ki raste na odmrlih iglavcih in tramovih, trosi se nahajajo na žarkasto rastoči tvorbi debelih lističev na spodnji strani. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(140) Brazdasta zvezdica***Geastrum striatum* DC. (1805)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

zvezdarke (*Geastraceae*)

goba sprva raste pod zemljo in je čebulaste oblike, kmalu se razpoči v do 15 koničastih in smetanasto obarvanih krakov in ob tem pokuka kot zvezdica s kraki nad zemljo. Izrazit vrat nosi črnkasto in belo poprašeno notranjo ovojnico. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(142) Dišeča tramovka***Gloeophyllum odoratum* (Wulfen) Imazeki (1943)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

tramovkarke (*Gloeophyllaceae*)

goba je poličasta, rumeno ali rdeče rjava, na starejših delih trosnjaka skoraj črna, pogosto zelo nepravilna in z močnimi gomoljastimi ali vozlastimi izrastki, koncentrične brazde ga delijo v široke pasove. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2014**(144) Labirintasta tramovka***Gloeophyllum trabeum* (Pers.) Murrill (1908)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------


tramovkarke (*Gloeophyllaceae*)

goba ima pahljačasto obliko, najpogostejše raste na tramovih ali štorih, trosnjak je pahljačaste oblike in ima labirintasto strukturo trosovnice. Raste čez vse leto na odmrlem lesu oz. tramovih ali štorih iglavcev in listavcev. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025



139



140



141



142



143



144

(145) Rožnati slinar*Gomphidius roseus* (Fr.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

slinarke (*Gomphidiaceae*)

goba je sprva polkrožna kot rožnat gumb, nato se zravnja in stara postane lijasta, površina je sprva lepljiva, kasneje pa gladka, bolj ali manj rdeča, s starostjo obledi in dobi na osredju sivo rumeno barvo ter črne lise. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(147) Nitasti korenovec***Gymnopus androsaceus* (L.) Della Magg. & Tras (2014)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

goba ima sprva izbočeno zvonast klobuk, pozneje izbočen in končno skoraj sploščen, na osredju ima sprva včasih komaj opazno grbico, star pa lahko ima vdolbinico, mesno rjavkaste barve in na osredju temno rjav do črnorjav. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022**(149) Zeljarski korenovec***Gymnopus brassicolens* (Romagn.) Antonín & Noordel. (1997)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

goba ima izrazito rjavo-rdečkasto osredje na klobuku, neprijetno smrdi po gnilem zelju in raste v večjih skupinah kot saprofit. Raste na listih ali na odpadlih vejicah, pod iglavci in listavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(146) Predirna plamenka***Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill (1912)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koreninarke (*Hymenogastraceae*)

goba ima gladek klobuk v suhem vremenu, v vlažnem pa nekoliko masten, rumeno do oranžno rjav, na osredju temneje rjav. Najraje raste na dobro preperelem lesu iglavcev ali listavcev. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(148) Žleborobi korenovec***Gymnopus aquosus* (Bull.) Antonín & Noordel. (1997)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

goba ima vodenast klobuk, ki je na robu prosojno nažlebkán, pri starejših gobah je obarvan s tremi kolobarji in sicer v sredini temnejše rjave barve do rjasto rjave, nato svetlejše rjave barve. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(150) Vitki korenovec***Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill (1916)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

gobo največkrat najdemo na listju, cele vrste šopasto rastočih gobic, ki imajo visok, rjavkast bet, zelo goste belkaste lističe in okrašto rjavkast klobuček. Saprofit in prostotrošnica. Obstaja več različkov. Goba je najdena na območju 2.


Popis: 2023



145



146



147



148



149



150

(151) Sehlični korenovec

Gymnopus erythropus (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

goba uspeva na lesu, na štorih ali na vkopanih lesnih ostankih v velikih šopih, v sredini ima rdečerjavi bet in rjave klobučke, ki so suhi svetli. Raste v mešanih gozdovih, spada med saprofite in prostotrošnice. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022

(153) Hrastov korenovec

Gymnopus fusipes (Bull.) Grey (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

goba ima sprva vzbočen, nato zravn klobuk, ki ima tanek, valovit rob, elastičen, gladek, rjavo rdeče barve, pogosto s temnimi lisami. Spada med saprofite in prostotrošnice. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(155) Solzeča medlenka

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Qué. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

korenarke (*Hymenogastraceae*)

goba ima mesnat, vzbočen klobuk, s spodvihanim robom, blazinast, belkast ali pa blede okrašt, gladek in moker nekoliko lepljiv. Saprofit, ki raste v gozdovih, parkih, po robovih gozdov v travi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022

(152) Smrdeči korenovec

Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk (2014)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

goba ima zelo neprijetn vonj po plesnobi, površina klobučka je izrazito žarkasto nagubana in rjava, bet je črn, raste pa na vejah listavcev. Spada med saprofite in prostotrošnice. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2024

(154) Cimetasti mehkopor

Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill (1904)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mrenovkarke (*Phanerochaetaceae*)

goba je konzolno priraščena na drevo in ima zgornjo površino cimetaste barve, spodnja površina s porami pa je na dotik mehka. Je nevarna goba - parazit in saprofit, saj povzroča belo trohno. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024

(156) Vrbina medlenka

Hebeloma leucosarx P.D. Orton (1960)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------


korenarke (*Hymenogastraceae*)

goba raste pod vrbami in ima na osredju okrašt rjavkast klobuk ter na obrobju belkast, diši pa po redkvi. Saprofit in prostotrošnica, ki raste na vlažnih območjih pod vrbami, tudi pod brezami. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023



151



152



153



154



155



156

(157) Dvobarvna medlenka*Hebeloma mesophaeum (Pers.) Fr. (1872)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

korenarke (*Hymenogastraceae*)

goba ima ostanke ovojnice na robu klobuka, na površini klobuka pa se pojavljata dve barvni področji: osrednji krog na temenu je temno rjav, široki pas obrobja pa belkasto rjav. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(159) Sladkobna medlenka***Hebeloma sacchariolens Quél. (1880)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

korenarke (*Hymenogastraceae*)

goba je polkrožna in bolj drobna gobica, ki je dokaj lahko določljiva zaradi sladkobnega vonja. Saprofit in prostotrošnica, ki raste na vlažnih tleh pod listavci, najraje v travi. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(161) Pomladanski loputar***Helvella acetabulum (L.) Quél. (1874)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

loputarke (*Helvellaceae*)

goba ima obliko čaše, stara pa postaja skledasta, ima ostri rob, ki je sivo rjav ali dimast, ima tanke stene, je precej krhka, skoraj želatinasta, na zunanji zgornji strani je gladka, nižje pa žilnata in prehaja v kratek bet. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024**(158) Bledikasta medlenka***Hebeloma ochroalbidum Bohus (1972)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

korenarke (*Hymenogastraceae*)

goba ima izbočen do ploščato-polkroglasti klobuk, z ali brez široke in nizke grbice, rahlo spodvit rob, rahlo sluzast, od belkaste do kremasto-okor barve, skoraj enobarven, z rahlim vonjem po hrenu. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(160) Redkvičasta medlenka***Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet (1876)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

korenarke (*Hymenogastraceae*)

goba ima sprva spodvihan rob, ki se kasneje ostro odpre in se obrne navzgor, na prerezu meso klobučka visi v votel bet v obliki kapnika. Močan vonj po redkvicah. Saprofit, ki raste pod različnim drevjem. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(162) Jesenski loputar***Helvella crispa (Scop.) Fr. (1822)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

loputarke (*Helvellaceae*)

goba ima močno zvegan loputast klobuk okrase do sivkaste barve in žilast belkast bet. Saprofit in zaprtotrošnica, ki raste na gozdnih tleh, trosi so na zunanji površini loput, ki jih je od 2 do 4. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



157



158



159



160



161



162

(163) Bela polčeladica*Hemimycena cucullata (Pers.) Singer (1961)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladičevke (*Mycenaceae*)

goba ima sprva stožčast in kasneje na pol kupolast klobuk, star tudi poravnan, s široko grbo na osredju, bel, star blede rumenkast ali blede okrašt, gladek in suh, tanek in skoraj prozoren. Saprofit. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2023**(165) Borov trohnož***Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (1888)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

bondarčevke (*Bondarzewiaceae*)

goba rjasto rjave barve z belim robom ima obliko konzole, brez beta. Saprofit in zelo nevarni parazit ter prostotrosnica, ki raste na iglavcih in povzroča trohno, trosi pa se nahajajo na spodnji strani gobe. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(167) Rumenorjavi vrtnikovec***Hortiboletus bubalinus (Oolbekk. & Duin) L.**Albert & Dima (2015)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima sprva polkroglast in pozneje izbočen do sploščen klobuk, sprva okrašt in kasneje rumeno rjav do rjav. Proti robu klobuka običajno svetlejši, žametast po površini, pozneje gladek ali zelo drobno razpokan. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(164) Smetanasta polčeladica***Hemimycena lactea (Pers.) Singer (1938)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladičevke (*Mycenaceae*)

goba ima širok klobuk, ki je precej manjši od beta, smetanasto barvo, sprva je deloma zvonast in pozneje polkrožen, ima obliko čeladice, vidna je žarkasta črtasta razporeditev lističev. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2024**(166) Modrikasti ostrigovec***Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.) Singer**(1951)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

goba je majhna in velikokrat spregledana, podobna pa je školjki ostrigi in raste šopasto na odpadlem lesu. Saprofit in prostotrosnica, trosnjak je modrikaste barve. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(168) Hrastov vrtnikovec***Hortiboletus engelii (Hlaváček) Biketova &**Wasser (2015)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba najraje raste pod hrasti, ima zelo spremenljivo barvo in se lahko obarva v odtenke rjave, oranžne in rdeče barve, v dnu beta pa izstopajo drobne oranžne kapljice, kar je značilnost te vrste. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



163



164



165



166



167



168

(169) Rdeči vrtnikovec

Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini,
Vizzini & Gelardi (2015)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima sprva polkrožen rdeč do škrlaten klobuk, ki se počasi ravna in je star polsten, bet je rumen in proti dnišču rdeče črtast, luknjice pa so rumene in z olivnimi odtenki. Mikorizna vrsta in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2024

(171) Rumeni ježek

Hydnum repandum L. (1753)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

gobo spoznamo po rumeno rožnatem, nepravilnem klobuku, ki ima na spodnji strani igličasto trosovnico, katera se polagoma spušča nekoliko po betu navzdol. Mikorizna vrsta in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024

(173) Črtasta razcepljenka

Inocybe abjecta P. Karst. (1879)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima rumeno rjav do orehovo rjav, lahko tudi rdečkasto rjav klobuk, na osredju navadno nekoliko temnejši, na robu belkast in sprva gosto vlaknat, tudi od ostankov pajčevinastega zastirala, pozneje pa je skoraj gol. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021

(170) Klena ježevka

Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. (1880)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

bodičarke (*Bankeraceae*)

goba je sprva izbočena in ima belo vlaknasto površino, pozneje je vbočena in umazano okrasto rumena, pogosto z olivnim odtenkom, končno pa temno rjava, pri čemer je osredje temnejše kot rob. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022

(172) Rdečkasti ježek

Hydnum rufescens Pers. (1800)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ježarke (*Hydnaceae*)

goba ima relativno daljše iglice, ki se bolj odsekano končajo pri betu, klobuk pa je rdeče ali mesnato rjav. Raste v vlažnih mešanih gozdovih. Je mikorizna vrsta in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021

(174) Ostrogrba razcepljenka

Inocybe acuta Boud. (1917)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima rjav klobuk, na osredju grbast z izrazito grbo seskaste oblike, na osredju temneje rjav, radialno vlaknat, razpokan na robovih, koprena hitro izgine, je krhek. Raste v mešanih gozdovih, na travi, ob poteh. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021



169



170



171



172



173



174

(175) Beloroba razcepljenka*Inocybe albomarginata* Velen. (1920)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima rdečkasto rjav klobuk zvonaste oblike, rob se s staranjem cepi, bet pa je zgoraj bel in spodaj rožnate barve. Raste v mešanih gozdovih, na travi ob poteh, v parkih. Mikorizna vrsta z listavci in prosto-trosnica. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(177) Zvezdastotrosna razcepljenka***Inocybe asterospora* Quél. (1980)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima sprva stožčast rdeče rjav klobuk, ki se kasneje razpre, enak bet in sivo rjave lističe. Mikorizna vrsta z listavci in prosto-trosnica, trosi značilne zvezdaste oblike pa so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(179) Zoprna razcepljenka***Inocybe corydalina* Quel. (1875)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima izbočeno obliko klobuka z grbo na osredju, ki je nekoliko temnejše sivo-zelena kot klobuk, bet je belkast, lamele pa sprva blede sive in kasneje rjavkaste. Mikorizna vrsta z listavci in iglavci ter prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(176) Šopasta razcepljenka***Inocybe assimilata* Britzelm. (1881)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima kostanjevo rjav, radialno razpokan klobuk z grbo na temenu, ki je nekoliko masten, ko je vlažen. Raste v mešanih gozdovih, pogosto pod smreko ali jelko, mikorizna, prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(178) Naluskana razcepljenka***Inocybe cincinnata* (Fr.) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima površino klobuka mekinasto oz. pokrito z drobnimi štrlečimi koščki lusk, ki so navadno debelejšje na sredini, na osredju je temnejši, rob je zavihan navzdol in nekoliko svetlejši. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(180) Klobučevinasta razcepljenka***Inocybe dulcamara* (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima rjavi klobuk, ki je klobučevinasto vlaknast in skoraj poravnan, bet je rjav in ima komaj vidne sledi obročka, lističi pa so tudi rjavkasti. Mikorizna vrsta z iglavci, ki raste skupinsko, prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



175



176



177



178



179



180

(181) Kosmičasta razcepljenka*Inocybe flocculosa* (Berk.) Sacc. (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima rjavo cimetast klobuk, osredje je temno rjavo, lahko je tudi smetanasto sivkast in s temnejšim osredjem, koprena je belkasta in ni dolgo obstojna; klobuk je kosmičasto vlaknast, na robu se rad cepi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(183) Žarkasta razcepljenka***Inocybe fuscidula* Velen. (1920)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima sivo rjav do rjav klobuk, ki je na osredju temnejši, ostanki goste belkaste koprene so pri mladi gobi vidni na robu in niso trajni; klobuk se na robu na več mestih razcepi. Raste v mešanih gozdovih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(185) Godejeva razcepljenka***Inocybe godeyi* Gillet (1874)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima rožnati koničasti klobuk, bet in lističe, sčasoma pa postaja vse bolj rožnato rdeča. Mikorizna vrsta z listavci, predvsem bukvami, prostotrošnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom, ki se na robu rad razcepi. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022**(182) Dišavna razcepljenka***Inocybe fraudans* (Britzelm.) Sacc. (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima sprva belkast klobuk in topo stožčast do zvonast, z belkasto kopreno, nato se razširi in zravnava, v središču je široko grbast, proti robu polsteno vaknast; oker rjave do rjave, včasih rdečkasto rjave barve. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2024**(184) Prstenolistna razcepljenka***Inocybe geophylla* (Bull.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima ostro grbast klobuk, pozneje izbočen oz. razprt in s poudarjeno grbico na osredju, bel in z rumenkastim odtlenkom, površina je gladka in svilnata, rob se s staranjem na več mestih razcepi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(186) Sivoovojna razcepljenka***Inocybe griseovelata* Kühner (1955)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima blede do sivo bež ali sivo rjav do umazano rjavkast, vlaknast klobuk, na robu so vidni ostanki sivkaste ovojnice, rob se s staranjem razcepi. Raste v mešanih gozdovih, predvsem pod bukvami in smrekami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



181



182



183



184



185



186

(187) Sivozelena razcepljenka

Inocybe haemacta (Berk. & Cooke) Sacc.
(1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima polsten, luskast klobuk, razporeditev vlaken na površini je žarkasta, s cigarasto rjavimi luskami na skoraj belkasti do rumeno belkasti podlagi, star pordi, na osredju temnejši, ostanki belkaste koprene niso trajni. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024

(189) Repasta razcepljenka

Inocybe napipes J.E. Lange (1917)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima stožčast rjavkast klobuk z grbo na osredju, bet je rumeno rjav in ima v dnišču repi podoben gomolj, lističi pa so sprva beli in kasneje okrastrti. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022

(191) Slamnatorumena razcepljenka

Inocybe sindonia (Fr.) P. Karst. (1879)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba imaslamnato rumen klobuk, na osredju rumenkasto okrastr, svilnato vlaknat in na sredini luskast, koprena visi s klobuka in je svilnata ter hitro minljiva, rob je oster in radialno razcepljen. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021

(188) Raztrgana razcepljenka

Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima klobuk rjavo sive barve, polsteno vlaknate ali luskaste površine, na robu ima ostanke ovoja, pri mladih gobah je le ta vidna kot nekakšna pajčevinasta koprena med robom klobuka in beta. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022

(190) Ozkocistidna razcepljenka

Inocybe obscuroradia (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz (1977)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima izbočen rjavkast klobuk z izrazito grbo na osredju, je vlaknast, rob je nekoliko svetlejši, bet je belkast, lističi pa so okrastrti. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(192) Lepa razcepljenka

Inocybe splendens R. Heim (1986)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima sivo rjav do rjav klobuk z luskami na osredju in žarkasto razporejenimi vlakni ter včasih škrlatne odtenke, rob pa se star razcepi. Raste v iglastih in mešanih gozdovih, med mahom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



187



188



189



190



191



192

(193) Nanizani luknjač*Inonotus cuticularis* (Bull.) P. Karst. (1880)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

lesna goba ima široke, pahljačaste ali konzolne oblike, na robu zožene, tanke; rumeno-rjave ali rjasto rjave, v starosti skoraj črno-rjave, rob je svetlejši, površina je hrapava, žametno dlakava in rahlo progasta. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(195) Rdečkasti razcepljenec***Inosperma erubescens* (A. Blytt) Matheny & Esteve-Rav. (2019)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba je zvonasta in krepkejša vrsta z močnim betom. Sprva belkasto gobo spoznamo po tem, da postaja sčasoma rdečkasta, njen rob pa se na več mestih razcepi. Mikorizna in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022**(197) Črneča ožganka***Kretzschmaria deusta* (Hoffm.) P.M.D. Martin (1970)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

lesenjače (*Xylariaceae*)

nenavadna goba po obliki spominja na sivo ali črno skorjo, kot nekakšen ostanek pogorišča. Na lesu ta parazit naredi škodo. raste v mešanih gozdovih, v parkih, na štorih ali živih listavcih. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2025**(194) Grčavi luknjač***Inonotus nodulosus* (Fr.) P. Karst. (1882)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

lesna goba je iz skupaj rastočih trosnjakov, ki imajo grbe oz. grče in so oranžno rjavi do rjavi. Saprofit in parazit ter prostotrosnica, troši so v luknjicah, ki so sprva kremaste in kasneje okrasto rjave barve. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(196) Grozdasti bulovec***Jackrogersella cohaerens* (Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler (2017)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

skorjoderke (*Hypoxylaceae*)

trosnjaki rastejo posamično ali pa je substrat kot vlit, trosnjaki pa so blazinasti do okrogli, rjavi, sčasomi črni, površina je bradavičasta. Raste kot saprofit na večjih lesnih ostankih bukev z lubjem. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(198) Vijoličasta bledivka***Laccaria amethystina* Cooke (1884)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

gomoljkovke (*Hydnangiaceae*)

gobo spoznamo po intenzivno vijoličasti barvi, dokler je še mlada, stare in suhe gobe pa že znatno obledijo in posivijo; imajo zelo redke lističe in žilavo meso. Saprofit, ki raste v mešanih gozdovih. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021



193



194



195



196



197



198

(199) Rdečkasta bledivka*Laccaria laccata* (Scop.) Fr. (1884)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

gomoljkovke (*Hydnangiaceae*)

goba je vsa rožnato rdečkastih ali rjavkastih barv, ki v starosti močno zbledijo; spoznamo jo po razmaknjenih, debelih lističih, kar je značilno za vse vrste v tem rodu. Saprofit, ki raste v mešanih gozdovih. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(201) Kosmati črnivec***Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

goba ima kosmati rjavi klobuk in skoraj črne lističe, bet pa je sprva bel in kmalu rjav. Raste na travi in na tleh v šopih tesno skupaj, trosi so na sprva okrastih in kasneje na črnečih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(203) Oranžna mlečnica***Lactarius aurantiacus* (Pers.) Gray (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima skoraj koničast klobuk, ki se pozneje zravnja in je na osredju udrt, star pa ima včasih grbico na osredju; oranžen, gladek, rahlo svetleč, suh, star na robu žlebast in po površini rahlo grbast. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(200) Sloka bledivka***Laccaria tortilis* (Bolton) Cooke (1884)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

gomoljkovke (*Hydnangiaceae*)

goba je najmanjša med bledivkami in ima največje trose ter dvotrosne bazidije, po obliki je sloka oz. drobna in bolj suha od vrstnic. Raste v vlažnih predelih gozdov, na goli zemlji, na bregovih potokov. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(202) Kratkobetna mlečnica***Lactarius acerrimus* Britzelm. (1893)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima okrasto rumen in na osredju udrt klobuk ter kratek bet, lističi so okrasti, goba izloča bel sok ali mleček. Mikorizna vrsta z listavci in prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(204) Bukova mlečnica***Lactarius blennius* (Fr.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima olivno-siv do sivo-zelen klobuk, s temnejšimi, koncentrično razporejenimi lisami, sprva sploščen, nato v sredini udrt, površina je lepljiva. Mikorizna in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024



199



200



201



202



203



204

(205) Kafrna mlečnica*Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sprva stožčasto zaobljen klobuk, nato se zravna, na osredju ohrani grbico, površina je bolj ali manj rdeče rjave barve in nekoliko svetlejša na obrobju, na lističih se pokaže vodeno belkast mleček. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(207) Varljiva mlečnica***Lactarius decipiens* Quél. (1885)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba se od ostalih mlečnic loči po na zraku rumenečem mlečku in po značilnem vonju po pelargonijah. Mikorizna vrsta, raste v mešanih gozdovih, prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(209) Smrekova sirovka***Lactarius deterrimus* Gröger (1968)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sprva izbočen okrašto oranžen klobuk, ki kmalu postane na osredju udrt in delno pozeleni, bet in lističi ter mleček pa so oranžni. Mikorizna vrsta s smrekami in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(206) Gabrova mlečnica***Lactarius circellatus* Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba je plosko izbočena in z udrtim osredjem, močno spodvihanim robom in temnimi koncentričnimi kolobarji na klobuku. Mikorizna, praviloma z gabri in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(208) Užitna sirovka***Lactarius deliciosus* (L.) Gray (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba je blede oranžno okraštih odtenkov, redko pozeleni in je največja med sirovkami, pri katerih se iz ran izceja oranžno rdeč mleček, ima pa tudi jamičasto lisast bet. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(210) Čadasta mlečnica***Lactarius fuliginosus* (Fr.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima čadasto površino klobuka, torej tanko prosojno megleno plast na njem, sprva beli mleček pa se počasi obarva rožnato oz. pordeči in je pekoč. Raste pod listavci, predvsem pod leskami, v mešanih gozdovih. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023



205



206



207



208



209



210

(211) Medla mlečnica*Lactarius pallidus Pers. (1797)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima mesnat klobuk, ki je sprva izbočen, nato sploščen in udrt, rob ostane dolgo časa spodvit, rožnato rjave barve, moker zelo sluzast, suh svetleč, na poškodovanih mestih nastanejo rjave pege. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(213) Rdečerjava mlečnica***Lactarius rufus (Scop.) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sprva nekoliko stožčast klobuk, ki se nato razpre in je grbast na temenu; je srednje velika in rdeče rjavih barv po klobuku in betu. Mikorizna, praviloma raste pod iglavci. Prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(215) Navadna sirovka***Lactarius semisanguifluus R. Heim & Leclair (1950)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima klobuk, ki ima sprva močno spodvit rob, nato se zravnja in pri stari gobi nekoliko dvigne, površina je gladka, sprva oranžno okraستا, kolobarčasta, nato zeleno in rjavo lisasta, včasih postane cel klobuk zelenkast. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(212) Leskina mlečnica***Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sivkasto rjav klobuk, sprva izbočen, pozneje zravnjan in z udrto sredino, rob je valovit in zavihan navzdol, na površini so komaj vidni in medli kolobarji, na otip je površina nekoliko mastna. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(214) Hrastova mlečnica***Lactarius quietus (Fr.) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima mesnat klobuk, sprva nekoliko izbočen, pozneje v sredini ugreznjen, vedno brez grbice, rob sprva spodvit, pozneje neenakomerno valovit, pri mladi gobi rdeče do cimetno rjav s temnejšimi pegami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(216) Vodenasta mlečnica***Lactarius serifluus (DC.) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima klobuk, ki je nizko izbočen, s spodvihanim robom, kasneje je razprostrt do udrt, brez izbokline, suh, v vlagi kostanjevo rjav, v suši bolj okraسته barve in hrapav. Raste v mešanih gozdovih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



211



212



213



214



215



216

(217) Sladkasta mlečnica*Lactarius subdulcis* (Pers.) Gray (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

ime te gobe je zavajajoče, ker je rahlo grenkega okusa. Zanje so značilni ostra grbica na klobuku kostanjeve barve in beli mleček milega okusa, ki nato greni ter močan vonj po kumarinu. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(219) Poprov mlečnik***Lactifluus piperatus* (L.) Roussel (1806)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima sprva izbočen klobuk s spodvihanim robom, kmalu je na temenu zravnčan, star postane lijaste oblike, z močno udrtim osredjem, gladek, bel, v suši pa rad razpoka. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(221) Zeleneči razpokanec***Laeticutis cristata* (Schöff.) Audet (2010)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima pahljačast, školjkast trosnjak, z bolj ali manj stranskim betom, v začetku rjav, hrapav, kmalu obledi in postane olivno zelenkast, rjavkast, največkrat je zraščan s sosednjimi klobuki. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(218) Sfrknjena mlečnica***Lactarius tabidus* Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima izbočen klobuk, ki je pozneje razprostrt do udrt, naguban, lisičkasto oranžen ali rjasto rjav. Raste na kislih tleh v različnih tipih gozda in na šotiščih, predvsem pod brezami, borovci in smrekami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(220) Polsteni mlečnik***Lactifluus vellereus* (Fr.) Kuntze (1891)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

gobe na prerezu puščajo bel mleček poprovega okusa, v gozdu pa jih že od daleč opazimo in hitro določimo, še posebej stare orjaške primerke z lijasto obliko, ki rastejo v velikih in strnjenih skupinah. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(222) Žvepleni lepoluknjičar***Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill (1920)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

lepoluknjark (*Laetiporaceae*)

gobe imajo debel, mesnat, gladek, rumen trosnjak, oranžen ali z rožnatim nadihom, z zaobljenim robom, ki je včasih zelo valovit ali večkrat zarezan in naguban. Parazit, ki raste na živih drevesih. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021



217



218



219



220



221



222

(223) Gabrov dedek

Leccinellum pseudoscabrum (Kallenb.) Mikšík (2017)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

gobe spoznamo po drobno zgubanem, okrašto rjavem klobuku, po mesu, ki na zraku močno počrni in po tipičnem rastišču pod gabri, najraje pa uspeva na gozdnih obronkih v travi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(225) Pahljačasta žilavka

Lentinellus flabelliformis (Bol.) S. Ito (1959)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

žličarke (*Auriscalpiaceae*)

goba je saprofit in prostotrosnica, ki raste na listavcih, prepoznavna je po skupinski rasti, pahljačasti obliki brez beta ali s kratkim stranskim stebлом in žagasto nazobčanih lističih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(227) Brezova lenzovka

Lenzites betulinus (L.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

rjavo siva goba konzolaste oblike je sploščena in ima na spodnji strani trosovnico iz cevk, ki prehajajo v lističe. Saprofit in prostotrosnica raste na brezah, trosi so v luknjicah na spodnji strani. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022

(224) Trepetlikov turek

Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima sprva polkroglast klobuk, ki postane izbočen in blazinast, oranžen ali opečno rjav, kožica gre prek roba. Vrsta je mikorizna z listavci, praviloma s trepetlikami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022

(226) Rombasta strnjenka

Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr. (2010)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba je sprva fino kosmičasta in pozneje gladka, rumeno rjave, okrašto rjave do svetlo rjave barve, včasih temnejše barve proti sredini, včasih na robu nazobčana, rob je rahlo ukrivljen, oster in obrobljen z dlačicami. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021

(228) Zdrizasta kapičarka

Leotia lubrica (Scop.) Pers. (1797)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba je nepravilne oblike, bolj ali manj loputasta, rumenkaste do oranžne barve, včasih z olivno zelenkastim odtenkom ali sivo zelenkasta, površina je gladka in ob vlažnem vremenu lepljiva. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



223



224



225



226



227



228

(229) Kostanjasti dežniček*Lepiota castanea* Quél. (1881)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

majhna gobica ima kostanjevo rjav dežnikasti klobuk s temnejšimi luskami, ki so tudi na betu, oddaja pa močan neprijetni vonj. Saprofit in prostotrosnica raste na bogatih humusnih tleh. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(231) Smrdljivi dežniček***Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

gobica ima na svetlem izbočenem klobučku rjave luske in grbo, tanek bet z minljivim obročkom in bele lističe. Saprofit, ki raste v gozdovih, parkih, prostotrosnica, trosi so na lističih pod klobukom. Goba ima neprijetni vonj. Najdena je na območju 1.

Popis: 2021**(233) Olivnorjavi dežniček***Lepiota forquignonii* Quél. (1885)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

klobuk je sprva polkroglast, nato izbočen, na koncu sploščen in na sredini topa izboklina, olivno rjave do olivno sive barve, na sredini temnejša, z majhnimi, tesno prilegajočimi se luskami na beli podlagi, rob je svetlejši. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(230) Obuti dežniček***Lepiota clypeolaria* (Bull.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

klobuk je pri mladi gobi zvonast, pozneje razprt s topo osrednjo grbico, bel in z okrasto rjavimi drobnimi luskami. Spodnji del beta pod ostankom zastirala je belo nakosmičen. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(232) Zoprni dežniček***Lepiota cristatoides* Einhell. (1973)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

klobuček kremaste do okraسته barve z oranžno rjavimi krpicami na površini, bet je mlad bel in kmalu rjavkast, lističi so kremaste barve; saprofit in prostotrosnica, značilen je neprijeten vonj. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024**(234) Pogubni dežniček***Lepiota helveola* Bres. (1882)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima velike okrasto oranžne do rjavkaste luske, ki so izolirano koncentrično razporejene na klobučku, luske so tudi pod obročkom na betu. Če klobuk odtrgamo, pordeči, pozneje je rožnato okraسته barve. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



229



230



231



232



233



234

(235) Rdečedniščni dežniček

Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss.
(1990)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

poloblast klobuk sčasoma postane izbočen do raven s topo grbo, površina v centru je gladka, oker do rdečkasto rjavih tonov, proti robu klobuka je koncentrično luskasta na belkasti podlagi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024

(237) Hostna kolesnica

Lepista densifolia (J. Favre) Singer & Cléménçon (1973)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

klobuk sprva izbočen, pozneje razširjen in na osredju rahlo udrto, pogosto z grbo; rob je sprva spodvihan, nato postane valovit, bele do umazano bele barve, pozneje kremasto rjave barve. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022

(239) Vijoličasta kolesnica

Lepista nuda (Bull.) Cooke (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba je značilno vijoličasta in raste pozno jeseni, še po prvih slane, običajno v kolobarjih, v redkem gozdu ali na robu gozda in je vsa bolj ali manj vijoličastih odtenkov. Prostotrošnica in saprofit. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021

(236) Rožnati dežniček

Lepiota subincarnata J.E. Lange (1940)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima poloblast, drobno in koncentrično nakosmičen klobuk, sprva je svetle rožnate, pozneje pa rjavo rdeče do vinsko rjave barve, na osredju je temnejši, na robu pa valovit in suh. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(238) Bledovijoličasta kolesnica

Lepista glaucocana (Bres.) Singer (1951)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima sprva polkrožen in kmalu izbočen bledovijoličasti klobuk, ki ima podvihan rob in tudi bet ter lističi so enakih barv, goba nikoli nima koprene, raste pa v mešanem gozdu. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023

(240) Rožnolistni kukmakovec

Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser (1977)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

klobuk je sprva polkrožno zvonast, kmalu razprt in široko grbast, gladek, vlaknat, v osredju včasih okrašt, od roba pa mu visijo ostanki veluma. Prostotrošnica in saprofit. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022



235



236



237



238



239



240

(241) Mekinasti kukmakovec

Leucoagaricus subcretaceus Bon
(1983)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima bel klobuk, ki postane hitro luskast in rahlo porjavi. Bet je enake barve kot klobuk, prisoten je obroček. Lističi so kremno bele barve. Raste v vrtovih, parkih ali na travnikih. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022

(243) Razbarvana grahovka

Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr.
(1829)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

praživali (*Protozoa*)

kroglasta goba je podobna grahu ter ima sprva rdečkasto barvo, kmalu se razbarva in je sivo-zelena do rjava, beta nima. Saprofit in nižje razvita gliva, ki raste na trohnečih iglavcih, trosi pa se nahajajo v notranjosti gobe. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023

(245) Betičasta prašnica

Lycoperdon perlatum Pers. (1796)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

prašničarke (*Lycoperdaceae*)

bela goba ima betičasto obliko, glavati del je skoraj okrogel in ima igličaste bradavice, bet je širok. Saprofit in prostotrošnica, trosi so v glavi trosnjaka in kot prah uhajajo skozi odprtino, raste na gozdnih tleh. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022

(242) Bela svetloglavka

Leucocybe connata (Schum.) Vizzini, P.
Alvarado, G. Moreno & Consiglio (2015)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba je v celoti bela, klobuk je izbočen in na robu podvihan, bet je čvrst, lističi pa so gosti. Saprofit in prostotrošnica, ki raste v velikih šopih ob gozdnih poteh ali v travi, trosi so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2023

(244) Rjava prašnica

Lycoperdon molle Pers. (1801)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

prašničarke (*Lycoperdaceae*)

goba je hruškaste oblike, mehka, ovojnica je sprva sivo rjava, kasneje dobi barvo mlečne kave, lahko tudi svetlo rjava, prekrita je z drobnimi bodičastimi zrcni, površina z dozorevanjem dobi mrežasti vzorec. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(246) Rjavi zajček

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer (1951)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

zajčkarke (*Lyophyllaceae*)

gobe imajo rjave klobuke in dolge belkaste bete, ki so zraščeni v dnišču, lističi so beli do svetlo rjavi, rastejo pa v gozdovih in parkih. Saprofit in prostotrošnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



241



242



243



244



245



246

(247) Umazani zajček*Lyophyllum immundum* (Berk.) Kühner (1938)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

zajčkarke (*Lyophyllaceae*)

goba ima izbočen klobuk umazano blede do sivo rjave barve, tudi bet ima umazane sive odtenke, lističi pa so sivo rjavkasti. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom, raste v mešanih gozdovih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(249) Poljski dežnik***Macrolepiota excoriata* (Schöff.) M.M. Moser (1978)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

klobuk je pri mladi gobi jajčast, nato stožčast in pozneje dežnikasto razprt, s topo grbico na temenu, bel in z okrasto rjavimi kosmičastimi luskami, predvsem na osredju. Saprofit in prostotrosnica, lističi so pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(251) Sramežljivi dežnik***Macrolepiota permixta* (Barla) Pacioni (1979)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

klobuk je sprva kroglast ali jajčast, pozneje zvončast in sčasoma dežnikast ter z grbo na osredju, v celoti je pokrit s kosmičastimi luskami, rjav do temno rjav, na osredju temnejši, rob je krpast in nekoliko svetlejši. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(248) Trdokožni zajček***Lyophyllum loricatum* (Fr.) Kühner ex Kalamees (1994)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

zajčkarke (*Lyophyllaceae*)

gobe imajo klobuke črno-rjavih barv, ki jih pokriva trda in prožna koža, rjave bete, ki so zraščeni v dnišču in bele lističe, rastejo pa pod listavci. Saprofit in prostotrosnica, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(250) Grbičasti dežnik***Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer (1951)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

klobuk je sprva zvonast, kasneje polkrožen in zravn, vedno z izrazito grbo na temenu, ki je skoraj gladka ter rjave barve, proti obrobju ga pokrivajo vse bolj redke rjave luskice. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(252) Orjaški dežnik***Macrolepiota procera* (Scop.) Singer (1948)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

gobica ima blede svetlo rjav klobuk, ki je sprva stožčast in nato izbočen ter z udrtino na osredju in z želatinasto kožico, bet in lističi so sivo rjavi, raste pa na odpadlih iglicah. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



247



248



249



250



251



252

(253) Agardhova naluskanka

Mallocybe agardhii (N. Lund) Matheny & Esteve-Rav. (2019)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razcepljarke (*Inocybaceae*)

goba ima razvito zastiralno, klobuk in bet sta vlaknasta in nista pokrita z luskami, skoraj v celoti pa je bolj živo rumeno rjava, čeprav je klobuk tudi cimetasto-rjavih barv, pa tudi bet je enake barve. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021

(255) Trdobetna sehlica

Marasmius cohaerens (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél. (1878)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

klobuk je sprva izbočeno zvonast, pozneje izbočen, okrašt, na osredju cimetasto rjav do rdečkasto rjavkast, delno higrofan, v vlagi skoraj sluzast in z bolj izrazitimi barvami, rob nažlebkast, žilav in upogljiv, gladek. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022

(257) Dišeča sehlica

Marasmius oreades (Bolton) Fr. (1836)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

goba ima polkrožen, izbočen, široko grbast klobuk, ki je kmalu zravnast, gladek, okrašt rjav, star v osredju vleknjen, na obrobju pa nekoliko zguban, v suši razpoka in je svetlejši. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021

(254) Bulliardova sehlica

Marasmius bulliardii Quél. (1878)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

klobuk je sprva delno kupolast in pozneje izbočen, umazano bele do blede kremaste barve, z rumenkastimi do okraštimi odtenki, na osredju ima vdolbinico z rjavo do temnorjavo bradavico. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(256) Padalasta sehlica

Marasmius epodius Bres. (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

klobuk je izbočen, z izrazitimi radialno usmerjenimi rebri, starejši je udrt na osredju kremaste barve do cimetasto-rjavkaste barve, lahko tudi oranžen, suh, rob je naguban. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2023

(258) Ovratniška sehlica

Marasmius rotula (Scop.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

klobuk je sprva zvonast, izbočen, žarkasto nabrazdan, ob robu pravilno naguban, v sredini udrt, na spodnji strani je na osredju ovratniček, od katerega lističi potekajo proti robu klobučka. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022



253



254




255



256



257



258

(259) Vijoličasta sehlica*Marasmius wynneae* Berk. & Broome (1859)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

sehličarke (*Marasmiaceae*)

mlad klobuk je izbočen, pozneje razprostrt in nazobčan, na robovih obrnjen navzgor, sprva povsem bel, nato belkast do rahlo lilasto sivkast, krhek. Saprofit in prostotrosnica, likstiči so pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(261) Navadna gostolistka***Melanoleuca melaleuca* (Pers.) Murrill (1911)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

klobuk je sprva izbočen in s široko grbico na osredju ter s spodvihanim robom, pozneje skoraj zravnani ali rahlo lijast, rahlo grbast ter z razpotegnjeno grbo na sredini, sivo rjav, tudi temno rjav, gladek. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(263) Črneča velezraččenka***Meripilus giganteus* (Pers.) P. Karst. (1882)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

velezraččenkark (*Meripilaceae*)

široki pahljačam podobni trosnjaki so debeli, zoženi proti betu, zraččenim z drugimi beti, površina je gladka, drobno luskasta, okrašto rjava, s temnejšimi koncentričnimi progami, na poškodovanih mestih pa močno potemni. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(260) Širokolistna velekoronovka***Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. & Pouzar (1972)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba je najlažje prepoznati po širokih lističih, po katerih je poimenovana in po debelih, belih rizomorfah v dnišču beta. Saprofit, ki raste na preperelih drevesnih panjih, na bogatih humoznih tleh. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(262) Bukova trgača***Melogramma spiniferum* (Wallr.) De Not. (1863)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

trgačarke (*Melogrammataceae*)

zelo majhni in črnimi jagodam podobni skoraj kroglasti trosnjaki z razpokano oz. bradavičasto površino rastejo strnjeno in tesno skupaj predvsem na lubju bukovih dreves in so nevarni saprofiti. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(264) Sluzasta porcelanka***Mucidula mucida* (Schrad.) Pat. (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

širokolistarke (*Physalacriaceae*)

klobuk je sprva izbočen, nato zravnani, bel, gladek, močno sluzav, tanko mesnat, prosojen, včasih siv ali rjavkast, obrobje je redko zgubano ali nažlebljeno. Parazit in prostotrosnica. Lističi so pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



259



260



261



262



263



264

(265) Mahov pahljačnik

Muscinupta laevis (Fr.) Redhead, Lücking & Lawrey (2009)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

goba je bele do rumene barve, fino vlaknaste strukture, fino dlakava, rob je spodvit, mlada školjkasta, skledasta, skodeličasta, kasneje sploščena v ploščato obliko. Spada med parazite na mahu ali na delih rastlin. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023

(267) Sivorjava čeladica

Mycena aetites (Fr.) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

goba ima sivorjavi klobuk koničaste oz. stožčaste oblike, ki star postane razširjen, tanek bet je visok in vodenega videza, lističi so sivi. Saprofit in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom, raste pa na travnatih površinah. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2024

(269) Pepelasta čeladica

Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst. (1879)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

sprva koničast, nato izbočen klobuk in z grbo, tudi s sploščeno grbo, star ima včasih vdolbinico na osredju, skoraj prosojen in z vidnimi žarkasto razporejenimi lističi pod površino, siv, na osredju temnejši. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022

(266) Pasji klinček

Mutinus caninus (Huds.) Fr. (1849)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mavrahovčarke (*Phallaceae*)

iz podgobja najprej zraste bela in jajcu podobna krogla z zametkom gobe v notranjosti, nato med rastjo trošnjak predre belo ovojnico in se dvigne v višino. Spada med sparofite in prostotrosnice. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022

(268) Lasastobetna čeladica

Mycena capillaripes Peck (1888)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

goba ima zvonast klobuček sive do sivo rjave barve, ki se star razširi, sivi bet je kot las tanek in dolg, tudi lističi so sivi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste pod iglavci, troši so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023

(270) Rumenoroba čeladica

Mycena citrinomarginata Gillet (1876)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

majhna blede rumenkasta goba ima značilni limonasto rumen rob čeladastega klobučka in bet, ki je znotraj prekrit z volnatimi vlakenci. Saprofit in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021



265



266



267



268



269



270

(271) Žoltosočna čeladica*Mycena croceta* (Schrad.) Fr. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

goba ima klobuček rumeno do olivno rjave barve, ki je zvončaste oblike, v betu pa je oranžno rdeč sok, ki na klobučku pušča rdeče črte, lističi so beli in z rdečkastimi odtenki. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(273) Bukovinska čeladica***Mycena fagatorum* (Fr.) Gillet (1876)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

klobuk je zvončaste oblike in bolj ali manj izbočen, ima nizko grbo, star lahko rahlo sploščen in na osredju udrt ali z navzgor zavihanim robom, prosojen, gladek, v vlagi spolzek, siv do sivkasto rjav. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(275) Nagubana čeladica***Mycena galericulata* (Scop.) Gray (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

goba ima gubasto nazobčan sivo rjavkast klobuk, bel do rjav tanek bet in bele lističe. Saprofit in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom, raste pa na ostankih lesa in na štorih v mešanih gozdovih. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(272) Prevlečena čeladica***Mycena epipterygia* (Scop.) Gray (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

mlad klobuk je polkrožno izbočen do parabolast, pozneje nizko zgrbljen, na robu nazobčan, lepljiv, sprva belkasto rumen, pozneje sivkast do sivo rjav, krhek. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024**(274) Jodoformova čeladica***Mycena filopes* (Bull.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

značilno za to gobo je izrazito dišeč vonj po jodoformu, ko je v suhem stanju; klobuk je po obliki podoben čeladici. Saprofit v mešanih gozdovih in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(276) Mlečna čeladica***Mycena galopus* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

goba ima sprva stožčast in nato zvonast klobuk sive barve, v tankem sivem do črnem betu pa ima obilico belega mlečka. Saprofit in prostotrosnica, troši so na lističih pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



271



272




273



274



275



276

(277) Pripognjena čeladica*Mycena inclinata* (Fr.) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

sprva koničast klobuk se pozneje izboči, na osredju je široko, včasih topo grbast, belkasto siv do svinčeno siv, na površini se pojavljajo rdečkaste lise, rob je zelo opazno nazobčan, ima žarkasto razvrščene proge. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(279) Lubjeva čeladica***Mycena meliigena* (Berk. & Cooke) Sacc. (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

klobuk je na osredju nekoliko udrt in narebren, skoraj prosojen, rožnato rjavkast do temno vijoličast, s staranjem postaja rjavkast, na osredju temnejši in na robu svetlejši, rob včasih razpoka. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(281) Nažlebičena čeladica***Mycena polygramma* (Bull.) Gray (1821)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

klobuk je sprva stožčast in pozneje nekoliko razširjen ter grbast na osredju, blede siv do sivo rjav, na osredju temnejši, na suhi površini ima žarkasto in vidno črtasto razporejene gube. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(278) Klorova čeladica***Mycena leptcephala* (Pers.) Gillet (1876)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

sprva koničast klobuk je pozneje stožčast ali zvonast, blede siv do svinčeno siv, je masten, v vlagi je na površini zelo opazno progast in na osredju temnejši, star se na robu pogosto cepi. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(280) Pašniška čeladica***Mycena olivaceomarginata* (Masse) Massee (1893)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

klobuk ima stožčasto obliko s široko grbo na rjavem osredju. Je zelo spremenljiva vrsta, ki se lahko pojavi v številnih barvnih oblikah.

Saprofit in prostotrosnica, ki raste na travnatih površinah. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(282) Modra čeladica***Mycena pseudocorticola* Kühner (1938)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

sprva poloblast klobuk je pozneje široko stožčast, izbočen in včasih z majhno bradavico na osredju, sivo moder do temno sivo moder, s staranjem postaja rjav, žlebast, prosojen, poprhnjen in pozneje tudi gladek. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



277



278



279



280



281



282

(283) Redkvičasta čeladica*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

goba je tankomesnata, skoraj ravno razprta, krhka, vijoličasta ali pa rožnata in ima močan vonj po redkvi. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na travnatih površinah. Lističi so pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(285) Strupena čeladica***Mycena rosea* (Schum.) Gramberg (1912)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

tankomesnat klobuk je gladek, najprej polkrožen, nato se razpre, je rožnate barve, rad se napije z vodo, da je videti prosojno nažlebkano, suh in star klobuk pa zbledi. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(287) Šopasta čeladica***Mycena stipitata* Maas Gees. & Schw. (1987)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

stožčast klobuk postane zvonast ali, lahko izbočen, vrh ima včasih grbico, prosojen, žlebast oz. rebrast, v vlagi masten, higrofan, sprva poprhnjen in pozneje gladek, rjave do temno rjave barve, s svetlejším robom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(284) Renejeva čeladica***Mycena renati* Quél. (1886)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

mlad klobuk je polkrožen, pozneje postane zvončast do nizko koničast, rožnato ali mesnato rjav, na robu svetlejši do belkast. Značilen je bet rumene barve. Saprofit in prostotrosnica, ki raste na travnatih površinah. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024**(286) Alkalna čeladica***Mycena silvae-nigrae* Maas Geest. & Schwöbel (1987)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

klobuk sprva stožčast, pozneje izbočen, na osredju pogosto z grbico, prosojen, žlebast, sprva belo poprhnjen, rjav do črno rjav, star temno sivo rjav in vse bolj bled, na robu svetlejši in na osredju temnejši. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(288) Sivomodra čeladica***Mycena urania* (Fr.) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

Klobuk sprva stožčaste oblike, nato zvonast, žlebast. Sprva je gladek, črnkasto vijoličen ali sivkast, včasih z rahlim vijoličnim odtenkom. Na temenu preide v odtenke sive ali sivo rjave. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



283



284



285



286



287



288

(289) Dolgobetna česnovka

Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin (2005)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

gobica ima sprva stožčast in kmalu zravan klobuk sivorjave barve, dolg tanek bet je proti dnu vse bolj črn, lističi pa so beli. Značilen je vonj po česnu. Saprofit in prostotrošnica, ki raste na listju in vejah. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022

(291) Cinobrasta bradavička

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (1849)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

bradavičarke (*Nectriaceae*)

goba je opečnate barve in podobna bradavičkam. Ustvarja dva tipa plodišč: nespolna in spolna plodišča, trosi nastajajo v slednjih. Saprofit in zaprtotrošnica, ki raste na odmrlih vejah listavcev. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021

(293) Luskata nazobčanka

Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns (1985)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba raste že spomladi na štorih iglavcev ali na lesenih železniških pragih, je vsa luskasta ter diši po janežu, lističi pa imajo močno našagane ostrinke oz. so nazobčani. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023

(290) Začimbna česnovka

Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin (2005)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

goba ima sprva polkrožen klobuk, nato se izbočeno zravnja in končno v sredini malo udre, na osredju je rjav, obrobje je blede rjavkasto, skoraj belo, vegasto in rahlo grebenasto. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(292) Satjasta novostrnjenka

Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome & T. Hatt. (2012)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

goba ima rumeno oranžen klobuk okrogle ali ledvičaste oblike, pod katerim je satjasta oblika belih luknjic, ki sega tudi po celem belkastem betu. Saprofit in prostotrošnica, redkeje parazit, ki raste na listavcih. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025

(294) Oslovsko uho

Otidea onotica (Pers.) Fuckel (1870)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ušesarke (*Otideaceae*)

trošnjak stoji kot pokončen uhelj, proti vrhu in dnu je ožji, gladek, z navznoter zaviranim robom, okraško rumen, znotraj pa rožnato okraško. Kadar raste v šopih, je klobuk precej deformiran. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



289



290



291



292



293



294

(295) Trepetlikin gostopor*Oxyporus corticola* (Fr.) Ryvarden (1972)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

gostoporke (*Oxyporaceae*)

goba tvori belkasto do rumenkasto plast por, ki so okrogle in zelo majhne. Raste kot obliž na listavcih in iglavcih. Je enoletnica do trajnica, parazit, ki na odmrlem lesu povzroča belo trohnobo. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(297) Trpki zgručevac***Panellus stipticus* (Bull.) P. Karst. (1879)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

čeladarke (*Mycenaceae*)

trosnjak ima obliko ledvice, ima zgrbljen rob, umazano okrasto rjave barve, sprva gladek in rahlo lepljiv, pozneje prekrit s kosmičastim poprhom, ki se končno razpoči v lepljive luske, je prožen. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(299) Pusti strnjenec***Panus neostrigosus* Drechsler-Santos & Wartchow (2012)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

školjkaste oblike, pozneje nekoliko udrt, nepravilno loputast in s stransko priraščenim betom, lahko tudi bolj ledvičaste oblike, rob je spodvihan, rdečkasto rjav, okrašt ali mesnate barve, mlad z vijoličnimi odtenki. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(296) Košenična govmarka***Panaeolina foenicisii* (Pers.) Maire (1933)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

klobuk je sprva polkroglast, pozneje izbočen, v vlagi rdeče rjav in blede rjav, z bledim poprhom na površini; kožica klobuka lahko razpoka v prilegle luske, na svetlejšem osredju je vidna široka grba. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2022**(298) Školjkasti strnjenec***Panus conchatus* (Bull.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

pahljačaste oblike, sprva spodvihan in ob robu vijoličast, pozneje od sredine proti robu rumeno okrasto obarvan, sprva gladek z vraščenimi žarkasto razporejenimi vlakni, pri starih gobah drobno luskast. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(300) Ohlapni kolesnik***Paralepista flaccida* (Sowerby) Vizzini (2012)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba ima gladek, oranžno rjavkast klobuček, ki sčasoma dobiva močno lijasto obliko z izrazitim podvitim robom, po katerem je imenovana, lističi pa se spuščajo na kratek in ukrivljen bet ter so zelo gosti. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023



295



296



297



298



299



300

(301) Stožčasta črnilovka

Parasola conopiela (Fr.) Örstadius & E. Larss. (2008)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

goba ima polkrožno izbočen do razprostrt klobuk blede kožnate barve, dolg tanek bet je bel, lističi pa sprva beli, nato rožnati in končno črnijo. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v mešanih gozdovih. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024

(303) Navadna podvihanka

Paxillus involutus (Batsch) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

podviharke (*Paxillaceae*)

klobuk je sprva grbasto vzbočen, kmalu v osredju vdrt, z izrazito spodvihanim robom, žametast, ob vlažnem vremenu pa rahlo mazav, kasneje svetleč, olivno rjavkastih barv. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022

(305) Žoltorobi rjavopor

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (1900)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

lepoluknjarke (*Laetiporaceae*)

trošnjaki zrastejo vsako leto iz bolj ali manj središčno nameščenega beta, imajo bleščečo žvepleno rumen rob okoli koncentričnih kolobarjev rjasto rjave barv, kasneje v sezoni pa trošnjaki propadejo. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023

(302) Zgubana črnilovka

Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

goba ima polkrožno izbočen do razprostrt klobuk blede kožnate barve, dolg tanek bet je bel, lističi pa sprva beli, nato rožnati in končno črnijo. Saprofit in prostotrosnica, ki raste v mešanih gozdovih na štorih, trosi so na gostih lističih pod klobukom. Najdena na srednjem delu Otoka.

Popis: 2017

(304) Jelševa podvihanka

Paxillus rubicundulus P.D. Orton (1969)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

podviharke (*Paxillaceae*)

klobuk mesnat, bolj ali manj ekscentričen, vdrt ali lijast, rumeno rjav, sprva gladek, pozneje prekrit z neenakomernimi in temnejšimi vraslimi rjavkastimi luskami, rob ni vedno podvihan pri starih gobah. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021

(306) Smrdljivi mavrahovec

Phallus impudicus L. (1753)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mavrahovčarji (*Phallales*)

sprva okroglo jajce z dolgo, belo korenino. Pod belo ovojnico je debela, prosojna in sluzava plast, podobna želeju, iz katere se dvigne bel in spužvast bet, s klobučkom, od katerega se širi hud smrad. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



301



302



303



304



305



306

(307) Vrbov plutač*Phellinus igniarius* (L.) Quél. (1886)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

trošnjak je kopitast in polkrožen ter rjav do sivo črn, na prerezu tobačno rjav, trd kot les in prirasel s strani na živih in odmrlih vrbah. Saprofit in parazit in prostotrosnica, troši so v luknjicah na spodnjem delu gobe. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(309) Zvegana žilnica***Phlebia rufa* (Pers.) M.P. Christ. (1960)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

zgubančarke (*Meruliaceae*)

goba je kot plast tanek trošnjak se skupinsko in žarkasto od sredine navzven razraste na odmrlih drevesih, ima zvegano površino oz. neravno in skoraj nepravilno površino ali obliko, žilasto in želatinasto strukturo mesa. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(311) Okrašena sluzarka***Phlegmacium triumphans* (Fr.) A. Blyt. (1905)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

koprenarke (*Cortinariaceae*)

goba je rumenih do oranžnih barv in krepka, bet je opasan z razločnimi volnatimi ostanki ovojnice rumene barve in prav zaradi teh izrazitih rumenih pasov, ki izgledajo kot okras. Mikorizna vrsta in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(308) Sadnodrevni plutač***Phellinus pomaceus* (Pers.) Maire (1933)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

trošnjak je nepravilne polkrožne oblike ali kopitaste oblike in kot konzola pripet na drevo, trd in debel, sprva okraše in nato cimetno rjave barve, spodnja plast je cevka. Parazit na sadnem drevju. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(310) Drhtava žilnica***Phlebia tremellosa* (Schrad.) Nakasone & Burds. (1984)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

zgubančarke (*Meruliaceae*)

trošnjak je v obliki polkrožnih poličk, ki so nanizane ena nad drugo, površina je puhasta, rumenkasto okraša do blede rožnata, žametasta, celoten trošnjak je mehak in želatinast. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(312) Prožni luskinar***Pholiota gummosa* (Lasch) Singer (1951)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

strniščarke (*Strophariaceae*)

goba ima klobuk je prožne konstitucije in ima na površini trikotne luske, več gob skupaj raste šopasto, v vlagi je sluzast, meso pa je zaradi rahle grenkobe neokusno. Parazit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025



307



308



309



310



311



312

(313) Limonasti luskinar*Pholiota limonella* (Peck) Sacc. (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

strniščarke (*Strophariaceae*)

klobuk ni povsem suh, sprva je polkrožen, včasih na osredju nekoliko dvignjen, nato izbočen, bolj ali manj citronasto rumen, s plavajočimi trikotnimi luskami na lepljivem in mastnem klobuku. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(315) Zleknjena školjkarica***Pleurocybella porrigens* (Pers.) Singer (1947)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

snežno bela goba je s temenom bočno prirasla na podlago, brez beta, školjkasta ali uhljata, proti podlagi zožena, trosnjak tanek, gol, rob sprva spodvihan, kasneje krpasto valovit, nekoliko puhast. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(317) Poletni ostrigar***Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Qué. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

klobuk je sprva polkrožno zgrbljen in pozneje pahljačast, gladek, prožno mesnat, belkast do svetlo rjav, v starosti sivkast, rob je tanek in oster ter včasih rahlo valovit. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(314) Hrapavi luskinar***Pholiota squarrosa* (Weigel) P. Kum. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

strniščarke (*Strophariaceae*)

goba ima hrapave luskaste klobuke rumeno okrase barve, tanke bete, na katerem je zastiralo; vonj je po česnu. Parazit in prostotrosnica, trosi so na površini lističev pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(316) Hrastov ostrigar***Pleurotus dryinus* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ostrigarke (*Pleurotaceae*)

sprva izbočen klobuk postane bolj ali manj školjkaste oblike, belkast, sivkast, na temenu rahlo rjavkast, luskasto razpoka, na podvihanem robu pa so pogosto viseči ostanki zastirala. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(318) Bukova žilika***Plicaturopsis crispa* (Pers.) D.A. Reid (1964)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

škroboskorjarke (*Amylocorticaceae*)

trosnjak je sestavljen iz posameznih klobučkov polkrožne pahljačaste oblike, trosovnica ima žilasti izgled, trosnjaki rastejo zapovrstjo kot strešniki eden nad drugim na odpadlih delih bukev. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



313



314



315



316



317



318

(319) Jelenova ščitovka*Pluteus cervinus* (Schäff.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

sprva izbočen klobuk postane zravnán, včasih široko grbast, jelenove barve, torej rjav in siv, na osredju temnejši, v vlažnem vremenu lepljiv, vtisnjeno vlaknat, suh žarkasto razpoka. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(321) Pritlikava ščitovka***Pluteus nanus* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

sprva zvonast klobuk je kasneje izbočen ter z rahlo in topo grbo na osredju, sivo rjavkast, na osredju nekoliko temneje rjavkast, gladek, fino dlakast, star se rad cepi na robovih. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024**(323) Romellova ščitovka***Pluteus romellii* (Britzelm.) Lapl. (1895)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

saprofitna goba z rumeno-rjavkastim klobukom ima izrazito rumen bet, raste pa na odmrlem lesu listavcev, ki so včasih tudi tik pod zemljo. Trosovnica, ki sčasoma pordeči, je pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(320) Rumena ščitovka***Pluteus leoninus* (Schäff.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

klobuk sprva zvonast, kasneje sploščen, pogosto z majhno grbo, površina je gladka, zlato rumene barve z rjavo rumenim temenom, proti robu je nažlebkán, rob je oster. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(322) Klobukasta ščitovka***Pluteus petasatus* (Fr.) Gillet (1876)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

skoraj v celoti belkasta goba ima na osredju klobuka rjavkaste luske, raste pa na odmrlem lesu listavcev, ki so včasih tudi tik pod zemljo. Saprofit in prostotrosnica. Trosovnica, ki sčasoma pordeči, je pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(324) Rožnobetna ščitovka***Pluteus roseipes* Höhn. (1902)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

klobuk sprva zvonast, pozneje zravnán ter končno skoraj lijast in včasih s široko grbo, temno rjav, na osredju skoraj črnó rjav, radialno naguban, rob je valovit in narebren, žametast, fino luskasto zrnast. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021



319



320



321



322



323



324

(325) Vrbova ščitovka*Pluteus salicinus* (Pers.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

sprva izbočen klobuk postane zravnian, siv do zelenkasto siv ali včasih z modrikastim nadihom, sprva gladek, kasneje svilnat ali fino luskast in z žarkasto razporeditvijo vlaken od središča proti robu. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(327) Pepelnosivi skutovec***Postia tephroleuca* (Fr.) Jülich (1982)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

vulkankarke (*Dacryobolaceae*)

trosnjak ima pahljačasto obliko in je bočno priraščen na osnovo, je bel do pepelno siv in tudi sivo rumen, zraste vsako leto znova, njegovo meso pa je skutasto. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(329) Prosojna črnivka***Psathyrella piluliformis* (Bull.) P.D. Orton (1969)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

goba ima polkrožen klobuk, ki je sprva vzbočen, nato razprt in ima grbico na osredju; klobuk je gladek, različnih rjavih barv, obrobje pa je napito z vodo in je temnejše. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(326) Čebulasta ščitovka***Pluteus semibulbosus* (Lasch) Quél. (1875)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ščitarke (*Pluteaceae*)

klobuk sprva koničast, pozneje obokano izbočen, belkast do smetanasto bel, na temenu tudi rahlo rjavkast, v vlagi blede mesnate barve, radialno naguban proti robu, na površju luskast ali rahlo kosmičast. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(328) Naprašena vgreznjenka***Propolis farinosa* (Pers.) Fr. (1849)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

martovkarke (*Marthamycetaceae*)

goba ima trosovnico blazinaste oblike, široko, jajčasto, sprva zaprto, kasneje razpade na večje ali manjše režnje, podobno pšeničnemu zrnu; površina je bele barve in mokaste strukture. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(330) Sivorjava črnivka***Psathyrella spadiceogrisea* (Schöff.) Maire (1937)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

črnivkarke (*Psathyrellaceae*)

klobuk je sprva poloblast, pozneje zvonast, včasih ima na osredju grbo, sivo rjav ali rumenkasto rjav, včasih lisast, močno higrofan, gladek, mlad ima belkasto kopreno, ki kmalu izgine. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025



325



326



327



328



329



330

(331) Zajedalski pagoban*Pseudoboletus parasiticus* (Bull.) Šut. (1991)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

uspeva kot parazit na navadni trdokožnici in je ves bolj ali manj okrasto rjave, rumene barve, včasih raste v šopih in sicer po trije primerki iz ene trdokožnice. Spada med prostotrošnice. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(333) Roseči luknjevec***Pseudoinonotus dryadeus* (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. (2001)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

goba ima debel enoletni trosnjak, ki je v mladosti oranžno rjav in pokapljan s kapljami rjave tekočine, v starosti pa postane tobačno rjav. Parazit in prostotrošnica. Pri nas je na rdečem seznamu. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(335) Rdeča griva***Ramaria botrytis* (Pers.) Ricken (1918)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

žilolistarke (*Gomphaceae*)

trosnjak je grmičast in mesnat bet ter številne vejice, ki so nadalje razvejene v tanjše vejice, ki se končujejo z rožnatimi ali rdečkasto vijoličastimi vršički. Mikorizna vrsta in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(332) Navadna ledenka***Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst. (1868)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

uhljarke (*Auriculariaceae*)

goba je školjkaste oblike, z bolj ali manj izrazitim stranskim betom, z želatinastim vodenim in prosojnim mesom, s hrapavo površino klobučka in z igličasto trosovnico. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(334) Rdečkasta blazinica***Pulvinula convexella* (P. Karst.) Pfister (1976)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

blaziničarke (*Pulvinulaceae*)

trosnjak ima obliko vdratih kovancev, star ima nagubano osredje, živo oranžno rdeče barve, gladek, viskozen in svetleč, rob je rahlo ukrivljen in včasih valovit, blazinast, zunanja stran je fino hrapava in belkasta do rožnata. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(336) Rumena griva***Ramaria flava* (Schäff.) Quél. (1888)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

žilolistarke (*Gomphaceae*)

goba ima grmičast svetlo rumen trosnjak z belim in debelim betom, s citronasto rumenimi vejami, ki imajo rumene vršičke in ima bolj ali manj belo meso. Mikorizna vrsta in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



331



332



333



334



335



336

(337) Cvetačasta prašilka*Reticularia lycoperdon* Bik. (1791)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

prašilkarke (*Reticulariaceae*)

goba raste na drevesih kot belkasta blazinica in ima v notranjosti trose, ki jih v končni rastni stopnji praši v okolico. Povzroča sluzasto plesen. Raste na deblih odmrlih listnatih dreves. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(339) Pegasta korenarka***Rhodocollybia maculata* (Alb. & Schwein.) Singer (1939)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

livkarjevke (*Omphalotaceae*)

goba ima sprva sprva polkrožno izbočen klobuk, ki potem postane vegast ali z valovitim obrobjem, belkast, gladek, na osredju okrast in rjavo lisast. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(341) Oranžnorumena mahoživka***Rickenella fibula* (Bull.) Raithelh. (1973)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

mahoživkarke (*Rickenellaceae*)

goba ima polkroglast klobuk in udrto sredino; sprva je blede rumen, pozneje skoraj oranžen, na osredju temnejši, na površini ima žarkaste proge; z lupo lahko na vsej površini opazimo tanke dlačice. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(338) Marelični škrlatnik***Rheubarbariboletus armeniacus* (Quél.) Vizzini, Simonini & Gelardi (2015)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

barva klobuka lahko spominja na barvo marelice, ima rumen bet z rjavimi otenki in sprva rumeno trosovnico, ki na pritisk pomodri, star je olivno rjave barve, raste pod bori ali pa pod hrasti. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(340) Javorjeva obliževka***Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr. (1819)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

obliževkarke (*Rhytismataceae*)

goba raste kot nekajšen obliž na odpadlih javorovih listih. Je glivična bolezen javorovih dreves, ki se z vetrom širi kot okužba, a ni tako nevarna, da bi bil v gozdovih potreben nadzor. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(342) Osluzena čeladnica***Roridomyces roridus* (Fr.) Rexer (1994)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

strniščarke (*Strophariaceae*)

gobo spoznamo po opazni sluzi na betu, klobuček pa je suh in blede rjavo-sivih barv, sprva zaobljen ali široko konveksen, nato se razširi skoraj v sploščeno obliko, ko dozori pa ima pogosto udrto osredje. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



337



338



339



340



341



342

(343) Osmojena golobica*Russula adusta* (Pers.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

sprva izbočen klobuk je pozneje zravnana, na osredju vdrt in okrašt do sivo rjav ali do sivo črn, kot bi bil osmojen, v vlažnem vremenu sluzast in lepljiv, na robu je svetlejši, krhek, rob je nepravilen ali tudi valovit. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(345) Vabljiva golobica***Russula amoena* Quél. (1881)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima zelo pisano obarvan klobuk, stare gobe pa imajo tipičen vonj po trimetilaminu ali po ribah, zlasti v dnišču beta. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, lističi so pod klobukom. Raste pod listavci in iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(347) Škrlatna golobica***Russula atropurpurea* (Kromb.) Britz. (1893)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

sprva polkrožen klobuk se nato se zravnja, je mesnat in čvrst, purpurno ali vinsko rdeč, s skoraj črnim osredjem, gladek, svetleč, površina je barvno zelo različna - od umazano rožnate do rjave, star rahlo grbast. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(344) Zelena golobica***Russula aeruginea* Lindblad ex Fr. (1863)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

srednje velika goba, ima zelen klobuk in je po njem poimenovana, podobna je vsem drugim golobicam, vendar na jeziku precej pekoča, bet in lističi pa so beli. Mikorizna vrsta in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(346) Vonjava golobica***Russula amoenolens* Romagn. (1952)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

razmeroma majhna vrsta golobic, z močno grebenasto nažlebljenim obrobjem in ima rastišče pod hrasti, vonj pa ima po siru ali po ribah. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, lističi so pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(348) Zlatolistna golobica***Russula aurea* Pers. (1796)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

srednje velika vrsta z oranžno rdečim ali rumenim klobukom in z rumenkastimi lističi, ki imajo zlatorumene ostrinke, po čemer je poimenovana, ima pa tudi bolj ali manj rumen bet. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



343



344



345



346



347



348

(349) Brezovinska golobica*Russula betularum* Hora (1960)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

sprva izbočen klobuk je skoraj belkast, pozneje sploščen in blede rožnat do izrazito rožnat, na osredju rahlo udrt, star postane razbrazdan. Mikorizna vrsta predvsem z brezami in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(351) Gabrova golobica***Russula carpini* R. Girard & Heinem. (1956)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima na klobuku pisano paletto barv, od vijoličasto vinsko rdeče do rjavo rdeče s primešanimi olivno rjavimi in zelenimi odtenki. Mikorizna vrsta predvsem z gabri in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(353) Borova golobica***Russula cessans* A. Pearson (1950)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

srednje velika goba, vinsko rdečkaste barve, milega okusa, z okrasto rumenimi lističi in belim betom. Mikorizna vrsta in prostotrosnica, najdemo jo pod iglavci, še zlasti pod bori. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(350) Grbičasta golobica***Russula caerulea* (Pers.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

sprva izbočen klobuk se kasneje poravna in je rahlo udrt na osredju, kjer ima vedno grbico; je temno vinske ali vijolično rjave barve, osredje je temnejše in skoraj črno. Mikorizna vrsta in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(352) Votlobetna golobica***Russula cavipes* Britzelm. (1893)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva izbočen, nato zravn, udrt na osredju ter z nizko grbico, obrobje je izrazito nažlebkano, gladek in svetleč, vinsko rdeče vijoličaste barve, na sredini temnejše rjavkasto vijoličast. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(354) Ozkolistna golobica***Russula chloroides* (Krombh.) Bres. (1900)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

sprva je klobuk skoraj ravno sploščen in z močno spodvihanim robom, kmalu je na osredju močno udrt, končno z dvignjenim obrobjem, lijast, belkast in ni povsem gladek. Mikorizna vrsta in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



349



350



351



352



353



354

(355) Rumena golobica*Russula claroflava* Grove (1888)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je najprej polkroglast, nato se zravna na temenu, pri starih gobah pa postane osredje nekoliko udrto, gladek, je intenzivno rumen, kožica je lupljiva, precej trda in debela. Mikorizna in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(357) Modrikasta golobica***Russula cyanoxantha* (Schäff.) Fr. (1863)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

značilen je modrikasto zelenkasti in lisasti klobuk, ki ima bele in prožne lističe, bel bet, ki je včasih vijoličasto nadahnjen, je milega okusa. Vrsta je prostotrosnica in mikorizna z mešanim drevjem. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(359) Modrolistna golobica***Russula delica* Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva izbočen, pozneje sploščen, v sredini vdrt in končno lijast, sprva bel in pozneje belkast z rjavimi lisami, rob sprva spodvit, pozneje razprt, valovit in razpokan. Bet je kratek in zelo širok. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(356) Kratkobetna golobica***Russula curtipes* F.H. Møller & Jul. Schäff. (1935)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva polkroglast, nato sploščen in na osredju udrt, vinsko škrlatne barve do rdeče rjav, lahko tudi z rožnatimi odtenki, površina je koncentrično obarvana, rob je nažlebkkan in pri starih gobah valovit. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024**(358) Siveča golobica***Russula decolorans* (Fr.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

sprva poloblast klobuk postane sploščen in končno vdrt, gladek, svetleč, nekoliko lepljiv, oranžno rdeč, zbledel, z nekoliko nažlebkkanim robom. Bet je v starosti črnkasto siv. Prostotrosnica in mikorizna. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(360) Bljuvna golobica***Russula emetica* (Schäff.) Pers. (1796)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva je polkrožen kot pri vseh golobicah, kasneje razprt; rdeča goba z belimi lističi in belim betom, ki po uživanju povzroča želodčne težave, predvsem bljuvanje. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023



355



356



357



358



359



360

(361) Razbarvana golobica*Russula exalbicans* (Pers.) Melzer & Zvára (1928)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

sprva polkroglast klobuk postane kasneje izbočen in rahlo udrt, skoraj lijakaste oblike, sprva blede rdečkaste, kasneje zbledi, gladek, svilen, vlažen sijoč in lepljiv, na robovih se rad razcepi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(363) Žolta golobica***Russula fellea* (Fr.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva polkrožen, kasneje rahlo vzbočen in zravn, star z rahlo udrtim osredjem, bolj ali manj okraštih barv, na obrobju svetlejša in stara rahlo nažlebkana. Prostotrosnica in mikorizna predvsem z bukvami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(365) Krhka golobica***Russula fragilis* Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva izbočen, kmalu se zravn, na osredju nekoliko udrt in rjav, obrobje je rožnato vijoličasto z zelenkastimi toni in zelo tanko, gladek, svetleč zaradi vlažne povrhnjice. Prostotrosnica in mikorizna z mešanim drevjem. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(362) Bukova golobica***Russula faginea* Romagn. (1967)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva izbočen, nato sploščen, na osredju udrt, gladek, suh je žametast, vlažen je lepljiv, okrašte do lešnikovo rjave barve, občasno nekoliko zbledel na robu. Vrsta je prostotrosnica in mikorizna predvsem z bukvami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(364) Smrdljiva golobica***Russula foetens* (Pers.) Pers. (1796)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

nekoliko zajetnejša goba, s širokim klobukom in močnim betom, vsa bolj ali manj okrasto rjavih barv, razpoznavna pa po razmeroma neprijetnem vonju. Vrsta je prostotrosnica in mikorizna z mešanim drevjem. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(366) Rjavočrna golobica***Russula fusconigra* M.M. Moser (1979)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

sprva polkroglast klobuk je pozneje izbočen in na osredju udrt, starejši na robu nažlebkani, rjavkasto črn, temnejši predvsem na osredju, skoraj umazanega videza, pogosto ima mešane barvne lise ali pege. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



361



362



363



364



365



366

(367) Sivkasta golobica*Russula grisea (Batsch) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (Russulaceae)

klobuk sprva izbočen, kasneje zravn, z udrtim osredjem, sive do temno sive barve in s temnejšim ter rjavkastim osredjem, tudi sivo rjavkast ali olivnato siv, rob je lahko valovit in se rad cepi, mesnat. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(369) Mila golobica***Russula insignis Quél. (1888)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (Russulaceae)

klobuk je sprva izbočen in kasneje zravn ter z udrtim osredjem, milega videza, blede okraščene rjave barve, na osredju temnejši, vlažen, na robu nažlebkast in tudi valovit, star nekoliko hrapav. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(371) Siva golobica***Russula ionochlora Romagn. (1952)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (Russulaceae)

klobuk je sprva polkroglast, pozneje izbočen in na osredju udrt, siv do sivo lilast ali blede vinsko rdeče barve, zmerno mesnat, osredje je svetlejš, rob je pri starejših gobah rebrast. Vrsta je prostotrošnica in mikorizna predvsem z bukvami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(368) Rjavozelena golobica***Russula heterophylla (Fr.) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (Russulaceae)

goba je srednje velika, zelena ali rjava zelena vrsta, ki ima smetanove in viličasto razcepljene lističe okoli beta. Vrsta je prostotrošnica, mikorizna z listavci in iglavci, pogosto je na robu gozda v travi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(370) Usnjasta golobica***Russula integra (L.) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (Russulaceae)

srednje velika golobica, kmalu razprta in s klobukom, ki ima usnjasto površino; ima debele okraščene lističe in je milega okusa. Vrsta ima rumenkasto meso, je prostotrošnica, mikorizna z iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(372) Spolzka golobica***Russula laeta Jul. Schäff. (1952)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (Russulaceae)

klobuk je sprva polkroglast, pozneje izbočen in na osredju rahlo udrt, lepljiv in sluzast v vlažnem vremenu, oranžno rožnate do svetlo rožnate ali vinsko rdeče do rdeče vijolične barve, na sredini svetlejši in rumeno okraščene barve. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



367



368



369



370



371



372

(373) Rumeneča golobica*Russula luteotacta* Rea (1922)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima vzbočen klobuk, rahlo udrto v osredju, nekoliko mazav, svetleč, kasneje lesk izgubi, bolj ali manj rdečih barv. Vrsta je prostotrosnica in mikorizna v listnatih gozdovih, zlasti z gabri. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(375) Bleščava golobica***Russula nitida* (Pers.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je vinsko rdeče, vijolično rdeče barve, sijoč, osredje poglobljeno, pogosto z grbico, pogosto radialno žilasto naguban. Kožico je mogoče olupiti do polovice polmera klobuka. Rob je tanek, običajno nažlebkano. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024**(377) Olivna golobica***Russula olivacea* (Schäff.) Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

največja med golobicami, pestro obarvana tudi z olivnimi odtenki, ima debele in lomljive lističe, spada tudi v skupino golobic milega okusa in z okrasto rumenim trosnim prahom. Vrsta je prostotrosnica in mikorizna. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(374) Drobcena golobica***Russula minutula* Velen. (1920)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

sprva kroglast klobuk je kasneje izbočen in z rahlo udrtino na osredju, pri starejših gobah je lahko rob zavihan navzgor, rožnat do rožnato rdečkast ali škrlatno rdečkast, osredje je pogosto oranžno okrasto, suh. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(376) Okrasta golobica***Russula ochroleuca* Fr. (1838)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva polkrožen, nato zravnano, rumen ali okrast, včasih z zelenkastim odsevom, svetleč, gladek, star na osredju udrto, obrobje je gladko in lupljivo ter ima dolgo časa spodvihan rob. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(378) Rumolistna golobica***Russula pallidospora* J. Blum ex Rom. (1967)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

mlad klobuk potlačeno zravnano in sprva skoraj bel ter s spodvihanim robom, kasneje se zravnano in postane močno lijav ter okrasto rjav na poglobljenem osredju, obrobje pa ostane gladko in svetlejše. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021



373



374



375



376



377



378

(379) Sivomodra golobica*Russula parazurea* Jul. Schäff. (1931)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva polkrožen in izbočen, kasneje zravnin in rahlo udrt, sivo modre barve, na osredju temnejši, modrikasto poprhnjen, brez leska, žarkasto rebrast zaradi lističev pod klobukom, včasih se na robu cepi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(381) Marelična golobica***Russula risigallina* (Batsch) Sacc. (1915)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

širok in gladek klobuk je najprej izbočen in marelično rumen, razprt ima rumeno osredje udrto, gladko obrobje je nekoliko svetlejšje. Vrsta je prostotrosnica, mikorizna z listavci in iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(383) Trda golobica***Russula rosea* Pers. (1796)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

gobo spoznamo po srednje velikem rožnato rdečem gladkem klobuku, belih lističih in betu ter po mesu, ki je milega okusa. Vrsta je prostotrosnica, mikorizna z listavci in iglavci, največkrat z bukovami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(380) Rjavobetna golobica***Russula pectinatoides* Peck (1907)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva polkrožen, kasneje izbočen, na osredju rahlo udrt ali včasih celo s široko grbo, svetlo rjavkaste do rumeno rjavkaste barve, na osredju je temnejši, žarkasto rebrast zaradi lističev pod klobukom. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(382) Malinova golobica***Russula romellii* Maire (1910)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva izbočen, pozneje zravnin in končno udrt, malinovo do vinsko rdeč, obrobje je vijoličasto, drobno nagubano, osredje je nekoliko zelenkasto do olivno zeleno, površina je gladka. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(384) Rožnabetna golobica***Russula roseipes* Secr. ex Bres. (1883)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

goba ima klobuk, ki je čudovite oranžno-rumene barve z bolj ali manj rožnatim robom. Površina je gladka in suha ter mat, ko se posuši. Lističi so rumenkasti. Vrsta je prostotrosnica, mikorizna z iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



379



380



381



382



383



384

(385) Češnjeva golobica*Russula sanguinaria (Sch.) Rauschert (1989)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva polkrožen, nato se zravnja, bolj ali manj rdeč, dokaj gladka površina sčasoma izgublja barvo in tudi povsem zbledi, mesnat, kožice pa ni možno olupiti na obrobju. Prostotrosnica in mikorizna z iglavci. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024**(387) Sestrška golobica***Russula sororia (Fr.) Romell (1891)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva izbočen, pozneje razprostrt in končno lijakast ali udrt, pepelnato rjav, na robu rahlo nazobčan, v vlagi masten in spolzek. Prostotrosnica in mikorizna z listnavci; raste v mešanih gozdovih. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(389) Užitna golobica***Russula vesca Fr. (1836)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva polkrožen, na osredju je kmalu udrt, ko se popolnoma razpre postane lijaste oblike, gladek, mesnato rdečkast, na obrobju svetlejši in star nekoliko nažlebkast, kožica je lupljiva na obrobju. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(386) Sončna golobica***Russula solaris Ferd. & Winge (1924)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

elegantna golobica ima svetleč rumen do zlat klobuček, ki ima bolj blede in nažlebljeno obrobje, je zelo pekoča in rada uspeva pod bukvami. Prostotrosnica in mikorizna vrsta, lističi so pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(388) Žgoča golobica***Russula cuprea (Krombh.) J.E. Lange (1926)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je polkroglast, kasneje izbočen, na koncu raven in plitvo vtisnjen v sredini, običajno rdečkasto rjav, lahko pa tudi rjavkasto vijoličen, v sredini običajno temnejši ali se zbledi v okro. Mikorizna s hrasti. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(390) Krhljiva golobica***Russula veternosa Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

majhen do srednje velik klobuk, s sivkasto rožnato do rjavkasto rožnato, motno obarvano površino, z bledečo rumenkasto rjavo sredino, belim betom in kremasto rumenimi lističi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021



385




386



387



388



389



390

(391) Vijoličnobetna golobica*Russula violeipes* Quél. (1898)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

klobuk je sprva citronasto do žvepleno rumen in kasneje še primesi olivno zelene in rjavo vijoličaste barve, na osredju pa je nekoliko pegasta, medtem ko nekatere različice dolgo ohranijo citronasto barvo. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(393) Navadna cepilistka***Schizophyllum commune* Fr. (1815)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cepilistarke (*Schizophyllaceae*)

trošnjak je pahljačaste ali školjkaste ali tudi ledvičaste oblike, polstene sivo bele ali belkaste površine, pri strani prirasel na osnovo, v suši je trd. Saprofiti do oportunistični patogeni. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(395) Mekinasta trdokožnica***Scleroderma areolatum* Ehrenb. (1818)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

trdokožarke (*Sclerodermataceae*)

trošnjak je gomoljast in mekinast (ima zelo drobne delčke poroženele povrhnjice), trda in drobno zrnčasta koža oz. površina je podobna leopardovi koži, namesto beta pa ima gost splet rumenkastih konopccev. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(392) Zelenkasta golobica***Russula virescens* (Schäff.) Fr. (1836)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

golobičarke (*Russulaceae*)

zaradi zelenkastega in razpokanega klobuka, jo zlahka določimo, je precej debelo mesnata, trda in z belimi lističi, ima bel bet in je milega, prijetnega okusa. Vrsta je mikorizna z mešanim drevjem. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(394) Nenavadna razporka***Schizopora paradoxa* (Schröd.) Donk (1967)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razporovke (*Schizoporaceae*)

nenavadni trošnjak oz. lesna goba se kot saprofit razraste v podobi obliža po odpadnem deblu listavca in je poln podolgovatih razprtih, od katerih izvira ime razporka. Povzroča belo trohno. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(396) Kroglasta trdokožnica***Scleroderma bovista* Fr. (1829)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

trdokožarke (*Sclerodermataceae*)

trošnjak je mlad skoraj kroglaste oblike, pozneje pa nepravilno gomoljast, v spodnjem delu betasto zožen, na površini skoraj gladek in drobno luskast, rumeno okrašt do oranžen, ima tanko in trdo ovojnico. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



391



392



393



394



395



396

(397) Gladka trdokožnica*Scleroderma cepa* Pers. (1801)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

trdokožarke (*Sclerodermataceae*)

skoraj kroglast trosnjak je navadno sploščen, ima gladko površino, sprva belkast do slamnato rumenkast do usnjeno rjav, ovojnica je debela 1-3 mm in trda ter bela na prerezu. Saprofit in prostotrosnica.

Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(399) *Scleroderma verrucosum**Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers. (1801)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

trdokožarke (*Sclerodermataceae*)

trosnjak je nepravilno kroglast, prekrit s tanko ovojnico, ki ni gladka, temveč vsa drobno zrnata, bradavice na gosto prekrivajo svetlejšo ovojnico, ki je trda in rjave barve, proti dnu pa ima rožnati odtenek. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024

(401) Ščitasta ščetinka*Scutellinia scutellata* (L.) Lambotte (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ognjarke (*Pyronemataceae*)

širok trosnjak je sprva kroglast, pozneje oblikovan kot plitva skledica, nato diskast, gornja stran je škrlatno rdeča, gladka, svetleča, zunanja stran in rob sta gosto poraščena z rjavimi ščetinami, je mesnat in brez beta. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023

(398) Navadna trdokožnica*Scleroderma citrinum* Pers. (1801)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

trdokožarke (*Sclerodermataceae*)

kroglast trosnjak je včasih podolgovat ali rahlo sploščen, z grobo razpokano rumeno rjavo površino, odprtina, skozi katero uhajajo trosi, nikoli zvezdasto ne razpoka, ovojnica je debela in trda. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021

(400) Drobna ščetinka*Scutellinia minor* (Velen.) Svrček (1971)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ognjarke (*Pyronemataceae*)

sprva okrogle, kasneje skodeličaste ali diskaste oblike, neposredno naležejo na podlago; notranja površina je svetlo oranžna do rdečkasto oranžna, zunanja površina je enake barve in z dlačicami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024

(402) Hrapavotrosna ščetinka*Scutellinia trechispora* (Berk. & Broome) Lambotte (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ognjarke (*Pyronemataceae*)

sprva krožnikaste oblike, kasneje sploščene kot disk, neposredno pritrjena na podlago; notranja himenialna površina je oranžna, do temno rdeča, zunanja stran pa je rdeče-rjavkasta in prekrita s temno rjavimi dlačicami. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025



397



398



399



400



401



402

(403) Borov glivec*Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (1821)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

glivčarke (*Sparassidaceae*)

trošnjak je zgrajen iz številnih ploščatih vej, ki rastejo iz skupnega beta in se proti koncem še bolj sploščijo, razširijo ter močno nakodrajo, površina kodrastih loput je gladka, blede okrase barve, robovi pa so ostri in močno vijugasto nakodrani. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(405) Kosmata slojevka***Stereum gausapatum (Fr.) Fr. (1874)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

slojarke (*Stereaceae*)

trošnjak ima debelino lista, pahljačaste oblike, ob strani prirasel na les, površina je valovita in razdeljena v sloje; vrhnja stran je kosmata, trošnjak je kožnato žilav, okraso-rjavkast do rdečkasto-rjavkast, rob je večinoma skodran. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(407) Žametasta slojevka***Stereum subtomentosum Pouzar (1964)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

slojarke (*Stereaceae*)

goba ima klobučevinast klobuček, ki je na pahljačasti in valoviti površini žametast in iz več koncentrično obarvanih slojev, ki porumenijo, če jih poškodujemo; raste skupinsko predvsem na odmrlih delih jelš in bukev. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(404) Valujoča nitkarica***Stemonitis fusca Roth (1788)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

nitkaričarke (*Stemonitidaceae*)

trošnjak je v razviti obliki podoben valoviti visoki odebeljeni niti, ki je pritrjena na vitkem betu in z ostalimi trošnjaki raste tesno skupaj v nekakšnem snopu na razpadajočih ostankih lesa. Spada med sluzaste plesni in povzroča trohnobo lesa. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(406) Dlakava slojevka***Stereum hirsutum (Willd.) Pers. (1800)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

slojarke (*Stereaceae*)

trošnjak je polkrožne do pahljačaste oblike, ob strani prirasel na les, površina je valovita in razdeljena v sloje, poraščena z gostimi dolgimi dlakicami, trošnjak je kožnato žilav, rumenkast ali sivo okras do rjavkast. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(408) Črni kuštravec***Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. (1851)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba je nenavadnega videza z grobimi črno rjavimi kosmičastimi luskami na klobuku in s sivimi luknjicami, ki so pri mladih primerkih pokrite z zastiralom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



403



404



405



406



407



408

(409) Svinjski lupljivec*Suillellus luridus* (Schäff.) Murrill (1909)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima oranžno rdeče luknjice pod klobukom in žametast klobuk, posebej značilna pa je velika, podolžna, močno izražena mrežica na betu. Mikorizna vrsta in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(411) Prožna lupljivka***Suillus bovinus* (Pers.) Roussel (1898)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

gobo spoznamo po rumenkasto rjavem in gladkem klobuku z lupljivo kožico, po širokih oglatih luknjicah, ki so nekoliko poraščene na bet ter po mehkem prožnem mesu. Mikorizna vrsta in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(413) Maslena lupljivka***Suillus luteus* (L.) Roussel (1796)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba praviloma raste v bližini borov, spoznamo jo pa po močno sluzavem, bolj ali manj rjavem klobuku in po kožastem zastiralcu, ki ima tu in tam vijoličast odtenek, kožico pa lahko zlahka odstranimo s klobuka. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(410) Varljivi lupljivec***Suillellus mendax* (Simonini & Vizzini) Vizzini, Simonini & Gelardi (2014)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

klobuk je sprva polkrožen, nato se zravna in ostane rahlo izbočen, redko je raven, suh, žametast in nikoli polsten ali gladek, olivno rjavkast, oranžen ali rjav, barva se rada spreminja ob vremenskih spremembah. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(412) Macesnova lupljivka***Suillus grevillei* (Klotzsch) Singer (1945)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba praviloma raste pod macesni, spoznamo pa jo po oranžno rumenih odtenkih v vseh delih trosnjaka in po kožastem zastiralcu, ki pri mladih gobah prekriva trosovnico. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(414) Bela lupljivka***Suillus placidus* (Bonord.) Singer (1945)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba praviloma raste pod zelenim borom (*Pinus strobus*) in pod cemprinom (*Pinus cembra*), ima bel ali rumenkast klobuk, podobno pa so obarvane tudi luknjice in bet, medtem ko bročka nima. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



409



410



411



412



413



414

(415) Siva lupljivka*Suillus viscidus (L.) Roussel (1796)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba praviloma raste pod macesni, tako kot macesnova lupljivka, razlikuje pa se po sivih in sivo zelenkastih odtenkih na vseh delih trosnjaka. Mikorizna vrsta in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(417) Žarka sivolistka***Tephrocyebe rancida (Fr.) Donk (1962)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

zajčkarke (*Lyophyllaceae*)

goba je sive barve, ki prevladuje v vseh delih trosnjaka, koreninasto podaljšan tanek bet in izrazit vonj po žarki moki omogočajo, da vrsto lahko določimo že na rastišču. Saproisit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(419) Čopičasta roža***Thelephora penicillata (Pers.) Fr. (1821)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

rožarke (*Thelephoraceae*)

trosnjak je podoben pahljačasti roži s številnimi belimi čopičastimi vršički, koralaste ali peresaste oblike s povezanimi peresi in belkastimi čopičastimi vršički, rjav do vijolično rjav, žilav in usnjast. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(416) Žametni podvihanec***Tapinella atrotomentosa (Bat.) Šut. (1992)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

podvihančarke (*Tapinellaceae*)

gobo spoznamo po bolj ali manj školjkasti obliki rjavega klobuka, po črnem žametastem betu in po okrasto rumenkastih lističih, ki se spuščajo na bet, rob klobuka pa ima močno spodvit. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(418) Žoltovišnjeva trebušarka***Thaxterogaster croceocoeruleus (Pers.)**Niskanen & Liimat. (2022)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

koprenarke (*Cortinariaceae*)

mlad klobuk je polkroglast, kasneje izbočen, vlažen je lepljiv in zelo sluzast, suh svetleč, mlad modrikast do višnjeve barve z rumenkastimi odtenki, starejši postane okrast, rob je včasih prekrit z okrasto rjavim velumom ali ostankom koprene. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(420) Grbasta ploskocevka***Trametes gibbosa (Pers.) Fr. (1838)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

trosnjak je poličaste oz. konzolne oblike raste na štorih listavcev, ima grbasto površino, trosovnica pa je cevasta oz. luknjičasta. Je škodljivec in povzroča belo trohnobo, predvsem na bukvah. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021



415



416



417



418



419



420

(421) Nakosmatena ploskocevka*Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd (1924)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (Polyporaceae)

trošnjak je poličaste oblike, stransko priraščen na osnovo, zgornja površina je iz različno obarvanih koncentričnih krogov od belkaste do rumeno rjave in okrašto rjave do sive barve, kosmat, trd in plutast. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(423) Puhasta ploskocevka***Trametes pubescens (Schum.) Pilát (1939)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (Polyporaceae)

goba raste na odmrlih vejah dreves poličasto; ploščati trošnjak ima puhasto površino klobuka, na spodnji strani pa luknjičasto trosovnico. saprofite do šibke parazite, ki razgrajuje lignin in celuloz. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(425) Pisana ploskocevka***Trametes versicolor (L.) Lloyd (1921)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (Polyporaceae)

lesna goba, pri kateri so skupinsko rastoči pahljačasti trošnjaki včasih drug nad drugim strehasto poravnani, imajo kolobarjasto in pisano barvno površino, spodaj pa so cevasti in imajo okrogle pore. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2021**(422) Kolobarjasta ploskocevka***Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden (1987)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (Polyporaceae)

trošnjak ploščate oblike in poličasto prirasel na odmrlih delih listavcev ima kolobarjasto površino, na spodnji strani pa luknjičasto trosovnico. Je nevaren drevesni škodljivec, ker povzroča belo trohnobo. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(424) Navadna ploskocevka***Trametes trogii Berk. (1850)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

luknjarke (Polyporaceae)

trošnjak je ploščate oblike in poličasto prirasel na odmrlih delih listavcev, na spodnji strani ima luknjičasto trosovnico in je nevaren drevesni škodljivec, ker povzroča belo trohnobo. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(426) Rjaveča ploskocevnica***Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský (2008)*

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

rašpovkarke (Irpicaceae)

trošnjak poličaste oblike je zaraščen eden z drugim in eden nad drugim na štorih listavcev, je ploščat in tanek, s staranjem postaja rjaveč, trosovnica je luknjičasta, povzroča belo trohnobo. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024



421



422



423



424



425



426

(427) Papirasta apnenka*Trichaptum biforme* (Fr.) Ryvarden (1972)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

usnjarke (*Hymenochaetaceae*)

trošnjak oblike pahljače je zaradi tankosti imenovan po papirju in po beli barvi apna, lepa luknjičasta trosovnica na spodnji strani pa je lilasto vijolična. Povzroča razkroj in trohnobo lesa, kaže pa se kot porumenitev. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(429) Črnotuska kolobarnica***Tricholoma atroscamosum* Sacc. (1887)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

klobuk je sprva izbočen in z grbico na osredju ter s spodvitim robom, kasneje razprt, mesnat in krhek, mlade gobe so sivo črne, povrhnjica z rastjo razpoka na goste, drobne in mehke vlaknate luske, ki so črnih barv. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(431) Rjavoluska kolobarnica***Tricholoma filamentosum* (Alesio) Alessio (1988)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

goba je dokaj velika in ima na klobuku vlaknate luske rjave barve ter vse tipične značilnosti kolobarnic. Raste mikorizno, pod listnatimi drevesi in soada med prostotrosnice. Lističi so pod klobukom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(428) Citronasta blazinka***Trichoderma citrinum* (Pers.) Jaklitsch, W. Gams & Voglmayr (2014)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

blazinovkarke (*Hypocreaceae*)

trošnjak je skorjast in podoben citronasto rumeni plesni, ki se navadno sprva pojavlja kot ploska kapljica na odpadlem lesu in pozneje kot razrašččen obliž, na dotik pa je mehka kot blazina. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(430) Golobičja kolobarnica***Tricholoma columbetta* (Fr.) P. Kum. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

klobuk je snežno bel s svetlimi rdečkastimi, modrikastimi ali vijoličastimi lisami, ima tudi bleščečo in svilnato vlaknato površino. Povrhnjica je kar debela, okoli enega milimetra. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(432) Rumeneča kolobarnica***Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quél. (1872)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

značilno za to vrsto je, da beli lističi ob robu klobuka dobivajo citronsko rumene lise in tudi sprva belo meso pozneje postane rumeno lisasto. Prostortrosnica in mikorizna z mešanih drevjem. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



427



428



429



430



431



432

(433) Pogubna kolobarnica*Tricholoma sciodes* (Pers.) C. Martín (1919)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

klobuk je grbasto vzbočen, nato zravnano, vlaknato žarkasto prekrito, sivih barv, včasih z rožnatim ali vijoličastim odtenkom, gladek, le pri starih gobah se vlaknenca luskato sprostito. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(435) Rdečkasta trhlenka***Tricholomopsis rutilans* (Schäff.) Sin. (1939)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kukmarke (*Agaricaceae*)

goba je precej spremenljiva po velikosti in barvi, najlažje pa jo je spoznati po luskatem rdečkastem klobuku, po katerem ima ime in po rastišču na borovih panjih. Saprofit in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(437) Oranžna ikrovka***Tubifera ferruginosa* (Bat.) J.F. Gmel. (1791)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

ikrovkarke (*Tubiferaceae*)

mlad trosnjak je podoben jagodnim ali malinastim tvorbam ter sestavljen iz velikega števila ribjim ikram podobnih kroglic oranžne barve, dozorel pa je skoraj rjasto rjave barve. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022**(434) Osmojena kolobarnica***Tricholoma ustale* (Fr.) P. Kumm. (1871)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

kolobarničarke (*Tricholomataceae*)

klobuk je sprva polkrožen, nato izbočen in končno zravnano, gladek, suh bleščeč, rdeče ali kostanjevo rjav, včasih ima olivnato barvne odtenke, na obrobju svetlejši, star pa počrni. Mikorizna, prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(436) Svetloroba trobljica***Tubaria furfuracea* (Pers.) Gillet (1876)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

trobljičarke (*Tubariaceae*)

klobuk je sprva vzbočen, nato vzravnano ali celo malo udrt, pogosto s privihanim robom, gladek, sprva površinsko vlaknat, ob robu z minljivimi kosmičastimi ostanki ovojnice, okraško do lisičje rjav, suh močno zbledi. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(438) Žolčasti grenivec***Tylopilus felleus* (Bull.) P. Karst. (1881)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima zelo grenko meso, starim primerkom rožnata trosovnica močno izstopi, se blazinasto napne, mreža na betu pa je raztegnjena in močno reliefna. Mikorizna z mešanim drevjem in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2022



433



434



435



436



437



438

(439) Jesenova večnoluknjičarka*Vanderbylia fraxinea* (Bul.) D.A. Reid (1973)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

luknjarke (*Polyporaceae*)

konzolno oblikovana lesna goba običajno raste na dnu starih, še živih listavcev, kot so jesen, hrast, bukev in drugi. Je parazit, ki povzroča belo trohno in uniči koreninsko mrežo drevesa ter povzroči njegovo odmiranje. Goba je najdena na območju 1.

Popis: 2021**(441) Rdečebetni polstenec***Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara (2008)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima vitek rdeč bet, rumene luknjice in bolj ali manj rjav klobuk, ki v starosti razpoka, razpoke so vinsko rdeče barve, površina pa je žametasta. Mikorizna z mešanim drevjem in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(443) Topotrošni polstenec***Xerocomellus porosporus* (Imler ex Watling) Šutara (2008)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

goba ima razpokan rjavkast klobuk, razpoke ne pordečijo, ima trose s prisekanim oz. topim vrhom, uspeva v mešanih gozdovih, obstajajo pa številne barvne varietete tovrstne gobe. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2022**(440) Uničujoča viljeminka***Vuilleminia comedens* (Nees) Maire (1902)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

viljeminkarke (*Vuilleminiaceae*)

trošnjak je skoraj neopazna gliva, parazit, ki raste pod lubjem ter skorji daje voskast izgled in otip. Uničujoča viljeminka povzroča belo trohno. Spada med prostotrošnice. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023**(442) Modreči polstenec***Xerocomellus cisalpinus* (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Klofac (2011)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

klobuk je sprva sivo rumen in kasneje rjav, na začetku polkrožne in pozneje konveksne oblike, je plitev in tanko meso hitreje pomodri ob prerezu, razpokan na razpokah tudi pordeči, mlad je zelo podoben gobanom. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2024**(444) Poprhnjeni polstenec***Xerocomellus pruinatus* (Fr. & Hök) Šutara (2008)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (*Boletaceae*)

poprhnjena in fino dlakasta goba najraje raste v višinskem iglastem gozdu v velikih skupinah in velja mlada za vsestransko uporabno užitno gobo. Mikorizna in prostotrošnica. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2023



439



440



441



442



443



444

(445) Navadna polstenka*Xerocomus subtomentosus (L.) Quél. (1888)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

cevarke (Boletaceae)

klobuk je najprej polkrožen, nato se zravnja in postane blazinast, gladek, polsten, olivno rjavkast ali zelen, rumeno rjavkast in precej mesnat. Vrsta je prostotrosnica in mikorizna z iglavci. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2021**(447) Kopučasta lesenjača***Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. (1824)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

lesenjačarke (Xylariaceae)

goba je saprofit, ki razgrajuje lignin in celulozo, raste pa na strohnelih štorih in na lesu v obliki kijasto oblikovanega trosnjaka, kopuče oz. strnjene gruče gob. Povzroča črno trohnobo v koreninah dreves. Goba je najdena na območju 3.

Popis: 2025**(446) Vitka lesenjača***Xylaria hypoxylon (L.) Grev. (1824)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

lesenjačarke (Xylariaceae)

kijasto oblikovani trosnjak je v mladosti v celoti belkast do sivkast, pozneje se pojavijo črni peclji in rogljasto oblikovane sploščene konice, skoraj cela ali v zgornjem delu in zlasti na konicah kredasto bela. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2023**(448) Bezgov zobnik***Xylodon sambuci (Pers.) Jura, Zmitr., Wasser & Spirin (2011)*

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

razporovke (Schizoporaceae)

beli trosnjak ima obliko široke zaplate s številnimi drobnimi ploskimi zobci, po katerih je imenovan in se razraste predvsem na odpadnih delih bezgovih dreves. Saprofit in prostotrosnica. Goba je najdena na območju 2.

Popis: 2024



445



446



447



448

Literatura in viri informacij

1. Breitenbach, J. / Kränzlin, F. (1984). ***Fungi of Switzerland.- Vol. 1, Ascomycetes.*** Verlag Mycologia, Luzern.
2. Breitenbach, J. / Kränzlin, F. (1986). ***Fungi of Switzerland.- Vol. 2, Non gilled fungi.*** Verlag Mycologia, Luzern.
3. Breitenbach, J. / Kränzlin, F. (1991). ***Fungi of Switzerland.- Vol. 3, Boletes and Agarics 1st part.*** Verlag Mycologia, Luzern.
4. Breitenbach, J. / Kränzlin, F. (1995). ***Fungi of Switzerland.- Vol. 4, Agarics 2nd part.*** Verlag Mycologia, Luzern.
5. Breitenbach, J. / Kränzlin, F. (2000). ***Fungi of Switzerland.- Vol. 5, Agarics 3rd part.*** Verlag Mycologia, Luzern.
6. Kränzlin, F. (2005). ***Fungi of Switzerland.- Vol. 6, Russulaceae (Lactarius and Russula).*** Verlag Mycologia, Luzern.
7. Kuyper, T. W. (1986). ***A revision of the genus Inocybe in Europe.*** Persoonia, Rijksherbarium, Leiden.
8. Stangl, J. (1989), ***Die Gattung Inocybe in Bayern.*** Verlag der Gesellschaft, Regensburg
9. ING, B. (1993), ***Towards a red list of endangered European macrofungi.*** In: PEGLER, D. N., L. BODDY, B. ING & P. M. KIRK (eds.) *Fungi of Europe: investigation, recording and conservation.* The Royal Botanic Gardens, Kew
10. Candusso, M. (1997). ***Hygrophorus s.l.*** Libreria Basso, Alassio.
11. Basso, M. T. (1999). ***Lactarius Pers.*** Edizioni Candusso, Italia.
12. Laudurner, H. / Simonini, G. (2003). ***Xerocomus s. l.*** Edizioni Candusso, Italia.
13. Bernicchia, A. (2005). ***Polyporaceae.*** Edizioni Candusso, Italia.
14. Medardi, G. (2006). ***Ascomiceti d'Italia.*** Grafica Sette, Brescia
15. Sarnari, M. (2007). ***Genere Russula in Europa.*** Grafica Sette, Brescia.
16. Sánchez Parra, L. A. (2008). ***Agaricus I. Part I.*** Edizioni Candusso, Italia.
17. Hausknecht, A. (2009). ***Conocybe Fayod Pholiotina Fayod in Europe.*** Edizioni Candusso, Italia.

18. Bernicchia, A. / Gorjón, S. P. (2010). **Corticiaceae**. Edizioni Candusso, Italia.
19. Antonin, V. / Noordeloos M. E. (2010), **A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe**. IHW-Verlag, Echting.
20. Boertmann, D., (2010). **The genus Hygrocybe, 2 nd revised edition**. Narayana Press, Gylling.
21. Bernicchia, A. / Gorjon S. P. (2010). **Corticiaceae s. l.** Edizioni Candusso, Italia.
22. Christensen, M. (2013). **The genus Tricholoma**. Narayana Press, Gylling.
23. Courtecuisse R., Duhem B. (2013). **Guide des Champignons de France et d'Europe**. Delachaux et Niestlé, Paris.
24. Sánchez Parra, L. A. (2013). **Agaricus I. Part II**. Edizioni Candusso, Italia.
25. Beker, H. J. / Eberhardt, U. / Vesterholt, J. (2016). **Hebeloma**. Edizioni Tecnografica, Lomazzo.
26. Læssø, T. / Aronsen, H. (2016). **The genus Mycena s. l.** Narayana Press, Gylling, Denmark.
27. Kibby, G. (2017). **Mushrooms and toadstools of Britain and Europe Volume 1**. Geoffrey Kibby (privately published).
28. Mikšík, M. (2017). Hřibovité houby Evropy. Svojtka & Co., s. r. o., Praha.
29. Ryvarden, L. / Melo, I. (2017). **Poroid fungi of Europe**. Printed in Latvia.
30. Jeppson, M. (2018). **Puffballs of Northern and Central Europe**. Nordbloms Trycksaker AB, Hamburgsund.
31. Læssø, T. / Petersen, H. (2019). **Fungi of Temperate Europe, Volume 1**. Princeton University Press, New Jersey.
32. Læssø, T. / Petersen, H. (2019). **Fungi of Temperate Europe, Volume 2**. Princeton University Press, New Jersey.
33. Kibby, G. (2020). **Mushrooms and toadstools of Britain and Europe Volume 2, Agarics - Part 1**. Geoffrey Kibby (privately published).
34. **Gozdarski vestnik**. (teme o gobah)
35. **Vodič – Razstava svežih gob**. (1985): Brošura. Gobarska družina Maribor, Maribor
36. **Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot**. (Ur.l. RS, št. 111/04, 70/06).

37. **Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.** (Ur.l. RS, št. 82/02).
38. **Uredba o varstvu samoniklih gliv.** (Ur.l. RS, št. 57/98).
39. **Uredba o zavarovanih prostoživečih vrstah gliv.** (UL RS št. 58/2011).
40. **Uredba o ekološko pomembnih območjih.** (Ur.l. RS, št. 48/04).
41. **Uredba o posebnih varstvenih območjih** (območjih Natura 2000). (Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08).
42. **Zakon o ohranjanju narave.** (Ur.L. RS, št. 96/04).
43. **Zakon o gozdovih.** (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON in 67/02).
44. Rivore, B. (2020). **Polypores de France et d'Europe.** Brailly SAS, Saint Genis Laval.
45. Podatkovna baza Index fungorum, www.indexfungorum.org
46. Spletna stran IUCN, <https://www.iucnredlist.org/search?query=fungi&searchType=species>
47. Spletna stran Boletus informaticus, www.boletusinformaticus.si
48. Spletna stran Gobarskega društva Lisička Maribor, www.gobe.si
49. Spletna stran Gobe na Bovškem, www.gobenabovskem.si
50. Facebook stran Gobarskega društva Novo Mesto, www.facebook.com/gobarsko.drustvo.novomesto
51. **Fotografije gliv iz drugih spletnih virov:**
 - Agaricus placomyces*, www.inaturalist.org
 - Agaricus semotus*, www.gribi.net.ua
 - Boletus badiorufus*, www.aranzadi.eus
 - Botryobasidium aureum*, www.nahuby.sk
 - Byssomerulius corium*, www.gdnm.si
 - Calonarius dibaphus*, www.gbif.org
 - Calonarius elegantissimus*, www.commonswikimedia.org
 - Chroogomphus helveticus*, www.fundkorb.de
 - Cortinarius betulinus*, www.inaturalist.nz

Dendrothele acerina, www.myko.cz
Diatrype decorticata, www.gbif.org
Galerina sphagnum, www.website.nbm-mnb
Ganoderma pfeifferi, www.freenatureimages.eu
Hebeloma ochroalbidum, www.ambmuggia.it
Heterobasidion annosum, www.sl.wikipedia.org
Inocybe assimilata, www.ro.wikipedia.org/wiki
Inocybe asterospora, www.flickr.com
Inocybe corydalina, www.stridvall.se
Inocybe napipes, www.stridvall.se
Inocybe obscurobadia, www.funghiitaliani.it
Inonotus cuticularis, www.gdnm.si
Inosperma erubescens, www.gobenabovskem.si
Jackrogersella cohaerens, www.lostcoastoutpost.com
Lactarius rufus, www.marn.at
Lentinellus flabelliformis, www.mykologie.net
Lepiota forquignonii, www.aranzadi.eus
Lepiota helveola, www.antropocene.it
Leucoagaricus subcretaceus, www.lavalledelmetauro.it
Muscinipta laevis, www.uk.inaturalist.org
Mycena urania, www.mycena.no
Oxyporus corticola, www.grzyby.pl
Propolis farinosa, www.biolib.cz
Russula cuprea, www.uk.inaturalist.org
Russula roseipes, www.flickr.com
Russula veternosa, www.ambpesaro.it
Scleroderma cepa, www.mykoweb.com
Scutellinia minor, www.ascomycete.org
Scutellinia trechispora, www.ohoubach.cz