



KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA V MESTNI OBČINI MARIBOR IN SOSEDNIH OBČINAH V LETU 2025



Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH ne sme reproducirati, razen v celoti.

Maribor, avgust 2026

Naslov: Kakovost zunanjega zraka v Mestni občini Maribor in sosednjih občinah v letu 2025

Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
ODDELEK ZA ZRAK, HRUP, PVO IN AEROBIOLOGIJO
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR

Pooblastilo: pooblastilo MOP številka 35435-2/2021-3 z dne 01.06.2021, ki se za lokacijo NLZOH Maribor nanaša na ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja za žveplov dioksid, dušikove okside, delce PM₁₀, benzen, težke kovine v delcih PM₁₀ ter benzo(a)piren v delcih PM₁₀

Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000 MARIBOR

Evidenčna oznaka: 2930-09/1579-25 / 14
Ponudba: PO-2930-09/1579-26/98330 z dne 06.01.2026
Delovni nalog: Pogodba 4102-437/2022-21, PG-2930-09/1579-22/77420 z dne 03.10.2022
Aneks št. 5 (4102-437/2022-58) za leto 2025 (januar-marec) z dne 14.01.2025
Aneks št. 6 (4102-437/2022-61) za leto 2025 (april-junij) z dne 09.04.2025
Aneks št. 7 (4102-437/2022-66) za leto 2025 (julij-december) z dne 27.06.2025

Dejavnost: 2930 – Enota za kakovost zunanjega zraka

Vodja naloge: dr. Uroš Lešnik
Sodelavci: Jan Radanović, kem. tehn.
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor (analize vsebnosti benzo(a)pirena v delcih PM₁₀)

Maribor, 18.08.2026

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <https://www.nlzoh.si/istovetnost>

POVZETEK

V meritve kakovosti zunanjega zraka, ki so v letu 2025 potekale v merilni mreži Maribora in sosednjih občin, državni merilni mreži kakovosti zraka (DMKZ), ki jo upravlja Agencija RS za okolje, ter dodatne meritve iz projekta PMinter, so bila vključena naslednja onesnaževala: dušikovi oksidi (NO_x in NO_2), ozon (O_3), delci (PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$ in PM_{01}), težke kovine (Pb, Cd, Ni, As) v delcih PM_{10} , benzo(a)piren v delcih PM_{10} in črni ogljik. Dodatno so se ugotavljali še meteorološki parametri. Merilne metode, v pretežni meri referenčne, so bile usklajene z zahtevami zakonodaje in stanjem tehnike in se glede na pretekla leta niso spremenile. Izvajala so se redna zunanja in notranja preverjanja delovanja opreme, tako da je bila za skoraj vsa onesnaževala na voljo ustrezna razpoložljivost veljavnih podatkov. Zakonodaja, ki določa normativne vrednosti za varovanje zdravja ljudi kot tudi za varstvo rastlin, se ni spreminjala.

Večina onesnaževal se meri v središču mesta na merilnem mestu Center, sledita Vrbanski plato, Tezno in Krekova/Tyrševa, na ostalih merilnih mestih (Pohorje, Radvanje, Pobrežje, Ruše) se je stalno ugotavljalo po eno ali dve onesnaževali.

Koncentracije dušikovega dioksida in dušikovih oksidov na Vrbanskem platu so bile nižje kot v Centru in na Teznem in nikjer niso presegale mejnih vrednosti za varovanje zdravja ljudi oziroma kritične vrednosti za varstvo rastlin v naravnem okolju.

Vsebnost ozona v zraku z oddaljevanjem od središča mesta narašča. Ciljna vrednost (v koledarskem letu triletnega povprečja) na nobenem merilnem mestu ni bila presežena. Urne koncentracije pa niso bile tako visoke, da bi bila na katerem merilnem mestu kadarkoli presežena opozorilna ali alarmna vrednost. Koncentracije ozona se na merilnem mestu Pohorje rahlo znižujejo, tudi na Vrbanskem platu je zaznaven komaj opazen trend zniževanja vrednosti. Na Teznem je zaznaven trend zviševanja vrednosti.

Poseben problem predstavljajo delci PM_{10} , vendar tudi v letu 2025 srednja letna vrednost delcev v Centru, na Krekovi/Tyrševi, na Teznem, na Vrbanskem platu, v Radvanju, na Pobrežju ter v Rušah ni presegala mejne letne vrednosti. Število preseganj dnevne mejne vrednosti na nobenem merilnem mestu ni bilo preko dovoljenih 35. Večina preseganj je bila izmerjena pozimi. Če gledamo dolgoletne trende srednjih letnih vrednosti na merilnih mestih Center in Vrbanski plato se stanje izboljšuje.

Koncentracije delcev $\text{PM}_{2,5}$ so bile na Vrbanskem platu, v Centru in na Krekovi/Tyrševi pod mejno letno vrednostjo. Dolgoletni trend delcev $\text{PM}_{2,5}$ je usmerjen navzdol. Trend koncentracij delcev PM_{01} na merilnem mestu Krekova/Tyrševa pa je ravno tako usmerjen navzdol.

Koncentracije črnega ogljika so bile v letu 2025 nižje kot leta pred tem (2020-2024), razmerje med deležem črnega ogljika iz kurjenja lesne biomase (24 %) in iz naslova izgorevanja fosilnih goriv (76 %) se je spremenilo v prid izgorevanja fosilnih goriv.

Vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM_{10} , ki je pokazatelj za rakotvorno tveganje policikličnih aromatskih ogljikovodikov, je bila v Centru pod ciljno letno vrednostjo in pod povprečjem doslej izmerjenih vrednosti, trend pa je usmerjen navzdol. Vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM_{10} na merilnem mestu v Rušah, v Radvanju, na Pobrežju in na Teznem ni presegala ciljne letne vrednosti. Trendi vsebnosti benzo(a)pirena v delcih PM_{10} so usmerjeni navzdol na merilnih mestih Ruše, Radvanje in Tezno, rahel trend naraščanja pa je opazen na merilnem mestu Pobrežje.

Mejne in ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi že več let niso bile presežene za težke kovine (arzen, svinec, kadmij in nikelj) v delcih PM_{10} , dolgoletni trendi vseh teh onesnaževal pa so usmerjeni navzdol.

Kakovost zraka je za vsa onesnaževala razen za ozon pozimi slabša in zanjo bi lahko rekli, da k nekim bolj ali manj stalnim koncentracijam ozadja dodatno prispevajo kurilne naprave, promet, industrija in drugi lokalni viri. Pri ozonu je razlog za višje vrednosti poleti v načinu njegovega nastanka.

Na merilnem mestu Krekova/Tyrševa se je kazalo poviševanje deleža črnega ogljika iz naslova kurjenja lesne biomase v celotnem obdobju meritev 2015-2020, razen od leta 2021 naprej. V letu 2025 je bil delež kurjenja lesne biomase nekje na nivoju let 2015/2016.

Če povzamemo te ugotovitve, je na merilnih mestih opaziti navzdol usmerjene trende, kar kaže na izboljševanje kakovosti zunanjega zraka, vendar še večje izboljševanje preprečuje uporaba lesne biomase kot energenta, ki še posebej v neugodnih vremenskih situacijah povišuje koncentracije onesnaževal v zunanjem zraku (večdnevni pojavi visokih koncentracij).

V okviru projekta PMinter so bile določene prispevne stopnje lokalnih (do 35 %) in regionalnih emisij (od 50 do 65 %) na lokalne koncentracije delcev PM_{10} . S pomočjo dodatnih analiz se je določilo prispevno stopnjo cestnega prometa (do 9 %) in kurjenja lesa (do 32 %) – prispevki so seveda dnevno in sezonsko različni. Te informacije nam povejo, da za kakovost zraka v določeni točki niso krive samo lokalne emisije, kar potrjujejo tudi rože onesnaženja. Kljub temu je za učinkovito izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v Mariboru pozornost najprej potrebno usmeriti k lokalnim emisijam delcev iz naslova kurjenja lesne biomase.

Temperatura zraka na merilnem mestu Maribor Center je bila nad dolgoletnim povprečjem. Meritve zunanje temperature se izvajajo še na Vrbanskem platoju in na Teznem, rezultati kažejo skoraj stopinjo višjo srednjo letno vrednost na merilnem mestu Maribor Center, v poletnih mesecih (maj-september) pa so bile najvišje vrednosti izmerjene na Teznem.

Kakovost zunanjega zraka je najboljša zjutraj pred sončnim vzhodom, najslabša pa zvečer.

Glede na visoke izmerjene vrednosti delcev PM_{10} ter benzo(a)pirena v delcih PM_{10} v zimskem času in v luči zgornjih ugotovitev bi bilo smiselno obnoviti meritve v Miklavžu ter obseg meritev razširiti še na sosednje občine (na primer Selnica ob Dravi, Duplek) vsaj z meritvami delcev PM_{10} in po možnosti tudi z analizami vsebnosti benzo(a)pirena v delcih PM_{10} .

Prostorska razporeditev merilnih mest v Mariboru je v grobem ustrezna, saj pokriva gosto poseljeno območje središča mesta in njegovo okolico, čeprav še obstaja nekaj širših področij, ki z meritvami niso pokrita (Tabor, Studenci,...). Z začetkom leta 2020 je na Teznem začela delovati postaja za meritve kakovosti zunanjega zraka, tako da se je s tem merilna mreža razširila še na desni breg Drave (kjer avtomatske meritve že nekaj časa niso potekale), leta 2023 pa so se začele izvajati še meritve delcev PM_{10} na Pobrežju.

Glede na izmerjene koncentracije se lahko pričakuje škodljive učinke teh onesnaževal na zdravje ljudi, vendar je ob tem potrebno poudariti, da prebivalci Maribora in okolice niso izpostavljeni večjemu tveganju za zdravje zaradi slabe kakovosti zraka v primerjavi z drugimi prebivalci Slovenije v mestih ali ob prometnih cestah. Primerjave onesnaževal kažejo tudi na ravni EU trend zmanjševanja izpostavljenosti prebivalcev, iz tega razloga je tveganje iz leta v leto manjše, saj se z zniževanjem koncentracij znižuje tudi verjetnost škodljivih vplivov na zdravje. Za zagotavljanje boljše zdravstvene zaščite ljudi pred škodljivim delovanjem onesnaževal iz zraka si je potrebno prizadevati za še dodatno znižanje njihovih koncentracij. Veliko tveganje za poslabšanje kakovosti zunanjega zraka predstavljajo tudi negotove razmere, povezane s podražitvami energentov (plin, kurilno olje, elektrika) saj se lahko namesto njih pričakuje povečanje uporabe lesne biomase (drv).

KAZALO

	Stran
POVZETEK	3
KAZALO	5
1 UVOD.....	6
2 STALNA MERILNA MESTA IN TRAJANJE MERITEV.....	8
3 METODOLOGIJA.....	13
3.1 MERILNA MREŽA MARIBORA IN SOSEDNJIH OBČIN.....	13
3.1.1 DUŠIKOV DIOKSID IN DUŠIKOVI OKSIDI.....	13
3.1.2 OZON.....	13
3.1.3 DELCI PM ₁₀ (NEREFERENČNA METODA-TEOM).....	13
3.1.4 DELCI PM ₁₀ (REFERENČNA METODA).....	13
3.1.5 ANALIZE VSEBNOSTI BENZO(A)PIRENA V DELCI PM ₁₀	13
3.2 PM _{inter} , MERILNO MESTO KREKOVA/TYRŠEVA.....	14
3.2.1 DELCI PM ₁₀ , PM _{2,5} in PM ₀₁ (GRIMM).....	14
3.2.2 ČRNI OGLJIK BC (AETHALOMETER).....	14
4 ZAKONSKI OKVIR.....	15
5 REZULTATI MERITEV.....	20
5.1 DUŠIKOVI OKSIDI.....	21
5.1.1 Dušikov dioksid.....	21
5.1.2 Dušikovi oksidi.....	25
5.2 OZON.....	30
5.3 DELCI IN ANALIZE.....	39
5.3.1 Delci PM ₁₀	39
5.3.2 Delci PM _{2,5}	49
5.3.3 Delci PM ₀₁	56
5.3.4 Analize delcev PM ₁₀	60
5.4 BENZEN.....	67
5.5 ČRNI OGLJIK.....	70
5.6 METEOROLOŠKI PARAMETRI.....	74
5.6.1 Temperatura zraka.....	74
5.6.2 Smer in hitrost vetra.....	76
5.6.3 Rože onesnaženja zunanjega zraka.....	77
6 ZNAČILNOSTI.....	79
6.1 MOŽNI VPLIVI KAKOVOSTI ZRAKA NA ZDRAVJE LJUDI.....	79
7 SKLEPNE UGOTOVITVE.....	82
8 LITERATURA IN VIRI.....	89

1 UVOD

Meritve so najzanesljivejši pokazatelj stanja kakovosti zunanjega zraka na določenem območju. V Mariboru in okolici kvalitetne meritve potekajo že od leta 1978, z leti so se razvijale in dopolnjevale in v letu 2025 dosegle stanje, prikazano v tem poročilu.

Mestna občina Maribor (MOM), ki je v skladu z veljavno zakonodajo uvrščena v aglomeracijo, zagotavlja skupaj z nekaterimi sosednjimi občinami podrobnejši monitoring stanja okolja z meritvami kakovosti zunanjega zraka. Ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka je stalna naloga, ki poteka v obsegu, dogovorjenem s pogodbami z MOM ter občino Ruše v okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin. Agencija RS za okolje (ARSO) iz Ljubljane izvaja ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka v Mariboru v okviru državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka (DMKZ). Nadaljevale so se tudi meritve, ki so bile vzpostavljene v okviru projekta PMinter¹. Poročilo o kakovosti zunanjega zraka v mestni občini Maribor in sosednjih občinah vključuje vse rezultate meritev v merilni mreži Maribora in sosednjih občin, državni merilni mreži ter dodatnih meritev iz projekta PMinter v letu 2025.

Osnovno merilno mesto za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka v merilni mreži Maribora in sosednjih občin je bilo v letu 2020 novo vzpostavljeno merilno mesto Tezno (avtomatska postaja z večjim naborom merjenih onesnaževal tudi na desnem bregu Drave). Dodatna merilna mesta za MOM so bila Radvanje, Pobrežje in Pohorje, v sosednjih občinah pa Ruše. Meritve v državni merilni mreži so potekale v Centru in na Vrbskem platoju, iz projekta PMinter pa na merilnem mestu Krekova/Tyrševa. Meritve za določitev ravni onesnaževal se izvajajo na stalnih merilnih mestih bodisi neprekinjeno bodisi z naključnim vzorčenjem, služijo pa tudi za pridobitev podatkov o prostorski razporeditvi kakovosti zunanjega zraka.

Obseg meritev v merilni mreži Maribora in sosednjih občin se v letu 2025 glede na leto 2024 ni spremenil.

V letu 2025 so se izvajale meritve onesnaževal, na katere se v skladu z zakonodajo nanaša ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, meteoroloških parametrov in nekaterih dodatnih onesnaževal, na naslednjih lokacijah:

- dušikov dioksid NO₂, dušikovi oksidi NO_x, ozon O₃, delci PM₁₀ in PM_{2,5}, temperatura zunanjega zraka ter smer in hitrost vetra na Vrbskem platoju,
- dušikov dioksid NO₂, dušikovi oksidi NO_x, ozon O₃, delci PM₁₀, benzo(a)piren v delcih PM₁₀ ter temperatura zunanjega zraka na Teznem,
- ozon O₃ na Pohorju,
- delci PM₁₀ v Rušah, benzo(a)piren v delcih PM₁₀,
- delci PM₁₀ v Radvanju, benzo(a)piren v delcih PM₁₀,
- delci PM₁₀ na Pobrežju, benzo(a)piren v delcih PM₁₀,
- NO₂, NO_x, delci PM₁₀, benzen, benzo(a)piren (b(a)p) in težke kovine (TK) v delcih PM₁₀ ter meteorološki parametri (od katerih navajamo le temperaturo zunanjega zraka) v Centru,
- delci PM₁₀, PM_{2,5} in PM₀₁ ter črni ogljik (BC) na Krekova/Tyrševa (PMinter).

¹ PMinter: Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko – avstrijskem obmejnem prostoru. Podrobnosti o tem projektu so dosegljive na spletni strani projekta <http://www.pminter.eu>.

Vsa oprema za meritve onesnaževal, ki jih zahteva naša zakonodaja, je v merilni mreži Maribora in sosednjih občin ter v državni merilni mreži usklajena z referenčno metodo (navedeno velja tudi za analize v laboratoriju). V Centru, na Vrbanskem platoju in na Teznem so potekale meritve delcev PM₁₀ istočasno z avtomatsko nereferenčno in referenčno merilno metodo. Prve so namenjene obveščanju javnosti o sprotnih (urnih in dnevnih) podatkih o ravni koncentracij. Vsi rezultati v tem poročilu se nanašajo na meritve delcev PM₁₀ z referenčnim merilnikom, le dnevni hodi so iz avtomatskih meritev.

V poročilu so zbrane podrobnosti in končni rezultati o vseh izvedenih meritvah. Vse posamezne izmerjene koncentracije so bile ponovno pregledane in preračunane, tako da so v nadaljevanju vsi podatki in rezultati uradni ter nadomeščajo podatke iz mesečnih poročil. Podrobnejši rezultati meritev iz merilne mreže Maribora in sosednjih občin ter projekta PMinter so bili dostavljeni naročnikom v mesečnih poročilih. V tem poročilu so zbrani in obdelani tudi ostali rezultati analiz iz državne mreže, ki jih v mesečnih poročilih ni bilo. Vse rezultate meritev iz državne merilne mreže so obdelali na ARSO in za njih tudi jamčijo. Podrobnosti o meritvah v državni merilni mreži so na voljo tudi v rednih mesečnih in letnem poročilu ARSO.

2 STALNA MERILNA MESTA IN TRAJANJE MERITEV

Podatki o stalnih merilnih mestih so v tabeli 2.1, prostorsko je njihova lega prikazana na sliki 2.1. Podatki o merilnih mestih glede na tip mesta in območja, njihovo značilnost in geografski opis so v tabeli 2.2.

Tabela 2.1: Stalna merilna mesta: lokacija in parametri

Merilno mesto - naslov	Višina nad morjem in tlemi (m)	GKY (D48) GKX (D48)	ETRS89 X ETRS89 Y	Parametri
Maribor, Center – Titova cesta	266 + 4,0	550305 157414	549936 157900	NO _x , NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , benzen, TK in b(a)p v PM ₁₀ , T
Maribor, Vrbanski plato	280 + 4,0	548367 158452	547997 158937	O ₃ , NO _x , NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5}
Maribor, Vrbanski plato (samodejna meteorološka postaja)	279 + 2/10	548375 158404	548006 158889	T, smer in hitrost vetra
Maribor, Tezno	268 + 4	552539 154068	552169 154554	NO _x , NO ₂ , O ₃ , PM ₁₀ , b(a)p v PM ₁₀ , T
Pohorje – Belvi	1043 + 2,5	544804 152582	544434 153067	O ₃
Maribor, Radvanje – Grizoldova 3	302 + 1,5	546626 154912	546257 155397	PM ₁₀ , b(a)p v PM ₁₀
Maribor, Pobrežje – Ulica Štravhovich 50	261 + 2	552085 156771	551715 157256	PM ₁₀ , b(a)p v PM ₁₀
Ruše, Mariborska cesta 3	302 + 1,5	539870 155217	539501 155702	PM ₁₀ , b(a)p v PM ₁₀
Maribor, Krekova/Tyrševa	273 + 2,5	549921 157753	549552 158238	PM ₁₀ , PM _{2,5} , PM ₀₁ , črni ogljik (BC)


T – temperatura zunanjega zraka

Tabela 2.2: Stalna merilna mesta: tip, značilnost in opis

Merilno mesto	Tip mesta	Tip območja	Značilnost območja	Geografski opis
Center	T	U	RC	16
Vrbanski plato	B	U	R	16
Tezno	B	U	R	16
Pohorje – Belvi	B	R	N	32
Maribor, Radvanje	B	U	R	16
Maribor, Pobrežje	B	U	R	16
Ruše	B	R	RC	16
Krekova/Tyrševa	T	U	RC	16

Legenda k tabeli 2.2:

Tip mesta:	B – ozadje T – promet	Tip območja:	U – mestno S – predmestno R – podeželsko
Značilnost območja:	R – stanovanjsko C – poslovno I – industrijsko A – kmetijsko N – naravno	Geografski opis:	1 - gorsko 16 - ravnina 32 - razgibano



Slika 2.1: Stalna merilna mesta za spremljanje kakovosti zunanjega zraka v letu 2025

Na fotografijah 2.1 do 2.8 so prikazana stalna merilna mesta (lokacija merilne opreme je na nekaterih fotografijah označena z belo puščico).



Fotografija 2.1: Merilno mesto Center



Fotografija 2.2: Merilno mesto Vrbanski plato



Fotografija 2.3: Merilno mesto Tezno




Fotografija 2.4: Merilno mesto Pohorje - Belvi



Fotografija 2.5: Merilno mesto Radvanje



Fotografija 2.6: Merilno mesto Ruše



Fotografija 2.7: Merilno mesto Krekova/Tyrševa v Mariboru



Fotografija 2.8: Merilno mesto Pobrežje

Pregled obsega in trajanja meritev na posameznih stalnih merilnih mestih, ki je predstavljen v tem poročilu, je v tabeli 2.3. Krepko označeni parametri sodijo v državno merilno mrežo ARSO. Modro obarvana polja pomenijo, da so meritve v tistem mesecu potekale.

Tabela 2.3: Merilna mesta: parametri in trajanje meritev v letu 2025

Merilno mesto	Parameter	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
CENTER	NO ₂ , NO _x												
	PM ₁₀ (ref)												
	PM ₁₀ , PM _{2,5} (neref)												
	Benzen												
	b(a)p in TK v PM ₁₀												
VRBANSKI PLATO	T												
	NO _x , NO ₂												
	O ₃												
	PM ₁₀ , PM _{2,5} (neref)												
	PM ₁₀ (ref)												
TEZNO	PM _{2,5} (ref)												
	NO _x , NO ₂ , O ₃												
	PM ₁₀ (neref, ref), b(a)p v PM ₁₀												
POHORJE-BELVI	T												
	O ₃												
RUŠE	PM ₁₀ , b(a)p v PM ₁₀												
RADVANJE	PM ₁₀ , b(a)p v PM ₁₀												
POBREŽJE	PM ₁₀ , b(a)p v PM ₁₀												
KREKOVA/ TYRŠEVA	PM ₁₀ , PM _{2,5} , PM ₀₁ (neref), BC, T												

T – temperatura zunanjega zraka

3 METODOLOGIJA

Onesnaževala NO_x , NO_2 , O_3 in delci se določajo s posebno merilno opremo, katere rezultati so koncentracije v realnem času (avtomatske meritve).

Referenčne meritve delcev PM_{10} potekajo 24 ur, rezultati so dnevne koncentracije, ki so na voljo šele po tehtanju vzorčenih filtrov, kar je lahko tudi več kot 14 dni po vzorčenju. Za določitev benzo(a)pirena v delcih PM_{10} so potrebne kombinacije vzorčevalnih in analitskih metod; rezultati so znani šele po zaključku analiz. Meritve delcev PM_{10} in $\text{PM}_{2,5}$ pa potekajo še z nereferenčno metodo, katere rezultat so urne koncentracije onesnaževal. Te so namenjene ažurnemu obveščanju javnosti.

Vzpostavljena je daljinska povezava z merilniki zaradi nadzora njihovega delovanja ter hitrejšega in zanesljivejšega dostopa do podatkov za njihov prikaz na spletni strani MOM, služi pa tudi dnevni preverjanju delovanja merilnikov.

Rezultati avtomatskih meritev v minuti ločljivosti so po osnovnem preverjanju njihove ustreznosti in tvorjenju povprečnih vrednosti shranjeni v bazi ter na voljo za prenos (in s tem za prikaz na spletni strani MOM). Za potrebe mesečnih in letnih poročil se podatki še dodatno preverijo, nato se preračunajo urne, dnevne in letne koncentracije. Te se potem primerja z zakonodajno predpisanimi mejnimi vrednostmi.

3.1 MERILNA MREŽA MARIBORA IN SOSEDNIJH OBČIN

3.1.1 DUŠIKOV DIOKSID IN DUŠIKOVI OKSIDI

$\text{NO-NO}_2\text{-NO}_x$ analizator Thermo Scientific, model 42i, deluje na principu kemiluminiscence. Uporabljena metoda je referenčna in opisana v standardu *SIST EN 14211*.

3.1.2 OZON

UV absorpcijski analizator ozona neprekinjeno analizira vsebnost O_3 v zraku. Delovanje bazira na UV absorpciji. Uporabljena metoda je referenčna in opisana v standardu *SIST EN 14625*.

3.1.3 DELCI PM_{10} (NEREFERENČNA METODA-TEOM)

Za meritve koncentracij delcev v zraku z avtomatsko merilno metodo je uporabljen merilnik TEOM 1400a, ki deluje na principu mikrotehtanja. Merilnik ima dokazano skladnost z referenčno metodo.

3.1.4 DELCI PM_{10} (REFERENČNA METODA)

Delce PM_{10} vzorči vzorčevalnik z nizkim volumskim pretokom (LVS). Velikost vzorčenih delcev je odvisna od vzorčevalne glave, ki spusti v merilnik samo velikostno frakcijo delcev PM_{10} . Uporabljamo merilnike proizvajalcev Leckel (SEQ 47/50). Uporabljena metoda je referenčna in opisana v standardu *SIST EN 12341*.

3.1.5 ANALIZE VSEBNOSTI BENZO(A)PIRENA V DELCI PM_{10}

Referenčna metoda za vzorčenje policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zunanjem zraku je tista, ki je opisana v *SIST EN 12341* Zunanji zrak – standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM_{10} ali $\text{PM}_{2,5}$. Analiza pa poteka v skladu s *SIST EN 15549:2008*.

3.2 PM_{inter}, MERILNO MESTO KREKOVA/TYRŠEVA

3.2.1 DELCI PM₁₀, PM_{2,5} in PM₀₁ (GRIMM)

Merilnik določa koncentracije delcev PM₁₀, PM_{2,5} in PM₀₁ v realnem času na principu sipanja svetlobe in štetja delcev v vzorcu, ki se zajema skozi cev za vzorec. Na podlagi rezultatov se prašni delci razdelijo v kategorije in s tem določijo zahtevane frakcije delcev (PM₁₀, PM_{2,5} in PM₀₁). Merilnik ima dokazano skladnost z referenčno metodo.

3.2.2 ČRNI OGLJIK BC (AETHALOMETER)

Črni ogljik sicer zakonsko ni reguliran, vendar zadnje raziskave kažejo njegov vpliv na podnebne spremembe in zdravstvene težave pri prodiranju v pljuča. Za imenom se sicer skriva nekaj na prvi pogled bolj nedolžnega in bolj domačega – saje. Saje nastajajo pri nepopolnem izgorevanju goriv z vsebnostjo ogljika, torej predvsem fosilnih goriv in lesa. Po nekaterih raziskavah predstavlja črni ogljik približno polovico dizelskega izpuha, v bližini prometnih cest lahko predstavlja tudi do polovico trdnih delcev v zraku. Vpliv črnega ogljika je zaznaven tudi stran od prometnih cest, predvsem zaradi kurjenja lesa v individualnih kurilnih napravah. Na podlagi meritev črnega ogljika in absorpcije pri različnih valovnih dolžinah je možno določiti kolikšen delež črnega ogljika prihaja iz naslova fosilnih goriv oziroma kurjenja lesne biomase.

4 ZAKONSKI OKVIR

Za meritve kakovosti zraka in oceno koncentracij posameznih onesnaževal v zraku v tem poročilu veljajo:

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur. l. RS št. 9/11, 8/15, 66/18, 44/22
- Uredba o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku, Ur. l. RS št. 56/06, 44/22
- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, Ur. l. RS št. 55/11, 6/15, 5/17, 44/22
- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka, Ur. l. RS št. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22, 30/23

Mejne in ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi so za vsa onesnaževala v tabeli 4.1.

Tabela 4.1: Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi

Onesnaževalo	Enota	Urna		Dnevna		Letna
		Mejna	ŠT	Mejna	ŠT	Mejna
žveplov dioksid	µg/m ³	350	24	125	3	
dušikov dioksid	µg/m ³	200	18			40
ozon	µg/m ³	120**	25***			
delci PM ₁₀	µg/m ³			50	35	40
delci PM _{2,5}	µg/m ³					20
benzen	µg/m ³					5
ogljikov monoksid	mg/m ³	10*				
benzo(a)piren v PM ₁₀	ng/m ³					1**
svinec v PM ₁₀	µg/m ³					0,5
arzen v PM ₁₀	ng/m ³					6**
kadmij v PM ₁₀	ng/m ³					5**
nikelj v PM ₁₀	ng/m ³					20**

ŠT dovoljeno število preseganj v koledarskem letu

* osemurna mejna vrednost

** ciljna vrednost (pri ozonu največja dnevna osemurna srednja vrednost)

*** v koledarskem letu triletnega povprečja

Kadar se za oceno zahteve mejne vrednosti za PM₁₀ uporabi naključno vzorčenje, je treba oceniti 90,4 percentilno vrednost namesto števila preseganj, na katerega znatno vpliva pokritost podatkov. Za skladnost z mejno vrednostjo mora biti 90,4 percentilna vrednost nižja ali enaka mejni dnevni vrednosti 50 µg/m³.

Občasno na ravni delcev PM₁₀ vpliva vdor saharskega prahu nad naše kraje. V primeru kadar so preseganja delno ali v celoti posledica prispevka naravnih virov, se pri ocenjevanju skladnosti ta preseganja ne upoštevajo in se odštejejo od letnega števila dni z izmerjeno preseženo mejno vrednostjo. Če prispevek le tega povzroči preseganje, se preseganje na ta dan pripiše naravnemu viru in se ne šteje v kvoto dovoljenih 35 preseganj v letu.

Kritični vrednosti za varstvo rastlin za žveplov dioksid in dušikove okside sta v tabeli 4.2. Oceno tveganj za rastlinstvo in naravne ekosisteme zaradi onesnaženosti zraka in skladnosti s kritičnimi vrednostmi se izvaja na krajih zunaj pozidanih območij.

Tabela 4.2: Kritični vrednosti za varstvo rastlin

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Kritična vrednost
dušikovi oksidi	koledarsko leto	30 µg/m ³
žveplov dioksid	koledarsko leto in zima	20 µg/m ³

Ciljna vrednost za varstvo rastlin za ozon kot povprečje v obdobju petih let, ki se uporablja od 1. januarja 2010, je v tabeli 4.3.

Tabela 4.3: Ciljna vrednost za varstvo rastlin

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Ciljna vrednost
ozon*	od maja do julija	18.000 (µg/m ³).h

* AOT40 se izračuna kot vsota razlike med izmerjenimi urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m³, in vrednostjo 80 µg/m³, izmerjenih vsak dan med 8:00 in 20:00 uro.

Opozorilna in alarmna vrednost za ozon sta v tabeli 4.4.

Tabela 4.4: Opozorilna in alarmna vrednost za ozon

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Opozorilna oz. alarmna vrednost
ozon – opozorilna vrednost	1 ura	180 µg/m ³
ozon – alarmna vrednost	1 ura (tri zaporedne ure)	240 µg/m ³

Alarmni vrednosti za žveplov in dušikov dioksid sta v tabeli 4.5.

Tabela 4.5: Alarmni vrednosti za žveplov in dušikov dioksid

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Alarmna vrednost
žveplov dioksid	3 zaporedne ure	500 µg/m ³
dušikov dioksid	3 zaporedne ure	400 µg/m ³

Vrednosti zgornjega in spodnjega ocenjevalnega praga, ki so določene v odstotku mejne oziroma ciljne vrednosti, za onesnaževala, ki so obravnavana v tem poročilu, so v tabelah 4.6 in 4.7. Preseganje zgornjega in spodnjega ocenjevalnega praga je treba določiti na podlagi koncentracij v preteklih petih letih, kadar je na voljo dovolj podatkov. Šteje se, da je ocenjevalni prag presežen, kadar je bil presežen vsaj v treh posameznih letih iz obdobja petih let. Za ozon ocenjevalna pragova nista predpisana.

Tabela 4.6: Vrednosti zgornjega ocenjevalnega praga

Onesnaževalo	Enota	Urna	Urna	Dnevna	Dnevna	Letna
		Mejna	ŠT	Mejna	ŠT	Mejna
žveplov dioksid	µg/m ³	-	-	75	3	12
dušikov dioksid	µg/m ³	140	18	-	-	32
dušikovi oksidi	µg/m ³	-	-	-	-	24
delci PM ₁₀	µg/m ³	-	-	35	35	28
delci PM _{2,5}	µg/m ³	-	-	-	-	17
ogljikov monoksid	mg/m ³	7*	-	-	-	-
benzen	µg/m ³	-	-	-	-	3,5
svinec v PM ₁₀	ng/m ³	-	-	-	-	350
kadmij v PM ₁₀	ng/m ³	-	-	-	-	3,0
arzen v PM ₁₀	ng/m ³	-	-	-	-	3,6
nikelj v PM ₁₀	ng/m ³	-	-	-	-	14
benzo(a)piren v PM ₁₀	ng/m ³	-	-	-	-	0,6

* osemurna mejna vrednost

Tabela 4.7: Vrednosti spodnjega ocenjevalnega praga

Onesnaževalo	Enota	Urna	Urna	Dnevna	Dnevna	Letna
		Mejna	ŠT	Mejna	ŠT	Mejna
žveplov dioksid	µg/m ³	-	-	50	3	8
dušikov dioksid	µg/m ³	100	18	-	-	26
dušikovi oksidi	µg/m ³	-	-	-	-	19,5
delci PM ₁₀	µg/m ³	-	-	25	35	20
delci PM _{2,5}	µg/m ³	-	-	-	-	12
ogljikov monoksid	mg/m ³	5*	-	-	-	-
benzen	µg/m ³	-	-	-	-	2,0
svinec v PM ₁₀	ng/m ³	-	-	-	-	250
kadmij v PM ₁₀	ng/m ³	-	-	-	-	2,0
arzen v PM ₁₀	ng/m ³	-	-	-	-	2,4
nikelj v PM ₁₀	ng/m ³	-	-	-	-	10
benzo(a)piren v PM ₁₀	ng/m ³	-	-	-	-	0,4

* osemurna mejna vrednost

Meritve na stalnem merilnem mestu se izvajajo neprekinjeno ali z naključnim vzorčenjem, za določitev ravni onesnaževal v skladu s cilji kakovosti podatkov, ki jih določa pravilnik. Najmanjša časovna pokritost za meritve na stalnem merilnem mestu za večino onesnaževal ni določena, saj so to v osnovi neprekinjene meritve, le za benzo(a)piren je 33 %, za arzen, kadmij in nikelj pa 50 %. Za indikativne meritve (meritve, ki se izvajajo manj pogosto, vendar izpolnjujejo druge cilje glede kakovosti podatkov) je najmanjša časovna pokritost za vsa onesnaževala 14 %, enakomerno razporejeno preko koledarskega leta. Lahko se izvaja naključno vzorčenje, ki se uporabi namesto neprekinjenih meritev, če se dokaže, da negotovost pri meritvah, vključno z negotovostjo pri meritvah zaradi naključnega vzorčenja, izpolnjuje cilj kakovosti 25 % in je časovna pokritost še vedno večja od najmanjše časovne pokritosti za indikativne meritve (14 %). Naključno vzorčenje mora biti enakomerno porazdeljeno čez vse leto, da ne pride do nesimetričnosti rezultatov.

Praktično v vseh primerih meritev in za vsa onesnaževala je zahtevana najmanjša razpoložljivost podatkov 90 %, le za ozon ter z njim povezan NO_2 je 90 % poleti in 75 % pozimi. V primeru, da rezultati ne dosegajo najmanjše razpoložljivosti, so informativne narave in niso reprezentativni za celotno leto. Kjer so ti rezultati enakomerno razporejeni preko koledarskega leta, jih kljub temu uporabimo za primerjavo z normativnimi letnimi vrednostmi in pri letnih trendih.

Uredba o kakovosti zunanjega zraka zaradi ocenjevanja in upravljanja kakovosti zraka razmejuje ozemlje Republike Slovenije v območja in aglomeracije. Območji Mestne občine Maribor in občine Miklavž na Dravskem polju sta razvrščeni glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM_{10} in $\text{PM}_{2,5}$, benzen, ogljikov monoksid, benzo(a)piren, svinec, arzen, kadmij in nikelj v aglomeracijo z imenom Maribor z oznako SIM. Ostale okoliške občine Podravske statistične regije, med katere sodijo tudi Ruše, spadajo glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM_{10} in $\text{PM}_{2,5}$, benzen, ogljikov monoksid, benzo(a)piren v celinsko območje z oznako SIC, glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj pa v območje težke kovine z oznako SITK. Karta območij in aglomeracij v Republiki Sloveniji glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM_{10} in $\text{PM}_{2,5}$, benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren je na sliki 4.1, glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj pa na sliki 4.2.



Slika 4.1: Karta območij in aglomeracij v Republiki Sloveniji glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM_{10} in $\text{PM}_{2,5}$, benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren



Slika 4.2: Karta območij in aglomeracij v Republiki Sloveniji glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj

Posamezna območja in aglomeracije se razvrstijo v I. ali II. stopnjo onesnaženosti zraka:

- I. stopnja onesnaženosti zraka se za območje in aglomeracijo določi, če raven onesnaževala presega mejne ali ciljne vrednosti ali če obstaja tveganje, da bo raven onesnaževala presegla alarmno vrednost
- II. stopnja onesnaženosti zraka se za območje in aglomeracijo določi, če raven onesnaževala ne presega mejne ali ciljne vrednosti.

V letu 2017 je pričela veljati *Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka*, Ur. l. RS št. 38/17 z dopolnitvami 3/20, 152/20, 203/21, 44/22, 30/23. Glede na mejne vrednosti je za aglomeracijo SIM ter za območje SIC za vsa onesnaževala določena II. stopnja onesnaženosti zraka (razen za delce PM₁₀ za območje SIM). Glede na ciljne vrednosti je za aglomeracijo SIM in območje SIC določena I. stopnja onesnaženosti zraka zaradi ozona, ki je nad ciljno vrednostjo, za ostala onesnaževala pa II. stopnja.

V začetku marca 2022 je bil ukinjen Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor (Ur. l. RS 160/20). V omenjenem odloku je bila aglomeracija Maribor razvrščena v I. stopnjo onesnaženosti zraka zaradi delcev PM₁₀.

S 01.04.2023 je prenehal veljati Odlok o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS 67/18, 2/20, 160/20, 203/21, 33/23). V njem so bila določena podobmočja glede obremenjenosti zraka zaradi onesnaženosti z delci PM₁₀ na podlagi ocene o kakovosti zunanjega zraka in ocene o obsegu območja za učinkovito izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Oktobra 2024 je bila sprejeta nova direktiva o kakovosti zunanjega zraka (velja od 10.12.2024), ki je zaostrila trenutno predpisane mejne vrednosti /33/, /34/, /35/.

5 REZULTATI MERITEV

Podrobnejši rezultati meritev na stalnih merilnih mestih v merilni mreži Maribora in sosednjih občin, iz projekta PMinter in v državni merilni mreži so bili predstavljeni v mesečnih poročilih. V nadaljevanju tega poročila rezultati niso več ločeni glede na merilno mrežo. Vse posamezne izmerjene koncentracije so bile ponovno pregledane in preračunane, tako da so v nadaljevanju vsi podatki in rezultati uradni ter nadomeščajo podatke iz mesečnih poročil. V tem poglavju navajamo povprečne letne koncentracije onesnaževal in meteoroloških parametrov, povprečne in najvišje koncentracije za posamezna merilna obdobja, kratkotrajne koncentracije, število preseganj in druge vrednosti v primerjavi z normativnimi vrednostmi. Rezultati meritev na stalnih merilnih mestih so pridobljeni iz urnih podatkov (razen pri referenčnih meritvah delcev PM_{10}). V tabelah navajamo tudi razpoložljivost podatkov za izračun ustreznih vrednosti, ki jo lahko primerjamo z najmanjšo zahtevano razpoložljivostjo po pravilniku, ki znaša za večino onesnaževal 90 %, le za ozon ter z njim povezan NO_2 je 90 % poleti in 75 % pozimi. Zahtevana časovna pokritost je za benzo(a)piren okrog 33% ter kovine v delcih PM_{10} okrog 25 %.

Referenčne meritve delcev in njihove analize so dale dnevne koncentracije (od 0:00 do 24:00 tekočega dne). Rezultati v posameznih tabelah, osenčeni z zeleno barvo, pomenijo, da ni preseganja normativne vrednosti, osenčeni z rdečo pa pomenijo neskladnost. Poudarjena številka v tabeli pomeni preseganje predpisane kratkotrajne mejne vrednosti, kjer pa je za končno oceno merodajno le skupno število preseganj. »Zima« se nanaša na mesece januar, februar, marec ter oktober, november in december v tekočem letu, »Poletje« predstavlja toplo polovico leta, to je za mesece od aprila do septembra. Rezultate iz državne merilne mreže so posredovali iz Agencije RS za okolje, kjer so jih tudi obdelali in zanje odgovarjajo.

Neprekinjene meritve v daljšem časovnem obdobju omogočajo spremljanje značilnih potekov kakovosti zraka v posameznih dnevih, mesecih, letnih časih ter ugotavljanje dolgotrajnih značilnosti kakovosti zraka, kar imenujemo tudi hodi. Prikaz urne, dnevne ali mesečne časovne odvisnosti koncentracij v obliki hodov, ki ima običajno za posamezno onesnaževalo značilen potek, odraža dinamiko onesnaževanja zraka in nakazuje na možne vire. Dnevni hodi, za katere so uporabljena drseča dvourna povprečja, so izdelani za vsa onesnaževala, ki se ugotavljajo neprekinjeno.

Prav tako je v nadaljevanju tabelarično in na slikah prikazano stanje kakovosti zraka z merjenimi onesnaževali v celotnem dosedanjem merilnem obdobju, kjer je poudarjen tudi linearen trend srednjih letnih koncentracij. Iz teh podatkov lahko sklepamo o uspešnosti ukrepov za izboljšanje stanja oziroma drugih aktivnostih v mestu in okolici na področju cestne prometne infrastrukture, daljinskih sistemov, prostorskega načrtovanja in drugega.

Meritve kakovosti zraka so potekale v okviru državne merilne mreže, projekta PMinter in v okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin. Primerjava hodov istih onesnaževal iz različnih merilnih mest nakazuje na prostorsko razporeditev kakovosti zunanjega zraka.

5.1 DUŠIKOVI OKSIDI

5.1.1 Dušikov dioksid

Meritve kakovosti zunanjega zraka z dušikvim dioksidom v Centru potekajo od leta 1992, na Vrbanskem platoju od leta 2011 (s spremembo merilnega mesta leta 2020), na Tezno od leta 2020. Rezultati meritev za leto 2025 so v tabeli 5.1.

Tabela 5.1: Kakovost zunanjega zraka z NO₂ - *merilna mesta Center, Vrbanski plato in Tezno*


Količina	Center (µg/m ³)	Vrbanski plato (µg/m ³)	Tezno (µg/m ³)	Mejna vrednost (µg/m ³)
Razpoložljivost urnih podatkov	100 %	100 %	100 %	
Letna srednja vrednost	20	7	12	40
Zima	23	10	16	
Poletje	16	4	8	
C ₁ max	112	48	86	200
Število preseganj C ₁	0	0	0	18

Mejna letna vrednost in mejna urna vrednost na nobenem merilnem mestu nista bili preseženi. V Centru so bile koncentracije višje kot na Tezno in Vrbanskem platoju.

V tabeli 5.2 so srednje mesečne vrednosti in najvišje urne koncentracije, na sliki 5.1 pa le srednje mesečne koncentracije NO₂ v pripadajočih mesecih za Center, Vrbanski plato in Tezno za leto 2025.

Tabela 5.2: Srednje mesečne in najvišje urne vrednosti NO₂ v µg/m³ v pripadajočih mesecih - *merilna mesta Center, Vrbanski plato in Tezno*


Mesec	Center		Vrbanski plato		Tezno	
	mesec	ura	mesec	ura	mesec	ura
januar	28	91	11	40	16	58
februar	26	82	10	33	19	70
marec	20	112	8	36	14	86
april	16	77	5	20	9	56
maj	16	61	4	23	8	39
junij	20	78	4	22	8	39
julij	13	64	4	16	7	36
avgust	15	64	4	25	8	48
september	18	66	5	22	8	33
oktober	20	78	7	30	13	52
november	22	74	11	39	17	64
december	23	66	15	48	17	50




Slika 5.1: Koncentracije NO₂, merilna mesta Center, Vrbski plato in Tezno

Mesečni poteki kažejo na vseh merilnih mestih podobne značilnosti z nižjimi koncentracijami poleti in višjimi v času najnižjih zunanjih temperatur. Pozimi je nastajanje ozona manj intenzivno kot poleti, kar pomeni, da se dušikov dioksid za tvorbo ozona ne porablja. Razen tega so emisije pozimi višje, saj obratujejo še kurilne naprave.


Dnevni hodi koncentracij NO₂ v Centru poleti, pozimi in skozi celotno leto 2025 so na sliki 5.2, na Vrbskem platoju na sliki 5.3, na Teznem pa na sliki 5.4.



Slika 5.2: Dnevni hodi dušikovega dioksida, merilno mesto Center



Slika 5.3: Dnevni hodi dušikovega dioksida, *merilno mesto Vrbanski plato*




Slika 5.4: Dnevni hodi dušikovega dioksida, *merilno mesto Tezno*

Vključevanje NO₂ v nastanek in razpad ozona je razvidno tudi iz dnevnih hodov. V zgodnjem jutranjem času so koncentracije nizke, saj so viri malo aktivni, to onesnaževalo pa je vpleteno tudi v razpad ozona, kar je še posebej opazno poleti. Naraščanje v jutranjem času je posledica svežih emisij iz vplivnih virov (promet, kurilne naprave), ki se hitro po sončnem vzhodu prekine zaradi vključevanja v nastanek ozona.


Jutranji vrh je v Centru nižji, v poletnem času neizrazit. Koncentracije v Centru so preko dneva bolj ali manj stalne, proti večeru se povešajo in so najvišje v dnevu. Takrat so še vedno prisotne sveže emisije, fotokemični procesi v atmosferi pa prenehajo, saj je sončna svetloba že precej šibka. Po 20. uri se emisije znižujejo, preostali NO₂ pa se vključi v razpad ozona, zato koncentracije pričenjajo intenzivno upadati. Na Teznem in na Vrbanskem platoju imamo v zimskem in poletnem času dva vrhova (jutranji in večerni), s tem da je zimski vrh na Vrbanskem platoju manj izrazit. V zimskem in poletnem času so večerni vrhovi na obeh merilnih mestih višji kot jutranji.

Srednje letne koncentracije NO₂ v Centru v letih 1992-2025 so na sliki 5.5, na Vrbanskem platoju v letih 2011-2025 na sliki 5.6 ter na Teznem v letih 2020-2025 pa na sliki 5.7.




Slika 5.5: Dušikov dioksid 1992-2025, merilno mesto Center

Najvišje koncentracije NO₂ v Centru so bile leta 1993, nato so se postopno zniževale in v letu 2018 dosegle najnižje izmerjeno vrednost. Izmerjena koncentracija v letu 2025 je bila najnižja doslej izmerjena. Letno povprečje je že od leta 2001 pod mejno letno vrednostjo. Še vedno se opazi navzdol usmerjen trend vsebnosti dušikovega dioksida v zunanjem zraku.



Slika 5.6: Dušikov dioksid 2011-2025, merilno mesto Vrbanski plato

Izmerjena koncentracija v letu 2025 je bila pod povprečjem doslej izvedenih meritev. Trend je usmerjen navzdol.



Slika 5.7: Dušikov dioksid 2020-2025, merilno mesto Tezno

Izmerjena koncentracija v letu 2025 je bila najnižja doslej izmerjena. Trend je usmerjen navzdol.

5.1.2 Dušikovi oksidi

Meritve kakovosti zunanjega zraka z dušikovimi oksidi v Centru potekajo od leta 1997, na Vrbanskem platuju od leta 2011 (s spremembo merilnega mesta leta 2020), na Teznem od leta 2020. Rezultati meritev za leto 2025 so v tabeli 5.3.

Tabela 5.3: Kakovost zunanjega zraka z NO_x - merilna mesta Center, Vrbanski plato in Tezno


Količina	Center (µg/m³)	Vrbanski plato (µg/m³)	Tezno (µg/m³)	Kritična vrednost (µg/m³)
Razpoložljivost urnih podatkov	100 %	100 %	100 %	30
Letna srednja vrednost	40	10	22	
Zima	51	14	32	
Poletje	30	7	11	

Oceno tveganj za rastlinstvo in naravne ekosisteme zaradi onesnaženosti zraka in skladnosti s kritičnimi vrednostmi se izvaja le na krajih zunaj pozidanih območij, zato izmerjenih vrednosti v Centru in na Teznem ne ocenjujemo. Srednja letna koncentracija dušikovih oksidov je bila na Vrbanskem platuju pod kritično vrednostjo za varstvo rastlin. Koncentracije v Centru in na Teznem so precej višje kot na Vrbanskem platuju.

V tabeli 5.4 so srednje mesečne in najvišje urne koncentracije NO_x, na sliki 5.8 pa le srednje mesečne koncentracije NO_x v posameznem mesecu za merilna mesta Center, Vrbanski plato in Tezno v letu 2025.


Tabela 5.4: Srednje mesečne in najvišje urne koncentracije NO_x v µg/m³ po mesecih - *merilna mesta Center, Urbanski plato in Tezno*

Mesec	Center		Urbanski plato		Tezno	
	mesec	ura	mesec	ura	mesec	ura
januar	58	278	13	83	30	268
februar	51	206	13	87	35	268
marec	37	262	9	45	24	298
april	29	146	6	28	13	122
maj	30	236	6	28	10	96
junij	33	132	7	30	10	53
julij	23	109	6	22	10	51
avgust	25	115	7	44	11	85
september	39	206	8	37	12	121
oktober	44	231	10	99	26	167
november	52	311	16	124	36	250
december	66	434	23	110	44	375


**Slika 5.8:** Koncentracije NO_x, *merilna mesta Center, Urbanski plato in Tezno*

Srednje mesečne koncentracije NO_x kažejo značilen potek z višjimi vrednostmi pozimi, saj so nižje koncentracije poleti posledica sodelovanja pri nastanku ozona, pa tudi emisij je pozimi več. Koncentracije so precej višje v Centru in na Teznem kot na Urbanskem platuju, ki predstavlja mestno ozadje.


Dnevni hodi koncentracij NO_x v Centru poleti, pozimi in skozi celotno leto 2025 so na sliki 5.9, na Urbanskem platuju na sliki 5.10, na Teznem pa na sliki 5.11.



Slika 5.9: Dnevni hodi dušikovih oksidov, merilno mesto Center




Slika 5.10: Dnevni hodi dušikovih oksidov, merilno mesto Vrbanski plato



Slika 5.11: Dnevni hodi dušikovih oksidov, *merilno mesto Tezno*


Dnevni hodi koncentracij dušikovih oksidov so podobni hodom dušikovega dioksida, le da so jutranji vrhovi na vseh merilnih mestih višji od večernih (v poletnem času v Centru imamo v popoldanskem času dva vrhova).

Slika 5.12 prikazuje potek srednjih letnih koncentracij dušikovih oksidov, izmerjenih od leta 1997 na merilnem mestu Center, slika 5.13 od leta 2011 na Vrbanškem platoju, slika 5.14 od leta 2020 na Teznem.




Slika 5.12: Dušikovi oksidi 1997-2025, *merilno mesto Center*

Izmerjena koncentracija v letu 2025 je bila najnižja doslej izmerjena. Trend je usmerjen navzdol.



Slika 5.13: Dušikovi oksidi 2011-2025, *merilno mesto Vrbanski plato*

Leta 2025 so bile koncentracije dušikovih oksidov na Vrbanskem platoju rahlo višje kot leto pred tem. Trend je usmerjen navzdol.



Slika 5.14: Dušikovi oksidi 2020-2025, *merilno mesto Tezno*

Izmerjena koncentracija v letu 2025 je bila najnižja doslej izmerjena. Trend je usmerjen rahlo navzdol.

5.2 OZON

Meritve vsebnosti ozona v zunanjem zraku potekajo na Pohorju od leta 1999, Vrbanskem platoju od leta 2011, na Teznem pa od leta 2020. Rezultati za leto 2025 so v tabeli 5.5.

Tabela 5.5: Vsebnost O₃ v zunanjem zraku - merilna mesta Vrbanski plato, Tezno in Pohorje

Količina	Vrbanski plato (µg/m ³)	Tezno (µg/m ³)	Pohorje (µg/m ³)	Ciljna oz. opozorilna/alarmna* vrednost (µg/m ³)
Razpoložljivost urnih podatkov	100 %	97 %	96 %	
Letna srednja vrednost	54	41	71	
Poletje	72	56	81	
C ₈ max	159	124	126	120
Število preseganj C ₈ ciljne	37	4	8	
Triletno povprečje preseganj C ₈ ciljne	20	4	4	25
C ₁ max	174	129	138	180/240*
Število preseganj C ₁ opozorilne/alarmne	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
AOT40 (µg/m ³).h (maj-julij)	27667	9493	11125	
AOT40 (µg/m ³).h (2021-2025)	17941	16462	13045	18000

Koncentracije ozona (letna srednja vrednost) so bile višje na Pohorju kot na Vrbanskem platoju in Teznem. Ciljna osemurna vrednost je bila v letu 2025 presežena na Vrbanskem platoju 37 dni, na Teznem 4 dni ter na Pohorju 8 dni.


Ocenjevanje kakovosti zraka glede na ozon se izvaja s primerjavo povprečnega števila preseganj ciljne osemurne vrednosti v zadnjih treh letih z dovoljenim številom, kar ni bilo preseženo na nobenem merilnem mestu. Povprečje parametra AOT40 zadnjih petih let ne presega ciljne vrednosti za varstvo rastlin na nobenem merilnem mestu.

Meritve na Pohorju (merilno mesto na višji legi, brez emisij predhodnikov, to je onesnaževal, ki pripomorejo k nastanku ozona: dušikovi oksidi in lahkohlapne organske spojine-VOC) so pokazale bistveno višje koncentracije kot na Vrbanskem platoju (mestno ozadje, prav tako brez svežih emisij predhodnikov) in na Teznem.

V tabeli 5.6 so srednje mesečne, najvišje osemurne in urne koncentracije, na sliki 5.15 pa srednje mesečne koncentracije O₃ v posameznem mesecu za merilna mesta Vrbanski plato, Tezno in Pohorje za leto 2025.



Tabela 5.6: Srednje mesečne, najvišje osemurne in najvišje urne koncentracije O₃ v µg/m³ v pripadajočih mesecih – *merilna mesta Pohorje, Vrbanski plato in Tezno*


Mesec	Vrbanski plato			Tezno			Pohorje		
	mesec	8 ur	Ura	mesec	8 ur	ura	mesec	8 ur	ura
januar	36	83	87	32	74	77	64	82	84
februar	37	89	105	30	90	101	60	84	92
marec	60	110	121	50	104	112	76	106	112
april	70	133	142	55	110	117	82	115	120
maj	73	135	140	56	112	113	81	119	127
junij	89	159	174	71	124	129	93	124	138
julij	78	149	158	62	117	125	83	116	122
avgust	75	149	159	59	123	127	84	126	129
september	45	111	115	33	87	91	60	90	100
oktober	38	82	92	26	67	71	54	78	82
november	29	78	88	19	59	71	59	77	82
december	14	61	70	7	42	56	53	79	84

**Slika 5.15:** Koncentracije O₃, *merilna mesta Pohorje, Vrbanski plato in Tezno*

Mesečni poteki ozona za vsa merilna mesta kažejo najvišje koncentracije poleti. Koncentracije O₃ so komplementarne dušikovim oksidom, višje poleti in nižje pozimi. Na koncentracije ozona, ki je fotokemični oksidant, vplivajo seveda predhodniki (dušikovi oksidi in lahkohlapne organske spojine) ter v največji meri sončno obsevanje, ki je bolj intenzivno poleti.

Dnevni hodi koncentracij O₃ poleti, pozimi in skozi celotno leto 2025 na Vrbanskem platoju so na sliki 5.16, na Teznem sliki 5.17, na Pohorju pa na sliki 5.18.

Slika 5.16: Dnevni hodi O_3 , merilno mesto Vrbanski platoSlika 5.17: Dnevni hodi O_3 , merilno mesto Tezno




Slika 5.18: Dnevni hodi O₃, merilno mesto Pohorje

Dnevni hodi na Vrbanškem platoju in na Teznem kažejo, da preko noči poteka razpad ozona, saj je koncentracija najnižja tik pred sončnim vzhodom. Vendar ponoči ves ozon ne razpade, saj ni dovolj svežih emisij predhodnikov. S sončnim obsevanjem in svežimi emisijami predhodnikov se nato zjutraj prične tvorba ozona, ki doseže najvišjo koncentracijo v času, ko je sonce najmočnejše: med 12. in 19. uro poleti oziroma okoli 15. ure pozimi. Z upadanjem jakosti sonca v popoldanskem času upada tudi stopnja nastajanja ozona, dodatno se že pričinja njegov razpad. Razlike med zimo in poletjem v vrednostih in v času pojavljanja koničnih koncentracij so povezane z jakostjo sončnega obsevanja in s časom sončnega vzhoda oz. zahoda. Z NO_x in VOC obremenjen zrak je bolj prisoten v mestnem središču kot na njegovem obrobju, vendar ga veter odnaša tudi izven območij nastanka. Fotokemične reakcije, ki povzročijo presežek ozona, potekajo tudi še nekaj ur po emitiranju iz virov. To pomeni, da ozon lahko nastaja tudi na območjih, kjer ni emisijskih virov. Ker na teh območjih v nočnem času zaradi pomanjkanja dušikovih oksidov ozon ne razpada, je njegova vsebnost v zraku lahko precej višja kot v mestu. Zato so koncentracije na Pohorju višje, dnevni hod pa manj poudarjen.


Glavni vir predhodnikov ozona je cestni promet. Ostali viri lahkih organskih spojin so predvsem bencinske črpalke, kemične čistilnice, industrija. Dodatno k emisijam NO_x največ prispevajo kurilne naprave.

Srednje letne vrednosti in vrednosti poleti skupaj z letnim trendom so prikazane na sliki 5.19 za Vrbanški plato, na sliki 5.20 za Pohorje, na sliki 5.21 pa za Tezno.




Slika 5.19: Ozon 2011-2025, merilno mesto Vrbanski plato

Srednja letna koncentracija ozona na Vrbanskem platoju je bila v letu 2025 rahlo nad povprečjem do sedaj izmerjenih. Trend je usmerjen zelo rahlo navzdol.



Slika 5.20: Ozon 1999-2025, merilno mesto Pohorje

Srednja letna koncentracija ozona na Pohorju je bila v letu 2025 podpovprečna, dolgoletni trend je usmerjen rahlo navzdol.



Slika 5.21: Ozon 2020-2025, merilno mesto Tezno

Izmerjena koncentracija v letu 2025 je bila rahlo pod povprečjem doslej izvedenih meritev. Trend je usmerjen rahlo navzgor.

V tabeli 5.7 so najvišje urne koncentracije ozona v vseh letih meritev za vsa merilna mesta. Rdeče osenčena polja pomenijo preseganje opozorilne vrednosti.

Tabela 5.7: Najvišje urne koncentracije ozona v $\mu\text{g}/\text{m}^3$ – *merilna mesta Vrbanski plato, Tezno in Pohorje*

Leto	Vrbanski plato ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Tezno ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Pohorje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1999	/	/	159
2000	/	/	208
2001	/	/	182
2002	/	/	167
2003	/	/	185
2004	/	/	187
2005	/	/	160
2006	/	/	176
2007	/	/	157
2008	/	/	155
2009	/	/	152
2010	/	/	152
2011	163	/	167
2012	152	/	162
2013	174	/	173
2014	141	/	152
2015	167	/	173
2016	137	/	135
2017	170	/	149
2018	159	/	149
2019	164	/	166
2020	134	128	135
2021	158	166	134
2022	154	178	152
2023	161	142	134
2024	149	135	135
2025	174	129	138
Opozorilna vrednost	180	180	180

Najvišja izmerjena urna koncentracija v tem letu na Pohorju je bila rahlo višja kot prejšnje leto, na Vrbanskem platoju višja, na Teznem pa nižja kot prejšnje leto.

Pokazatelj onesnaženosti z ozonom je tudi število preseganj ciljne osemurne vrednosti v posameznem letu in kot drseče povprečje treh let ter število preseganj opozorilne urne vrednosti, kar je prikazano v tabeli 5.8. Dovoljenih je 25 preseganj ciljne osemurne vrednosti v koledarskem letu triletnega povprečja, zato so rezultati nad to vrednostjo označeni z rdečo barvo.

Tabela 5.8: Število preseganj ciljne osemurne in opozorilne urne vrednosti ozona v letih 1999-2025 - merilna mesta *Vrbanski plato, Tezno in Pohorje*

Leto	Vrbanski plato			Tezno			Pohorje		
	ciljna osemurna	triletno povprečje preseganj ciljne osemurne	opozorilna urna	ciljna osemurna	triletno povprečje preseganj ciljne osemurne	opozorilna urna	ciljna osemurna	triletno povprečje preseganj ciljne osemurne	opozorilna urna
1999	/	/	/	/	/	/	128	/	11
2000	/	/	/	/	/	/	299	/	122
2001	/	/	/	/	/	/	199	209	51
2002	/	/	/	/	/	/	213	237	19
2003	/	/	/	/	/	/	185	199	2
2004	/	/	/	/	/	/	44	147	1
2005	/	/	/	/	/	/	55	95	0
2006	/	/	/	/	/	/	59	53	0
2007	/	/	/	/	/	/	52	55	0
2008	/	/	/	/	/	/	27	46	0
2009	/	/	/	/	/	/	19	33	0
2010	/	/	/	/	/	/	25	24	0
2011	35	/	0	/	/	/	57	34	0
2012	24	/	0	/	/	/	58	47	0
2013	26	28	0	/	/	/	39	51	0
2014	7	19	0	/	/	/	21	39	0
2015	53	29	0	/	/	/	62	41	0
2016	7	22	0	/	/	/	9	31	0
2017	31	30	0	/	/	/	23	31	0
2018	30	23	0	/	/	/	24	19	0
2019	19	27	0	/	/	/	17	21	0
2020	4	18	0	0	0	0	8	16	0
2021	11	11	0	20	10	0	11	12	0
2022	21	12	0	59	26	0	24	14	0
2023	9	14	0	4	28	0	3	13	0
2024	15	15	0	5	18	0	2	10	0
2025	37	20	0	4	4	0	8	4	0

Preseganj ciljne osemurne vrednosti na Vrbanškem platoju je bilo v letu 2025 37, na Teznem 4 in na Pohorju 8. Na Vrbanškem je platoju bilo število preseganj ciljne osemurne višje kot leto pred tem, Na Teznem nižje, na Pohorju pa višje.

Preseganja opozorilnih vrednosti na Vrbanškem platoju v letih 2011-2025 ter Teznem v letih 2020-2025 še niso bila izmerjena, na Pohorju pa niso bila izmerjena že dlje časa. Koncentracije ozona so se z leti zniževale, posledično je bilo izmerjeno tudi manj preseganj opozorilnih vrednosti oziroma le ta po letu 2004 sploh niso bila izmerjena.

V navedenih letih ni bilo preseganj alarmne vrednosti na nobenem merilnem mestu.

5.3 DELCI IN ANALIZE

5.3.1 Delci PM₁₀

Meritve koncentracij skupnih lebdečih delcev v zunanjem zraku so v okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin potekale od leta 1989 do 2001, nato so se začeli ugotavljati delci PM₁₀ v zunanjem zraku. Merilna mesta so bila različna: do leta 2001 Center (Partizanska), nato Tabor, od leta 2011 naprej Vrbanski plato, od leta 2020 naprej tudi na Teznem. Meritve v Radvanju ter Rušah potekajo od leta 2016, ter na Pobrežju od leta 2023. Meritve koncentracij delcev PM₁₀ v državni merilni mreži na merilnem mestu Center potekajo od leta 2002. Iz projekta PMinter na merilnem mestu Krekova/Tyrševa pa potekajo od leta 2013.

Rezultati meritev delcev PM₁₀ za leto 2025 so zbrani v tabeli 5.9.

Tabela 5.9: Kakovost zraka z delci PM₁₀ - merilna mesta Center, Tezno, Krekova/Tyrševa, Vrbanski plato, Radvanje, Pobrežje in Ruše

Količina	Center (µg/m ³)	Tezno (µg/m ³)	Krekova/ Tyrševa (µg/m ³)	Vrbanski plato (µg/m ³)	Pobrežje (µg/m ³)	Radvanje (µg/m ³)	Ruše (µg/m ³)	Mejna vrednost (µg/m ³)
Razpoložljivost dnevnih podatkov	100 %	100 %	100 %	99 %	100 %	99 %	98 %	
Letna srednja vrednost	21	19	17	14	19	15	16	40
Zima	24	24	21	16	22	17	18	
Poletje	19	15	14	12	15	12	13	
C ₂₄ max	87	83	117	100	75	62	78	50
Število preseganj	11	10	11	6	12	8	9	35

Srednja letna koncentracija delcev PM₁₀ v zraku je bila na vseh merilnih mestih pod mejno letno vrednostjo. Najvišja izmerjena dnevna koncentracija v koledarskem letu je bila na vseh merilnih mestih nad mejno vrednostjo. Skupno število preseganj mejne dnevne vrednosti na nobenem merilnem mestu ni preko dovoljenega števila preseganj mejne dnevne vrednosti v koledarskem letu. Teh preseganj je bilo v Centru 11, na Teznem 10, na Krekovi/Tyrševi 11, na Vrbanskem platu 6, na Pobrežju 12, v Radvanju 8 ter v Rušah 9.

Pregled preseganj mejne dnevne vrednosti na merilnih mestih po mesecih:


- Center: januar-2, februar-9.
- Tezno: januar-1, februar-9.
- Krekova/Tyrševa: januar-2, februar-9.
- Vrbanski plato: januar-1, februar-5.
- Pobrežje: januar-2, februar-9, december-1.
- Radvanje: januar-2, februar-5, marec-1.
- Ruše: januar-2, februar-7.

Preko celega leta so bile koncentracije PM₁₀ v Centru višje za 47 % kot na Vrbanskem platoju, samo poleti za 51 % in samo pozimi za 44 %.

V tabeli 5.10 so srednje mesečne in najvišje dnevne koncentracije, na sliki 5.22 pa le srednje mesečne koncentracije delcev PM₁₀ v posameznem mesecu za vsa merilna mesta za leto 2025.

Tabela 5.10: Srednje mesečne in najvišje dnevne koncentracije PM₁₀ v µg/m³ – merilna mesta Center, Tezno, Krekova/Tyrševa, Pobrežje, Vrbanski plato, Radvanje in Ruše


Mesec	Center		Tezno		Krekova/ Tyrševa		Pobrežje		Vrbanski plato		Radvanje		Ruše	
	mesec	dan	mesec	dan	mesec	Dan	mesec	dan	Dan	dan	mesec	Dan	mesec	Dan
januar	24	61	23	52	22	64	21	58	16	51	18	53	20	57
februar	44	87	42	83	38	74	40	75	31	67	32	62	35	78
marec	21	38	18	38	16	37	17	34	13	29	14	59	13	31
april	20	33	18	30	16	31	18	31	14	33	13	22	14	32
maj	19	27	13	20	12	20	13	19	11	18	11	18	11	15
junij	23	35	18	30	17	29	18	32	15	27	16	29	18	29
julij	16	36	12	22	12	21	13	24	10	19	10	21	11	20
avgust	17	28	15	26	15	29	15	25	13	22	14	24	14	22
september	16	27	13	23	12	25	14	26	11	22	11	21	12	26
oktober	16	24	17	28	12	20	16	28	11	18	12	21	13	42
november	19	33	21	39	18	36	19	34	14	25	15	26	16	31
december	21	42	25	47	21	42	22	56	14	33	17	31	14	33




Slika 5.22: Srednje mesečne koncentracije delcev PM₁₀, merilna mesta Center, Tezno, Krekova/Tyrševa, Vrbanski plato, Radvanje, Pobrežje in Ruše

Koncentracije delcev PM_{10} so bile povsod višje pozimi kot poleti. Najnižje so bile julija oziroma septembra najvišje pa februarja. Z delci PM_{10} najbolj obremenjeno merilno mesto v letu 2025 je bil Center. Nižja koncentracija kot v Centru je bila izmerjena na Teznem, na Krekovi/Tyrševi ter na Pobrežju, najmanj obremenjena merilna mesta pa so bila Vrbanski plato, Radvanje ter Ruše. Najnižje koncentracije so bile v posameznih mesecih izmerjene na Vrbanskem platuju, v Rušah ali v Radvanju. Poseljena območja so bolj obremenjena z delci PM_{10} , predvsem v zimskem obdobju.


Dnevni hodi koncentracij delcev PM_{10} poleti, pozimi in skozi celotno leto 2025 v Centru so na sliki 5.23, na Teznem na sliki 5.24, na Vrbanskem platuju na sliki 5.25, na Krekovi/Tyrševi pa na sliki 5.26.




Slika 5.23: Dnevni hodi koncentracij delcev PM_{10} , merilno mesto Center



Slika 5.24: Dnevni hodi koncentracij delcev PM_{10} , merilno mesto Tezno



Slika 5.25: Dnevni hodi koncentracij delcev PM_{10} , merilno mesto Vrbanski plato




Slika 5.26: Dnevni hodi koncentracij delcev PM_{10} , merilno mesto Krekova/Tyrševa

Dnevni hodi so pozimi in poleti na vseh merilnih mestih zelo podobni in ne bistveno drugačni od celotnega leta. Na vseh dnevni hodi večinoma izstopata dva vrhova, jutranji in večerni. Večerni vrh je na vseh merilnih mestih praviloma višji kot jutranji (kar pa ne velja za merilni mesti Center ter Tezno (slednje samo v poletnem času)).

Število preseganj mejne dnevne (pred letom 2005 mejne dopustne) vrednosti za delce PM₁₀ v letih 2002-2025 je za Center prikazano v tabeli 5.11 in za leta od 2010 do 2025 tudi na sliki 5.27. Dopustna vrednost je bila vpeljana zato, da je bil prehod za doseg mejne vrednosti postopen.

Tabela 5.11: Število preseganj mejne dnevne (pred letom 2005 mejne dopustne) vrednosti za delce PM₁₀ 2002-2025 - *merilno mesto Center*

Leto	Center
2002	66
2003	129
2004	102
2005	101
2006	108
2007	91
2008	54
2009	35
2010	47
2011	65
2012	34
2013	36
2014	25
2015	34
2016	43
2017	35
2018	30
2019	13
2020	15
2021	13
2022	3
2023	1
2024	12
2025	11
Dovoljeno število preseganj	35



Slika 5.27: Število preseganj mejne dnevne vrednosti za obdobje od 2010 do 2025, *merilno mesto Center*

V letu 2025 število preseganj mejne dnevne vrednosti v Centru ni bilo nad dovoljenim. Iz slike 5.27 je razvidno, da so preseganja praviloma zabeležena skoraj vedno pozimi.

V tabeli 5.12 prikazujemo 90,4 % percentil in število preseganj za leta 2011 do 2025 za merilna mesta Radvanje, Ruše, Vrbanški plato, Tezno in Pobrežje.


Tabela 5.12: 90,4 % percentil iz dnevnih koncentracij za delce PM₁₀ oziroma število preseganj za leta 2011 do 2025 - merilna mesta Radvanje, Ruše, Vrbanški plato, Tezno in Pobrežje

Leto	Radvanje (µg/m ³)	Ruše (µg/m ³)	Vrbanški plato (µg/m ³)	Tezno (µg/m ³)	Pobrežje (µg/m ³)
2011	/	/	25	/	/
2012	/	/	8	/	/
2013	/	/	8	/	/
2014	/	/	10	/	/
2015	/	/	3	/	/
2016	43 *	45 *	21	/	/
2017	18	17	21	/	/
2018	5	15	12	/	/
2019	1	1	0	/	/
2020	4	12	3	9	/
2021	5	3	4	11	/
2022	0	0	0	4	/
2023	0	0	0	4	0
2024	5	8	4	15	14
2025	8	9	4	10	12
Mejna vrednost	50 (2016) / 35 (2017->)	50 (2016) / 35 (2017->)	35	35	35

* Meritve so potekale 6 mesecev v letu, v tabeli je naveden 90,4 % percentil.

V letu 2025 izmerjeno število preseganj na nobenem merilnem mestu ni bilo čezmerno, kar tudi velja za ostala navedena merilna mesta v celotnem dosedanjem merilnem obdobju. Je pa v 2025, glede na leto 2023 opazno poslabšanje kakovosti zraka z delci PM₁₀, podobno kot v letu 2024.

Srednje letne in zimske koncentracije delcev PM₁₀ v Centru (DMKZ) v celotnem dosedanjem merilnem obdobju so na sliki 5.28.




Slika 5.28: Delci PM_{10} 2001-2025, merilno mesto Center (DMKZ)



Koncentracije delcev PM_{10} so bile v Centru v letu 2025 med najnižje doslej izmerjenimi. Mejna letna vrednost ni bila presežena že od leta 2007. Dolgoletni trend je usmerjen navzdol.



Srednje letne in zimske koncentracije delcev PM_{10} v dosedanjem merilnem obdobju na merilnih mestih: Vrbanski plato na sliki 5.29, Ruše na sliki 5.30, Radvanje na sliki 5.31, Krekova/Tyrševa na sliki 5.32, Tezno na sliki 5.33 ter Pobrežje na sliki 5.34.


Meritve na merilnih mestih v Radvanju in Rušah so se leta 2016 izvajale samo 6 mesecev, zato so na grafih za to leto prikazane preračunane srednje letne vrednosti. Ostala leta so se meritve izvajale celotno leto, tako da preračun ni bil več potreben.



Slika 5.29: Delci PM_{10} 2011-2025, merilno mesto Vrbanski plato

Slika 5.30: Delci PM₁₀ 2016-2025, merilno mesto RušeSlika 5.31: Delci PM₁₀ 2016-2025, merilno mesto Radvanje

Slika 5.32: Delci PM_{10} 2013-2025, merilno mesto Krekova/TyrševaSlika 5.33: Delci PM_{10} 2020-2025, merilno mesto Tezno



Slika 5.34: Delci PM₁₀ 2023-2025, merilno mesto Pobrežje

Leta 2025 so bile izmerjene koncentracije delcev PM₁₀ na večini merilnih mest med najnižjimi doslej izmerjenimi. Dolgoletni trendi na Vrbanškem platoju, v Radvanju, v Rušah in na Krekovi/Tyrševi so usmerjeni navzdol, na Teznem in na Pobrežju pa trenda ni.

Na koncentracije delcev PM₁₀ v zraku vplivajo razen lokalnih virov (kurilne naprave, promet in industrija) tudi širše vremenske razmere (dolgotrajnejše zadrževanje zračnih mas in s tem kopičenje onesnaževal v času visokega zračnega pritiska, dodatno še nizke temperature zraka) ter regionalni in daljinski transport onesnaževal. O najvplivnejšem viru težko govorimo, zagotovo sta to promet (poleti in pozimi) ter individualne male kurilne naprave na trdno gorivo (pozimi). Najverjetneje sta na različnih merilnih mestih v različnem razmerju.

5.3.2 Delci PM_{2,5}

Meritve koncentracij delcev PM_{2,5} potekajo v državni merilni mreži na merilnem mestu Vrbanški plato (mestno ozadje) od leta 2009, meritve na merilnem mestu Krekova/Tyrševa pa se izvajajo od leta 2013, v Centru so se po prekinitvi v 2018 začele zopet izvajati v sredini 2020.


Rezultati meritev za leto 2025 so v tabeli 5.13.

Tabela 5.13: Kakovost zraka z delci PM_{2,5} - merilna mesta Krekova/Tyrševa, Center in Vrbanški plato

Količina	Center (µg/m³)	Krekova/Tyrševa (µg/m³)	Vrbanški plato (µg/m³)	Mejna vrednost (µg/m³)
Razpoložljivost dnevnih podatkov	100 %	100 %	90 %	
Letna srednja vrednost	11	13	9	20
Zima	14	17	12	
Poletje	7	9	7	

Srednja letna koncentracija delcev $PM_{2,5}$ na Vrbanskem platoju, v Centru in na Krekovi/Tyrševi ni presegla mejne letne vrednosti.

Na sliki 5.35 so srednje mesečne koncentracije delcev $PM_{2,5}$, v tabeli 5.14 pa poleg njih še najvišje dnevne koncentracije v posameznem mesecu za merilna mesta Vrbanski plato, Center in Krekova/Tyrševa za leto 2025.




Slika 5.35: Srednje mesečne koncentracije delcev $PM_{2,5}$, merilna mesta Vrbanski plato, Center in Krekova/Tyrševa



Tabela 5.14: Srednje mesečne in najvišje dnevne vrednosti delcev $PM_{2,5}$ v $\mu g/m^3$ v pripadajočih mesecih - *merilna mesta Center, Krekova/Tyrševa in Vrbanski plato*

Mesec	Center		Krekova/Tyrševa		Vrbanski plato	
	mesec	dan	mesec	dan	mesec	dan
januar	16	50	18	54	14	45
februar	29	63	33	66	23	51
marec	8	20	11	23	8	17
april	8	13	10	16	8	15
maj	6	10	8	13	7	13
junij	9	21	11	21	10	20
julij	6	10	8	15	6	14
avgust	7	13	10	17	8	14
september	6	12	9	17	6	11
oktober	7	12	9	15	7	12
november	12	22	15	29	12	21
december	15	27	17	33	13	28

Merilno mesto Krekova/Tyrševa je bilo bolj obremenjeno z delci $PM_{2,5}$ kot merilni mesti Vrbanski plato in Center. Na vseh merilnih mestih so pozimi koncentracije višje kot poleti.


Srednje letne in zimske koncentracije delcev $PM_{2,5}$ so prikazane na sliki 5.36 za Vrbanski plato, na sliki 5.37 za Center (od leta 2005) in na sliki 5.38 za Krekovo/Tyrševo (od leta 2013).

**Slika 5.36:** Delci $PM_{2,5}$ 2009-2025, *merilno mesto Vrbanski plato*


Slika 5.37: Delci $PM_{2,5}$ 2005-2025, merilno mesto CenterSlika 5.38: Delci $PM_{2,5}$ 2013-2025, merilno mesto Krekova/Tyrševa

Koncentracije delcev $PM_{2,5}$ so bile leta 2025 v Centru ter na Vrbanskem platoju najnižje izmerjene, na Krekovi/Tyrševi pa med najnižje izmerjenimi. Dolgoletni trendi so povsod usmerjeni navzdol.


Zanimivi so tudi prikazi primerjave med koncentracijami delcev PM_{10} in $PM_{2,5}$ na vseh merilnih mestih za leto 2025, kar je na slikah 5.39 za Krekovo/Tyrševa, 5.40 za Vrbanski plato in 5.41 za Center.



Slika 5.39: Mesečne koncentracije delcev PM_{10} in $PM_{2,5}$, merilno mesto Krekova/Tyrševa



Slika 5.40: Mesečne koncentracije delcev PM_{10} in $PM_{2,5}$, merilno mesto Vrbanski plato




Slika 5.41: Mesečne koncentracije delcev PM₁₀ in PM_{2,5}, merilno mesto Center

Koncentracije delcev PM₁₀ so praviloma seveda višje kot koncentracije PM_{2,5}. Razmerja med srednjimi letnimi koncentracijami delcev PM_{2,5}/PM₁₀ so:


- Krekova/Tyrševa: 75 % (pozimi 81 %, poleti 65 %)
- Vrbanski plato: 65 % (pozimi 71 %, poleti 61 %)
- Center: 51 % (pozimi 60 %, poleti 38 %)

Razmerja kažejo, da je delež delcev PM_{2,5} v PM₁₀ zelo visok na vseh merilnih mestih.


Dnevni hodi koncentracij delcev PM_{2,5} poleti, pozimi in skozi celotno leto 2025 v Centru so na sliki 5.42, na Vrbanskem platoju na sliki 5.43, na Krekovi/Tyrševi pa na sliki 5.44.



Slika 5.42: Dnevni hodi koncentracij delcev PM_{2,5}, merilno mesto Center



Slika 5.43: Dnevni hodi koncentracij delcev $PM_{2,5}$, merilno mesto Vrbanski plato



Slika 5.44: Dnevni hodi koncentracij delcev $PM_{2,5}$, merilno mesto Krekova/Tyrševa

Iz dnevni hodov za vsa merilna mesta je razvidno, da je v zimskem času zrak z delci $PM_{2,5}$ najmanj obremenjen okrog 6:00 do 7:00 ure zjutraj, nato pa koncentracije različno naraščajo čez dan. Po 16:00 uri je naraščanje močnejše in doseže vrh okrog 21:00 ure. V poletnem času je na vseh treh merilnih mestih zaznati jutranji vrh okrog 9:00 ure ter večerni/nočni vrh po 21:00 uri. V poletnem času je večerni vrh na vseh merilnih mestih rahlo višji kot jutranji.


5.3.3 Delci PM₀₁

Meritve koncentracij delcev PM₀₁ na merilnem mestu Krekova/Tyrševa potekajo od julija 2013. Rezultati meritev za leto 2025 so v tabeli 5.15.

Tabela 5.15: Kakovost zraka z delci PM₀₁ - *merilno mesto Krekova/Tyrševa*

Količina	Krekova/Tyrševa (µg/m ³)
Razpoložljivost urnih podatkov	100 %
Letna srednja vrednost	12
Zima	16
Poletje	8

Na sliki 5.45 so srednje mesečne koncentracije delcev PM₀₁, v tabeli 5.16 pa zraven njih še najvišje dnevne koncentracije v posameznem mesecu.




Slika 5.45: Srednje mesečne koncentracije delcev PM₀₁, *merilno mesto Krekova/Tyrševa*

Tabela 5.16: Srednje mesečne in najvišje dnevne koncentracije delcev PM_{01} v $\mu g/m^3$ v pripadajočih mesecih - *merilno mesto Krekova/Tyrševa*


Mesec	Krekova/Tyrševa	
	mesec	dan
januar	17	51
februar	31	63
marec	10	20
april	8	13
maj	7	12
junij	10	19
julij	6	13
avgust	8	14
september	7	14
oktober	8	14
november	14	27
december	17	31

Srednje letne in zimske koncentracije delcev PM_{01} na merilnem mestu Krekova/Tyrševa so prikazane na sliki 5.46.

**Slika 5.46:** Delci PM_{01} 2013-2025, *merilno mesto Krekova/Tyrševa*


Koncentracije delcev PM_{01} so bile leta 2025 med najnižje doslej izmerjenimi. Dolgoletni trend je usmerjen navzdol.

Obremenjenost z delci PM_{01} je najvišja pozimi, višja kot poleti. Zanimiva je tudi primerjava med koncentracijami delcev PM_{10} , $PM_{2,5}$ in PM_{01} , kar je prikazano na sliki 5.47.



Slika 5.47: Mesečne koncentracije delcev PM_{10} , $PM_{2,5}$ in PM_{01} , merilno mesto Krekova/Tyrševa


Razmerja med delci PM_{01}/PM_{10} , $PM_{2,5}/PM_{10}$ in $PM_{01}/PM_{2,5}$ so prikazana na sliki 5.48.



Slika 5.48: Mesečna razmerja koncentracij delcev $PM_{2,5}/PM_{10}$, PM_{01}/PM_{10} in $PM_{01}/PM_{2,5}$, merilno mesto Krekova/Tyrševa

V zimskih mesecih je visok delež manjših frakcij delcev. Delež delcev PM_{01} v PM_{10} dosega pozimi do 82 %, poleti pa se spusti do 47 %. Delež $PM_{2,5}$ v PM_{10} dosega pozimi do 86 %, poleti pa se spusti do 61 %. Delež PM_{01} v $PM_{2,5}$ pozimi dosega 95 %, poleti pa se spusti do 77 %.

Dnevni hodi koncentracij delcev PM_{01} poleti, pozimi in skozi celotno leto 2025 na Krekovi/Tyrševi so na sliki 5.49.



Slika 5.49: Dnevni hodi koncentracij delcev PM_{01} , merilno mesto Krekova/Tyrševa

Iz dnevni hodi je razvidno da je v zimskem času zrak z delci PM_{01} najmanj obremenjen okrog 7:00 ure zjutraj, nato pa koncentracije naraščajo čez dan. Po 16:00 uri je naraščanje močnejše in doseže vrh okrog 21:00-22:00 ure.

Najnižje koncentracije v poletnem času so izmerjene okrog 16:00 ure. V poletnem času dopoldanski vrh ni več zaznaven, je pa zaznaven večerni/nočni vrh (po 22:00 uri).

5.3.4 Analize delcev PM₁₀

Analize delcev PM₁₀ na policiklične aromatske ogljikovodike in težke kovine v Mariboru potekajo v mestni merilni mreži od leta 1993, najprej v skupnih lebdečih delcih, nato v delcih PM₁₀. Merilna mesta so bila različna (Center (Partizanska), Tabor, Vrbanski plato), prav tako metodologija analiz. Od leta 2008 se na merilnem mestu Center vse analize v delcih PM₁₀ izvajajo v državni mreži ARSO. V letu 2020 so bile prvič v takšnem obsegu izvedene tudi na merilnih mestih Radvanje, Tezno in Ruše ter od leta 2023 na Pobrežju.

5.3.4.1 Benzo(a)piren

Analize vsebnosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) v delcih PM₁₀, od katerih navajamo le koncentracije benzo(a)pirena (ki ima predpisano ciljno vrednost), so potekale na merilnih mestih Center, Radvanje, Tezno, Ruše ter Pobrežje v vzorcih odvzetih z referenčno metodo.

Rezultati meritev za leto 2025 so prikazani kot letna povprečna vrednost v tabeli 5.17.


Tabela 5.17: Vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM₁₀ - *merilno mesto Center, Radvanje, Pobrežje, Tezno ter Ruše*

Količina	Center (ng/m ³)	Radvanje (ng/m ³)	Pobrežje (ng/m ³)	Tezno (ng/m ³)	Ruše (ng/m ³)	Ciljna letna vrednost (ng/m ³)
Število vzorcev	121	122	122	122	122	
Časovna pokritost / razpoložljivost podatkov	33 % / 99 %	33 % / 100 %	33 % / 100 %	33 % / 100 %	33 % / 100 %	
Letna srednja vrednost	0,5	0,5	0,8	0,9	0,9	1

Za meritve na stalnem merilnem mestu je potrebno doseči najmanj 33 % časovno pokritost ob najmanj 90 % razpoložljivosti podatkov.

Letna koncentracija benzo(a)pirena v skladu s pravili zaokroževanja /25/ ne presega ciljne letne vrednosti na nobenem merilnem mestu.


Na sliki 5.50 so srednje mesečne koncentracije benzo(a)pirena v delcih PM₁₀ za leto 2025 na merilnih mestih Center, Radvanje, Tezno, Ruše ter Pobrežje.



Slika 5.50: Benzo(a)piren v delcih PM₁₀, merilna mesta Center, Radvanje, Tezno, Ruše ter Pobrežje

PAO nastajajo pri nepopolnem izgorevanju v kurilnih napravah in prometu, glede na bistveno višje koncentracije pozimi pa so kurilne naprave zagotovo prevladujoči vir. Vsa merilna mesta so z benzo(a)pirenom v delcih PM₁₀ bolj obremenjena pozimi in praktično neobremenjena poleti. Na Teznu, na Pobrežju in v Rušah (ter občasno tudi v Radvanju) rezultati kažejo v zimskih mesecih višje vrednosti kot na merilnem mestu Center. Zrak v okolici mestnih središč je lahko enako ali celo bolj onesnažen z benzo(a)pirenom v delcih PM₁₀, kar bi lahko bila posledica večje uporabe lesne biomase kot energenta. Zanimivo je dejstvo, da je vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM₁₀ višja v Rušah kot v Centru, kljub precej nižjim koncentracijam delcev PM₁₀.


Potek srednjih letnih koncentracij za merilno mesto Center v celotnem dosedanjem merilnem obdobju je prikazan na sliki 5.51.



Slika 5.51: Benzo(a)piren v delcih PM₁₀ 2008-2025, merilno mesto Center

Vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM_{10} v Centru je leta 2025 pod povprečjem doslej izmerjenih in pod ciljno letno vrednostjo. Trend je usmerjen navzdol.


Potek srednjih letnih koncentracij za merilno mesto Ruše v celotnem dosedanjem merilnem obdobju je prikazan na sliki 5.52.




Slika 5.52: Benzo(a)piren v delcih PM_{10} 2019-2025, *merilno mesto Ruše*

Vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM_{10} v Rušah je bila rahlo pod povprečjem doslej izmerjenih. Izmerjene vrednosti v vseh letih so pod ciljno letno vrednostjo.

Potek srednjih letnih koncentracij za merilni mesti Radvanje, Tezno ter Pobrežje v celotnem dosedanjem merilnem obdobju je prikazan na slikah 5.53, 5.54 ter 5.55.




Slika 5.53: Benzo(a)piren v delcih PM_{10} 2020-2025, *merilno mesto Radvanje*



Slika 5.54: Benzo(a)piren v delcih PM₁₀ 2020-2025, *merilno mesto Tezno*

Vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM₁₀ v Radvanju ter na Teznem v letu 2025 je bila pod povprečjem do sedaj izmerjenih vrednosti. Izmerjene vrednosti na teh dveh merilnih mestih so vsa merjena leta pod ciljno letno vrednostjo.



Slika 5.55: Benzo(a)piren v delcih PM₁₀ 2023-2025, *merilno mesto Pobrezje*

Vsebnost benzo(a)pirena v delcih PM₁₀ na Pobrezju je bila v letu 2025 v povprečju do sedaj izmerjenih vrednosti, trend ni zaznaven.

5.3.4.2 Težke kovine

Analize na vsebnost težkih kovin (svinec, kadmij, arzen in nikelj) v delcih PM₁₀ so v okviru državne mreže potekale na merilnem mestu Center v vzorcih odvzetih z referenčno metodo. Rezultati so prikazani kot letne povprečne vrednosti in najvišje izmerjene dnevne koncentracije, za leto 2025 so v tabeli 5.18. Analiziranih je bilo 64 vzorcev (časovna pokritost podatkov za vsako kovino je 18 %, razpoložljivost podatkov pa je 100 %).


Tabela 5.18: Vsebnost težkih kovin v delcih PM₁₀ - *merilno mesto Center*

Onesnaževalo	Letno povprečje (ng/m ³)	Najvišja dnevna koncentracija (ng/m ³)	Ciljna/mejna letna vrednost (ng/m ³)
Svinec	5,3	30,9	500
Nikelj	2,4	6,1	20*
Kadmij	0,11	0,44	5,0*
Arzen	0,30	1,6	6,0*


* ciljna vrednost.

Srednja letna koncentracija posamezne kovine ni presegala posamezne ciljne oziroma mejne letne vrednosti.

Srednje mesečne koncentracije težkih kovin v delcih PM₁₀ na merilnem mestu Center v letu 2025 so za svinec in kadmij prikazane na sliki 5.56, za nikelj in arzen pa na sliki 5.57.




Slika 5.56: Mesečne koncentracije svinca in kadmija v delcih PM₁₀, *merilno mesto Center*





Slika 5.57: Mesečne koncentracije niklja in arzena v delcih PM₁₀, *merilno mesto Center*


Koncentracije predstavljenih kovin v delcih PM₁₀ na merilnem mestu Center so praviloma višje pozimi kot poleti.

Srednje letne koncentracije v Centru v letih 2008-2025 so za svinec na sliki 5.58, nikelj 5.59, kadmij 5.60 in arzen na sliki 5.61.



Slika 5.58: Svinec v delcih PM₁₀ 2008-2025, *merilno mesto Center*

Slika 5.59: Nikelj v delcih PM₁₀ 2008-2025, merilno mesto CenterSlika 5.60: Kadmij v delcih PM₁₀ 2008-2025, merilno mesto Center



Slika 5.61: Arzen v delcih PM₁₀ 2008-2025, merilno mesto Center

Že precej časa so koncentracije vseh analiziranih kovin v delcih PM₁₀ pod ciljnim letnimi vrednostmi (arzen, kadmij, nikelj) oziroma mejno letno vrednostjo (svinec). Pri vseh kovinah so trendi usmerjeni navzdol.

Kot vire težkih kovin lahko navedemo emisije izpušnih plinov, obrabo zavor v cestnem prometu, industrijo ter kurjenje premoga in kurilnega olja.

5.4 BENZEN


Meritve benzena v zunanjem zraku so vključene v državno mrežo na merilnem mestu Center že od leta 2005 s prekinitvijo v letu 2020. Rezultati za leto 2025 so v tabeli 5.19.

Tabela 5.19: Vsebnost benzena v zunanjem zraku - merilno mesto Center

Količina	Center (µg/m³)	Mejna vrednost (µg/m³)
Razpoložljivost urnih podatkov	89 %	5
Letna srednja vrednost	1,0	
Zima	1,44	
Poletje	0,47	

Srednja letna vrednost ni presegala mejne letne vrednosti.


Na sliki 5.62 so srednje mesečne koncentracije benzena za merilno mesto Center za leto 2025.



Slika 5.62: Mesečne koncentracije benzena, *merilno mesto Center*

Koncentracije benzena so bistveno višje pozimi kot poleti.


Dnevni hodi koncentracij benzena v Centru so poleti, pozimi in skozi celotno leto 2025 na sliki 5.63.



Slika 5.63: Dnevni hodi koncentracij benzena, *merilno mesto Center*

Pri dnevnem hodu benzena imamo dva vrha, jutranjega in večernega. Večerni je v zimskem času bistveno višji kot jutranji.

Uradni, vendar nepopolni rezultati meritev benzena kot srednje letne in zimske koncentracije v zunanjem zraku iz merilnega mesta Center so bili prvič na voljo v letu 2005 in so skupaj z rezultati meritev do leta 2025 prikazani na sliki 5.64.



Slika 5.64: Benzen 2005-2025, *merilno mesto Center*

Rezultati kažejo, da je bila koncentracija benzena leta 2025 pod povprečjem doslej izmerjenih. Trend je usmerjen navzdol. Slika je zgolj informativna zaradi (pre)majhnega deleža podatkov v letih 2016 (81 %), 2018 (29 %), 2019 (30 %), 2020 (0 %), 2021 (81%) ter 2025 (89%).


5.5 ČRNI OGLJIK

Meritve črnega ogljika v zunanjem zraku se na merilnem mestu Krekova/Tyrševa izvajajo od decembra 2013. Rezultati za leto 2025 so v tabeli 5.20.

Tabela 5.20: Vsebnost črnega ogljika v zunanjem zraku - *merilno mesto Krekova/Tyrševa*

Količina	Krekova/Tyrševa ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Razpoložljivost urnih podatkov	98 %
Letna srednja vrednost	1,3
Zima	1,8
Poletje	0,90


Na sliki 5.65 so srednje mesečne koncentracije črnega ogljika in delež črnega ogljika iz kurjenja lesne biomase za merilno mesto Krekova/Tyrševa za leto 2025.



Slika 5.65: Mesečne koncentracije črnega ogljika in njegov delež iz kurjenja lesne biomase, *merilno mesto Krekova/Tyrševa*

Koncentracije črnega ogljika so višje v zimskem času. Delež črnega ogljika iz kurjenja lesne biomase na urnem nivoju pozimi dosega 35 %, poleti pa pade na 12 %.


Dnevni hodi koncentracij črnega ogljika poleti, pozimi in skozi celotno leto 2025 so na sliki 5.66.




Slika 5.66: Dnevni hodi koncentracij črnega ogljika, merilno mesto Krekova/Tyrševa

Dnevni hodi urnih koncentracij črnega ogljika so zelo podobni ostalim onesnaževalom. Pozimi in poleti se pojavita dnevno dva vrha, eden zjutraj okrog 8:00 – 9:00 ure, večerni pa okrog 19:00 - 21:00 ure. Pozimi in poleti je večerni vrh višji od jutranjega.

Na sliki 5.67 so prikazani dnevni hodi skupne količine črnega ogljika, črnega ogljika iz naslova kurjenja fosilnih goriv in črnega ogljika iz kurjenja lesne biomase pozimi in enako na sliki 5.68 poleti.




Slika 5.67: Dnevni hodi koncentracij skupnega črnega ogljika, črnega ogljika iz fosilnih goriv in črnega ogljika iz lesne biomase, pozimi, merilno mesto Krekova/Tyrševa



Slika 5.68: Dnevni hod koncentracij skupnega črnega ogljika, črnega ogljika iz fosilnih goriv in črnega ogljika iz lesne biomase, poleti, merilno mesto *Krekova/Tyrševa*

Iz slik 5.67 in 5.68 se vidi, da je pozimi in poleti na merilnem mestu Krekova/Tyrševa prevladujoč vir črnega ogljika kurjenje fosilnih goriv, pozimi delež črnega ogljika iz kurjenja lesne biomase v nočnem času skoraj doseže delež iz naslova kurjenja fosilnih goriv. Pozimi v večernih urah so koncentracije črnega ogljika iz naslova kurjenja lesne biomase do trikrat večje kot poleti.

Na sliki 5.69 so prikazane letne, zimske in poletne koncentracije črnega ogljika ter delež črnega ogljika iz naslova kurjenja lesne biomase za obdobje 2014-2025.



Slika 5.69: Skupni črni ogljik ter črni ogljik v zimskem in poletnem času, črni ogljik iz naslova kurjenja lesne biomase (BC (WB)), merilno mesto *Krekova/Tyrševa*

Koncentracija črnega ogljika je bila v letu 2025 pod povprečjem doslej izmerjenih. Dolgoletni trend je usmerjen navzdol. Razmerje med deležem črnega ogljika iz naslova kurjenja lesne biomase (24 %) in deležem črnega ogljika iz naslova kurjenja fosilnih goriv (76 %) se v letu 2025 glede na leto 2024 povečalo v prid slednjemu. Delež črnega ogljika iz naslova kurjenja lesne biomase se je do leta 2020 poviševal, po tem letu pa se je do leta 2023 zniževal, leta 2025 pa je bila izmerjena najnižja vrednost doslej.

5.6 METEOROLOŠKI PARAMETRI


5.6.1 Temperatura zraka

Za pravilno razumevanje kakovosti zunanjega zraka je pomembno poznavanje njegove temperature v obravnavanem obdobju, saj temperatura v povezavi z drugimi meteorološkimi pogoji vpliva na procese v atmosferi in s tem tudi na kakovost zunanjega zraka. Meritve temperature zunanjega zraka potekajo v Centru (DMKZ) že od leta 1997, na Vrbanškem platoju so bile prve popolne meritve šele leta 2012, na Teznem se meritve izvajajo od 2020.

Srednje mesečne temperature zraka za leto 2025 na merilnih mestih Center, Vrbanški plato in Tezno so v tabeli 5.21 in na sliki 5.70. Na merilnem mestu Center in Vrbanški plato je bilo razpoložljivih 100 %, na merilnem mestu Tezno pa 98 % urnih podatkov.

Tabela 5.21: Srednje mesečne temperature zraka - merilna mesta Center, Vrbanški plato in Tezno


Mesec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	Srednja letna
Center	3,7	2,1	9,3	13,7	15,6	23,4	22,4	22,0	18,2	11,5	5,8	2,3	12,6
Vrbanški plato	3,0	0,9	8,3	12,4	14,3	21,7	21,0	20,6	17,1	10,4	4,8	1,8	11,4
Tezno	3,0	1,3	8,5	13,6	15,9	24,1	22,9	22,5	18,4	11,0	4,7	1,3	12,3



Slika 5.70: Mesečne temperature zraka, merilna mesta Center, Vrbanški plato in Tezno

Temperatura zraka je bila v vseh mesecih preteklega leta v Centru višja kot na Vrbanškem platoju. Na Teznem je bila skoraj vse mesece izmerjena višja temperatura kot v Centru.


Meritve temperature zraka potekajo že precej dolgo, tako da se lahko opazujejo letni trendi. Slika 5.71 prikazuje srednjo letno temperaturo zraka ter temperaturo pozimi in poleti v letih 1997 do 2025 v Centru.



Slika 5.71: Temperatura zraka 1997-2025, merilno mesto Center

Srednja letna temperatura zraka je bila v letu 2025 nadpovprečna in za 0,5 °C višja od povprečja let 1997-2024 in ena izmed najvišjih izmerjenih v navedenem obdobju.

Odstopanje srednjih mesečnih temperatur za leto 2025 od dolgoletnega povprečja v obdobju 1997–2024 je prikazano na sliki 5.72.



Slika 5.72: Odstopanje mesečne temperature zraka v letu 2025 od povprečja 1997-2024, merilno mesto Center

Srednja mesečna temperatura v letu 2025 je bila večino mesecev višja od povprečja 1997-2024.

5.6.2 Smer in hitrost vetra


Na merilnem mestu Vrbanski plato so se na avtomatski meteorološki postaji med ostalimi parametri izvajale tudi meritve smeri in hitrost vetra (Vir: ARSO). V tabeli 5.22 so prikazani razpoložljivost urnih podatkov ter povprečna mesečna in najvišja urna hitrost vetra za posamezne mesece in za celotno koledarsko leto. V tabeli 5.23 pa sta prikazana pogostost pojavljanja določene smeri vetra v koledarskem letu in povprečna hitrost vetra pri tej smeri. Na sliki 5.73 je roža vetrov za leto 2025 za merilno mesto Vrbanski plato skupaj s povprečno hitrostjo vetra iz posamezne smeri.

Tabela 5.22: Razpoložljivost podatkov, povprečna mesečna in najvišja urna hitrost vetra

Mesec	Razpoložljivost podatkov (%)	Povprečna mesečna hitrost vetra (m/s)	Najvišja urna hitrost vetra (m/s)
januar	100	1,9	6,9
februar	100	1,4	5,3
marec	100	2,2	6,6
april	100	2,1	5,8
maj	100	1,9	6,5
junij	100	2,1	6,3
julij	100	2,2	5,7
avgust	100	2,1	5,8
september	100	1,7	5,8
oktober	100	1,7	6,6
november	100	1,6	6,8
december	100	1,6	4,4
skupaj	100	1,9	6,9

Tabela 5.23: Pogostost pojavljanja smeri vetra in povprečna hitrost vetra po smereh

Smer	Pogostost pojavljanja smeri vetra (%)	Povprečna hitrost vetra (m/s)
S	7	1,7
SSV	3	1,5
SV	3	1,5
VSV	3	1,6
V	5	1,9
VJV	6	2,1
JV	8	2,8
JJV	5	2,9
J	2	2,4
JJZ	1	2,5
JZ	2	2,3
ZJZ	2	1,9
Z	9	2,2
ZSZ	13	1,9
SZ	17	1,3
SSZ	13	1,3




Slika 5.73: Pogostost pojavljanja smeri vetra in povprečna hitrost po smereh, leto 2025, merilno mesto Urbanski plato

Najpogostejša smer vetra je SZ, ki se pojavlja okrog 17 % časa v letu. Skupno je veter iz IV. kvadranta (Z – SSZ) pihal 52 % časa, sledi II. kvadrant (V – JJV) z 25 %, veter iz ostalih dveh kvadrantov pa je skupno pihal približno eno četrtno leta.


5.6.3 Rože onesnaženja zunanjega zraka

Na podlagi meritev smeri vetra se lahko ugotavlja, od kod najpogosteje prihaja z onesnaževali obremenjen zunanji zrak. Rože onesnaženja zunanjega zraka, ki prikazujejo povprečne koncentracije posameznega onesnaževala pri določeni smeri vetra, so za leto 2025 predstavljene samo za neprekinjene meritve na merilnem mestu Urbanski plato. Slika 5.74 za dušikove okside in dušikov dioksid ter slika 5.75 za delce PM_{10} in $PM_{2,5}$.

Kot je razvidno iz spodnjih slik, v neposredni okolici merilnega mesta ni nobenega vplivnega vira, ki bi lokalno poviševal koncentracije merjenih onesnaževal. Najvišje koncentracije NO_2 ter NO_x se pojavljajo ob JV ter VJV smeri vetra, najvišje koncentracije delcev PM_{10} ob V in VJV ter SZ in SSZ smeri vetra, najvišje koncentracije delcev $PM_{2,5}$ pa ob SZ in SSZ smeri vetra.



Slika 5.74: Roža onesnaženja zunanjega zraka z dušikovimi oksidi (NO_x) in dušikovim dioksidom (NO_2) v letu 2025, merilno mesto Vrbanski plato



Slika 5.75: Roža onesnaženja zunanjega zraka z delci PM_{10} in $\text{PM}_{2,5}$ v letu 2025, merilno mesto Vrbanski plato

6 ZNAČILNOSTI

6.1 MOŽNI VPLIVI KAKOVOSTI ZRAKA NA ZDRAVJE LJUDI

Čist zrak se smatra kot osnovni pogoj za zagotavljanje zdravja in dobrega počutja ljudi. O slabši kakovosti zunanjega zraka na območju poselitve ali drugem območju se lahko govori, če raven najmanj enega onesnaževala presega mejno vrednost ali dovoljeno število preseganj mejne vrednosti. Mejne vrednosti za varovanje zdravja za posamezna onesnaževala so določene z zakonodajo in podrobneje predstavljene v poglavju Zakonski okvir.

Slabša kakovost zunanjega zraka predstavlja pomembno grožnjo zdravju ljudi povsod po svetu, zato je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) na podlagi številnih opravljenih študij izdala prva priporočila za kakovost zraka, z namenom zmanjšati vpliv onesnaževal na zdravje ljudi, že leta 1987. Priporočila so bila kasneje večkrat dopolnjena v skladu z novimi znanstvenimi spoznanji. Glede na to, da študije niso uspele opredeliti varne meje kakovosti zunanjega zraka, ki ne bi povzročala škodljivih učinkov na zdravje ljudi, mejne in ciljne vrednosti ne zagotavljajo popolne zaščite zdravja ljudi. Zadnje splošne smernice so iz leta 2000 /19/, ki so jih leta 2005 /10/ obnovili za najpomembnejša onesnaževala (delci, ozon, dušikov dioksid in žveplov dioksid) ter novelirali leta 2021 /30/. Od izdaje smernic so prišli do precej novih znanstvenih spoznanj glede vplivov kakovosti zraka na zdravje ljudi, kar so povzeli v študiji /17/. Smernice kakovosti zunanjega zraka SZO so prikazane v naslednji tabeli.

Tabela 6.1: Smernice kakovosti zraka SZO /10/, /19/ ter /30/

Onesnaževalo	Enota	Kratkoročna vrednost	Dnevna vrednost	Letna vrednost
žveplov dioksid	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	500*	40	
dušikov dioksid	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	200**	25	10
ozon	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	100***		60*****
delci PM ₁₀	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		45	15
delci PM _{2,5}	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		15	5
ogljikov monoksid	mg/m^3	10*** 35** 100****	4	
svinec	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,5
kadmij	ng/m^3			5

* 10-minutna vrednost

** urna vrednost

*** osemurna vrednost

**** 15-minutna vrednost

***** Povprečje dnevne maksimalne 8-urne koncentracije O₃ v šestih zaporednih mesecih z najvišjo šestmesečno tekočo povprečno koncentracijo O₃

Z novimi smernicami WHO iz leta 2021 /30/ so se zaostrole vrednosti za PM_{10} , $PM_{2,5}$, NO_2 ter CO, medtem ko so na osnovi novih dokazov za SO_2 predlagali višjo novo priporočeno vrednost $40 \mu g/m^3$ (pred tem je bila priporočena $20 \mu g/m^3$).

Kot lahko razberemo iz primerjave zgornjih vrednosti in mejnih vrednosti po naši zakonodaji (tabela 4.1), pri večini onesnaževal SZO predlaga strožje vrednosti.

Za benzen, benzo(a)piren oziroma policiklične aromatske ogljikovodike, arzen, nikelj in kadmij ciljna vrednost temelji na njihovem rakotvornem tveganju, saj jih Mednarodna organizacija za raziskave raka (IARC), ki deluje v sklopu Svetovne zdravstvene organizacije, razvršča med snovi, ki dokazano povzročajo raka pri ljudeh (skupina 1) /27/.

Letne koncentracije **delcev PM_{10}** so bile nad priporočeno letno vrednostjo po smernicah SZO $15 \mu g/m^3$ na merilnih mestih Center, Krekova/Tyrševa, Tezno, Pobrežje ter Ruše. V Radvanju je priporočena letna vrednost SZO bila dosežena, na Vrbanskem platoju pa je izmerjena letna vrednost bila pod priporočilom SZO.

Letne koncentracije **delcev $PM_{2,5}$** so bile na vseh treh merilnih mestih nad priporočeno letno vrednostjo po smernicah SZO.

Škodljivi učinki na zdravje ljudi zaradi visokih koncentracij delcev PM_{10} in koncentracij delcev $PM_{2,5}$, ki so še bolj škodljivi kot delci PM_{10} , saj prodrejo globlje v respiratorni sistem, se pojavljajo že pri koncentracijah, ki jim je izpostavljenost prebivalstvo v mestih, tako v razvitih kakor tudi v nerazvitih državah. Spekter njihovih škodljivih učinkov je širok, prevladujejo učinki na respiratorni in kardiovaskularni sistem. Prizadeta je vsa populacija, dovzetnost variira s starostjo in splošnim zdravstvenim stanjem. Tudi novejša študije potrjujejo zaključke znanstvenih ugotovitev o negativnih vplivih na zdravje ljudi zaradi kratkotrajne in dolgotrajne izpostavljenosti delcem $PM_{2,5}$. V odsotnosti zakonodajno predpisanih mejnih dnevnih vrednosti in v oziru koristi za javno zdravje je potrebno poudariti, da bodo posledice kakršnega koli znižanja koncentracij delcev $PM_{2,5}$ in tudi PM_{10} pozitivne, ne glede na to ali so trenutne koncentracije nad ali pod mejnimi vrednostmi.

Novi dokazi povezujejo **črni ogljik** (BC) s kardiovaskularnimi učinki in prezgodnjo umrljivostjo tako za kratkotrajno (24 h) kot dolgotrajno (letno) izpostavljenost /18/. Podatki o koncentracijah črnega ogljika so dodatno merilo kakovosti zraka za oceno tveganja glede vpliva primarnih izgovalnih delcev iz prometa (vključno z organskimi delci, ki niso v celoti vključeni v masi delcev $PM_{2,5}$).

Vsebnost **ozona** v zraku se ugotavlja na merilnih mestih Pohorje, Tezno in Vrbanski plato. Najvišja osemurna koncentracija je bila na Pohorju $126 \mu g/m^3$, na Teznem $124 \mu g/m^3$ in Vrbanskem platoju $159 \mu g/m^3$, kar kaže na prekoračitve vrednosti iz smernic SZO, ki je $100 \mu g/m^3$. Ta vrednost je bila presežena na Pohorju v 42 dneh, na Teznem 29 in na Vrbanskem platoju v 99 dneh. Škodljivost ozona se povečuje z višanjem koncentracije, podaljševanjem časa izpostavljenosti in povečevanjem fizične aktivnosti. Akutni učinki povišanih koncentracij ozona se kažejo z respiratornimi simptomi, slabšanjem pljučne funkcije, povečanjem bronhialne odzivnosti in vnetjem dihalnih poti. Pri izmerjenih najvišjih osemurnih koncentracijah je verjetnost pojava škodljivih učinkov ozona na zdravje ljudi majhna, vendar ireverzibilnih sprememb pljučne funkcije pri občutljivih posameznikih ne moremo izključiti.

Za ozon ugotavljajo, da njegova škodljivost ni posledica samo kratkotrajne, ampak tudi dolgotrajne (meseci do leta) izpostavljenosti. Po noveliranih SZO smernicah /30/ v letu 2021 se je uvedlo smernico $60 \mu g/m^3$ za obdobje vrhunca sezone. Vrhunec sezone je definiran kot šest zaporednih mesecev leta z najvišjimi koncentracijami ozona. Na severni polobli je to v poletnih mesecih, na južni pa se razteza čez dve koledarski leti (blizu ekvatorja takšni sezonski trendi niso tako očitni, a se jih da določiti iz podatkov monitoringa). Navedena smernica je presežena na vseh treh merilnih mestih, saj znaša na Vrbanskem platoju $102 \mu g/m^3$, na Teznem $81 \mu g/m^3$ ter na Pohorju $89 \mu g/m^3$.

Merjene so bile tudi koncentracije **dušikovega dioksida**. Najvišja urna koncentracija v Centru je znašala $112 \mu\text{g}/\text{m}^3$, na Vrbanškem platoju $48 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in na Teznem $86 \mu\text{g}/\text{m}^3$, kar pomeni, da kratkoročna vrednost iz smernice SZO ni bila presežena. Je pa v Centru in na Teznem prekoračena priporočena letna vrednost SZO ($10 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Na povišane koncentracije dušikovega dioksida v zraku so posebej občutljivi astmatiki. Ugotovljen je neposreden vpliv NO_2 na zdravje ljudi pri kratkotrajnih visokih koncentracijah, ki pa se v Mariboru ne pojavljajo.

Za **dušikove okside** SZO ne predpisuje mejnih vrednosti, zato ni mogoče ocenjevati njihove zdravstvene škodljivosti.

Za **arzen in nikelj** ni zadostnih dodatnih novih spoznanj, ki bi vplivala na spreminjanje trenutno veljavne ciljne vrednosti. Četudi ciljna vrednost za **kadmij** ni presežena, to ne zmanjšuje možnosti naraščanja vsebnosti te kovine v zemlji zaradi odlaganja iz zraka. Zato je možen dodaten vpliv na zdravje ljudi, kar je potrebno upoštevati pri nadaljnjih študijah.

Tudi za **svinec** obstajajo nove študije vpliva na centralni živčni sistem pri otrocih in na srčno-žilni sistem pri odraslih pri koncentracijah okoli mejne vrednosti. To bi zahtevalo revizijo mejne vrednosti, kar pa ne bi imelo posebnega vpliva na zdravja ljudi v Mariboru, saj so izmerjene koncentracije daleč pod mejno vrednostjo.

Nekateri **policiklični aromatski ogljikovodiki**, ki so pogosto vezani na delce v zraku, so rakotvorni. Sicer so ugotovili nekaj novih povezav med PAO in zdravstveno škodljivostjo, vendar je te vplive težko ločiti od vplivov delcev. Zaradi zmanjšanja škodljivega vpliva na zdravja ljudi v zunanjem zraku v Mariboru bi bilo potrebno zniževati koncentracije tega onesnaževala.

Žveplovega dioksida v tem poročilu sicer ne omenjamo, meritve v preteklosti v Mariboru pa so pokazale, da tudi vrednosti iz smernic SZO niso bile presežene, iz česar lahko zaključimo, da je vpliv tega onesnaževala na zdravje ljudi malo verjeten. Po noveliranih smernicah SZO v letu 2021 je za SO_2 predlagana celo nova, višja priporočena vrednost.

Konec leta 2013 je mednarodna agencija za raziskave raka (International Agency for Research on Cancer - IARC) prvič uvrstila onesnaženje zunanjega zraka oziroma delce v onesnaženem zunanjem zraku v skupino 1, v skupino rakotvorno za ljudi. Kot glavne povzročitelje so navedli emisije iz prometa, stacionarne proizvodnje energije, industrije in kmetijstva ter zaradi ogrevanja in kuhanja v individualnih stanovanjskih stavbah /27/.

Za leto 2020 je v poročilu Evropske agencije za okolje /15/ za Slovenijo pripisanih 1700 predčasnih smrti delcem $\text{PM}_{2,5}$, 50 dušikovemu dioksidu ter 100 ozonu. Kot predčasna smrt je definirana smrt pred doseženo pričakovano življenjsko dobo, za katero se šteje, da bi jo lahko preprečili, če bi odpravili pripisani vzrok.

Leta 2025 objavljeni podatki za Slovenijo /38/ kažejo 1034 pripisanih smrti zaradi preseganja priporočenih koncentracij SZO za delce $\text{PM}_{2,5}$ ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Pri vplivu onesnaževal na zdravje ljudi pa ne smemo pozabiti vplivov iz delovnega okolja, bivalnih prostorov, notranjosti javnih in osebnih prevoznih sredstev ter prisotnosti pasivne ali aktivne izpostavljenosti tobačnemu dimu zaradi kajenja.

Z revidirano direktivo (2022/0347) o kakovosti zunanjega zraka se bodo predpisane mejne vrednosti večine onesnaževal v zunanjem zraku zaostrole /33/, /34/, /35/.

7 SKLEPNE UGOTOVITVE

V skladu z *Uredbo o kakovosti zunanjega zraka* je območje mestne občine Maribor in občine Miklavž aglomeracija z oznako SIM. Okoliške občine so v celinskem območju z oznako SIC (glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM₁₀ in PM_{2,5}, benzen, ogljikov monoksid, benzo(a)piren) oziroma v območju težkih kovin SITK (glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj). Stopnje onesnaženosti zraka in ravni onesnaževal v zunanjem zraku določa *Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka*. Ravni onesnaževal v zraku glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag po Odredbi so v tabeli 7.1.

Tabela 7.1: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku po Odredbi glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag

Območje	SO ₂	NO ₂	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	svinec	CO	benzen	arzen	kadmij	nikelj	b(a)p
SIM	1	2		2	2	1	1	1	1	1	1	3
SIC	1	1	1	3	2		1	1				3
SITK						1			1	1	1	

Legenda:

- 1 pod spodnjim ocenjevalnim pragom
- 2 med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
- 3 nad zgornjim ocenjevalnim pragom

Glede na v tem poročilu predstavljeno kakovost zraka v letu 2025 in preteklih letih so ravni onesnaževal glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag na območju SIC (merilno mesto Ruše) in aglomeraciji SIM (merilna mesta Center, Vrbanski plato, Tezno, Radvanje, Pobrežje, Krekova/Tyrševa in Pohorje) predstavljene v tabeli 7.2. Preseganje zgornjega in spodnjega ocenjevalnega praga je določeno na podlagi koncentracij v preteklih petih letih, kjer pa ni bilo na voljo dovolj podatkov, smo uporabili krajša obdobja.

Tabela 7.2: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag na podlagi meritev v preteklih 5 letih (2021-2025)

Območje	SO ₂	NO ₂	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	svinec	CO	benzen	arzen	kadmij	nikelj	b(a)p
Center	/	1	*	3	2	1	/	1	1	1	1	3
Krekova/Tyrševa	/	/	/	2	2	/	/	/	/	/	/	/
Tezno	/	1	/	3	/	/	/	/	/	/	/	3
Vrbanski plato	/	1	1	2	1	/	/	/	/	/	/	/
Radvanje	/	/	/	2	/	/	/	/	/	/	/	2
Pobrežje**	/	/	/	3	/	/	/	/	/	/	/	3
Pohorje	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SIM	/	1	1	3	2	1	/	1	1	1	1	3
Ruše	/	/	/	2	/	/	/	/	/	/	/	3
SIC	/	/	/	2	/	/	/	/	/	/	/	3

Legenda:

- 1 pod spodnjim ocenjevalnim pragom
- 2 med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
- 3 nad zgornjim ocenjevalnim pragom
- * ocena tveganj za rastlinstvo in naravne ekosisteme se izvaja le na krajih zunaj pozidanih območij
- / ugotavljanje onesnaževala ni potekalo
- ** Na osnovi meritev v letih 2023, 2024 ter 2025

Ocena ravni onesnaževal v zunanjem zraku glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag po Odredbi se razlikuje od ocene na podlagi rezultatov meritev v letu 2025 in preteklih letih v merilni mreži mesta Maribora in sosednjih občin, PMinter ter v državni merilni mreži:

- žveplov dioksid se več ne meri, saj so bile koncentracije več let zaporedoma pod spodnjim ocenjevalnim pragom, kar velja tako za aglomeracijo SIM kot območje SIC,
- meritve dušikovega dioksida so pokazale, da so koncentracije v SIM pod spodnjim ocenjevalnim pragom, kar se razlikuje od razvrstitve iz Odredbe - kjer je med zgornjim in spodnjim ocenjevalnim pragom,
- meritve delcev PM₁₀ so pokazale, da so koncentracije v SIM nad zgornjim ocenjevalnim pragom, kar se razlikuje od razvrstitve iz Odredbe – kjer je med zgornjim in spodnjim ocenjevalnim pragom.

Na podlagi ravni onesnaževal je določena stopnja onesnaženosti zraka glede na doseganje/preseganje mejnih oziroma ciljnih vrednosti. Razvrstitev v stopnje onesnaženosti zraka iz Odredbe je v tabeli 7.3, na podlagi meritev v letu 2025 pa v tabeli 7.4.

Tabela 7.3: Stopnja onesnaženosti zunanjega zraka po Odredbi glede na mejne oziroma ciljne vrednosti

Območje	SO ₂	NO ₂	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	svinec	CO	benzen	O ₃ *	arzen*	kadmij*	nikelj*	b(a)p*
SIM	II	II		I	II	II	II	II	I	II	II	II	II
SIC	II	II	II	II	II		II	II	I				II
SITK						II				II	II	II	

Legenda:

- II pod mejno ali ciljno* vrednostjo
I nad mejno/ciljno* vrednostjo

Tabela 7.4: Stopnja onesnaženosti zunanjega zraka glede na mejne oziroma ciljne vrednosti samo na podlagi meritev v letu 2025

Območje	SO ₂	NO ₂	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	svinec	CO	benzen	O ₃ *	arzen*	kadmij*	nikelj*	b(a)p*
Center		II		II		II		II		II	II	II	II
Krekova/Tyrševa				II	II								
Tezno									II				II
Vrbanski plato		II	II	II	II				II				
Radvanje				II									II
Pobrežje				II									II
Pohorje									II				
SIM		II	II	II	II	II		II	II	II	II	II	I
Ruše				II									II
SIC				II					II				II

Legenda:

- II ugotavljanje onesnaževala je potekalo, vrednosti so pod mejno/ciljno* vrednostjo
I nad mejno/ciljno* vrednostjo

Primerjava stopenj onesnaženosti zunanjega zraka po Odredbi s stopnjami, določenimi na podlagi meritev v merilni mreži mesta Maribora in sosednjih občin, PMinter ter v državni merilni mreži v letu 2025, kar je predstavljeno v tem poročilu, kaže naslednje značilnosti:

- tudi za dušikove okside bi bila lahko aglomeracija SIM razvrščena v II. stopnjo onesnaženosti zraka, čeprav Odredba aglomeracije ne razvršča,
- delci PM₁₀ na merilnih mestih v Centru, na Krekovi/Tyrševi, na Teznem, na Vrbanskem platoju, v Radvanju ter na Pobrežju so pod mejno vrednostjo, zaradi česar bi se lahko območje SIM razvrstilo v II. stopnjo onesnaženosti zraka.

Z Odlokom o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor je bilo v preteklosti območje Mestne občine Maribor in občine Miklavž na Dravskem polju razvrščeno v območje največje obremenjenosti z delci PM₁₀. Z omenjenim predpisom je bilo določeno, da se ukrepi iz tega odloka izvajajo najmanj tako dolgo, dokler kakovost zunanjega zraka ne doseže mejnih vrednosti za delce PM₁₀ iz predpisa, ki ureja kakovost zunanjega zraka. Zaradi doseganja kakovosti zunanjega zraka pod mejnimi vrednostmi je bil omenjeni odlok ukinjen marca 2022.

Kot vidimo iz zgornjih tabel, so bile v letu 2025 koncentracije delcev PM₁₀ na merilnih mestih v aglomeraciji SIM in SIC pod predpisanimi mejnimi vrednostmi. Nad zgornjim ocenjevalnim pragom so bile koncentracije benzo(a)pirena v delcih PM₁₀. Koncentracije dušikovega dioksida v aglomeraciji SIM pa so bile pod spodnjim ocenjevalnim pragom. Vsebnost ozona na merilnem mestu Pohorje, Tezno ter na Vrbanskem platoju je bila pod predpisano ciljno vrednostjo. Zaradi slabše kakovosti zunanjega zraka z omenjenimi onesnaževali (kljub temu da mejne vrednosti niso presežene) lahko pričakujemo škodljive učinke na zdravje ljudi. Vendar je ob tem potrebno poudariti, da to ni posebnost Mestne občine Maribor in sosednjih občin, ampak gre za sliko, značilno za mestna okolja (delci in dušikov dioksid), primestna/podeželska okolja (delci in benzo(a)piren v delcih) oziroma višje lokacije (ozon), kar potrjujejo tudi meritve na drugih merilnih mestih v Sloveniji in v tujini. Prebivalci obravnavanega območja torej niso izpostavljeni bistveno drugačnemu tveganju za okvare zdravja zaradi slabše kakovosti zunanjega zraka kot ostali prebivalci Slovenije v mestnem in primestnem/podeželskem okolju ali ob prometnih cestah. Vendar pa je glede na dokazano škodljivost (onesnažen zrak spada med rakotvorne snovi z zadostnimi dokazi pri ljudeh /26/) potrebno okoljske naloge usmerjati k reševanju problema slabše kakovosti zunanjega zraka. Ne glede na zakonsko ustrezno stanje posameznih onesnaževal v obravnavanem letu, je potrebno še naprej izvajati ukrepe za izboljšanje ali vsaj ohranjanje kakovosti zunanjega zraka in zagotoviti, da se obstoječa kakovost zraka še izboljša oziroma pri onesnaževalih, ki sploh niso več problematična (žveplov dioksid, ogljikov monoksid, težke kovine), vsaj ohranja.

Število preseganj mejne dnevne vrednosti delcev PM₁₀ v letu 2025 na merilnem mestu Center ni bilo nad dovoljenim (na to imajo velik vpliv tudi meteorološke razmere), vendar se vseeno lahko v zimskem času ob določenih dnevih izmerijo visoke koncentracije (preko mejne dnevne vrednosti). V zimskem času na nekaterih drugih lokacijah izmerjene enake ali občasno celo višje koncentracije delcev PM₁₀, kar še potrjuje dejstvo da je treba kakovost zunanjega zraka reševati v širšem prostorskem okviru - onesnaževala namreč ne poznajo in ne priznavajo občinskih meja.

Kazalnik povprečne izpostavljenosti (KPI) je povprečna raven izpostavljenosti, določena na podlagi meritev na mestih v neizpostavljenem mestnem okolju in odraža izpostavljenost ljudi z delci PM_{2,5}. Uporablja se za izračun ciljnega zmanjšanja izpostavljenosti delcem PM_{2,5} na ozemlju Republike Slovenije in obveznosti glede stopnje izpostavljenosti delcem PM_{2,5}. Začetna koncentracija v letu 2011 je (za celotno Slovenijo) 21,6 µg/m³, kar pomeni, da bi za doseganje ciljnega zmanjšanja do leta 2021 morali to vrednost zmanjšati za 20 % na 17,3 µg/m³. Vrednost KPI za merilno mesto Vrbanski plato je v letu 2025 (povprečje zadnjih treh let) znašala 10,1 µg/m³, kar pomeni znižanje tako da je obveznost glede stopnje izpostavljenosti dosežena.

Kot smo že pri delcih ugotovili, so koncentracije v nekaterih delih mesta praktično enake ali pozimi celo višje kot v središču mesta, merilna mesta v okolici katerih ni vplivnih virov, pa so precej manj obremenjena. To ne velja za ozon, katerega vsebnost je najnižja v mestnem središču, najvišja pa na bolj oddaljenih, neposeljenih območjih. Razlog temu so značilnosti njegovega nastanka in razpada, saj fotokemične reakcije razpada ozona intenzivneje potekajo tam, kjer je na voljo več njegovih predhodnikov (onesnaževal), kar se seveda dogaja ravno v mestnih središčih. Seveda obstajajo lokalne razlike zaradi bolj ali manj gostega prometa, večje ali manjše porabe goriv za ogrevanje, vrste uporabljenih goriv, gostote poselitve in prisotnosti takšnih ali drugačnih industrijskih virov. Na kakovost zraka pa ne vplivajo samo lokalni viri, temveč lahko zračne gmote prenašajo onesnaževala iz bližnje in daljne okolice (lokalni, regionalni in daljinski transport). Lokalne vremenske razmere, ki so pogojene z globalno vremensko situacijo, vplivajo na naše kurilne in vozne navade ter s tem spreminjajo intenziteto in vrsto emisij onesnaževal v zrak. Lokalno nastala onesnaževala se lahko zaradi določene vremenske situacije dalj časa zadržijo nad širšim območjem mesta, kar pomeni slabšanje kakovosti zraka neodvisno od intenzitete virov. Seveda smo mnenja, da bi bile meritve na območju sosednjih občin dobrodošle, saj dajo dopolnilni podatek k mestni kakovosti zraka in pregled nad kakovostjo zraka širšega območja, ki ni natančno takšna, kot jo naši predpisi predstavljajo.

Rezultati meritev kakovosti zraka, dolgoletni poteki in trendi koncentracij onesnaževal služijo tudi za ugotavljanje ustreznosti merilne mreže. V skladu z določili zakonodaje se ocenjevanje kakovosti zraka izvaja na območjih in v aglomeracijah, kjer raven onesnaženosti presega zgornji ocenjevalni prag, tako da se izvajajo meritve kakovosti zraka na stalnem merilnem mestu. Za pridobitev podatkov o prostorski razporeditvi kakovosti zraka se lahko navedene meritve dopolnijo z dodatnimi meritvami. Zato smo v letu 2025 nadaljevali z izvajanjem meritev delcev PM_{10} tudi v sosednji občini Ruše. Nesmiselno bi bilo zmanjšanje obsega meritev oziroma celo njihova opustitev iz finančnih ali drugih nerazumnih razlogov. Odločitev o tem mora temeljiti na analizi dolgotrajnih podatkov in določilih veljavne zakonodaje. Obseg meritev vključuje vsa onesnaževala, ki jih pokriva Uredba o kakovosti zunanjega zraka in ki imajo mejne ali ciljne vrednosti. Mnenja smo, da tak obseg zagotavlja ustrezen pregled nad stanjem kakovosti zunanjega zraka na območju Mestne občine Maribor in sosednjih občin. Obseg ne vključuje žveplovega dioksida, katerega meritve so bile v skladu z zakonodajnimi zahtevami opuščene ravno zaradi nizkih koncentracij v preteklih letih. Dolgoročno izvajanje meritev je tudi v veliko pomoč pri ugotavljanju vzrokov za slabšo kakovost zunanjega zraka in za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov. Meritve delcev PM_{10} bi zaradi visokih izmerjenih koncentracij v sosednji občini Miklavž na Dravskem polju v preteklih letih bilo priporočljivo nadaljevati ter razširiti še na druge sosednje občine (na primer Selnica ob Dravi, Duplek), da bi dobili še boljšo sliko glede kakovosti zunanjega zraka na širšem območju. Srednje letne koncentracije benzo(a)pirena v Centru so že več let okrog mejne letne vrednosti, meritve v Miklavžu na Dravskem polju so v preteklih letih pokazale vrednosti nad njo - iz tega razloga bi bilo priporočljivo te analize izvajati tudi na drugih merilnih mestih, kjer se ugotavljajo delci PM_{10} .

Rezultati projekta PMinter so pokazali, da je pri kakovosti zraka z delci in policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki pomemben delež, ki ga prispeva kurjenje lesa kot energenta za ogrevanje.

V primerjavi z ostalimi državami iz poročila »Air Quality in Europe – 2020 report« /15/, je Slovenija zaradi onesnaženosti z delci PM₁₀ na 18., zaradi delcev PM_{2,5} na 12., zaradi ozona na 7., zaradi dušikovega dioksida na 24., zaradi benzo(a)pirena v delcih PM₁₀ pa na 8. mestu. Za ostala onesnaževala (žveplov dioksid, ogljikov monoksid, benzen in težke kovine) ni podrobnejše opredelitve. Primerjave onesnaževal PM₁₀, PM_{2,5}, O₃ ter NO₂ kažejo na dolgoletni trend zmanjševanja izpostavljenosti prebivalcev kljub veliki medletni variabilnosti koncentracij. Iz vidika emisij so glavni onesnaževalci zunanjega zraka z delci PM₁₀, PM_{2,5}, CO, BC ter benzo(a)pirenom komercialne in institucionalne dejavnosti ter gospodinjstva, glavni onesnaževalec z NO_x pa je cestni promet.

Rezultati meritev in poročila za merilno mrežo Maribora in sosednjih občin, PMinter ter za državno mrežo ARSO so stalno dosegljivi na spletnih straneh:

- ARSO (poročila in aktualni podatki o stanju kakovosti zraka za celotno Slovenijo)
<http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/>
- MOM (poročila in aktualni podatki):
<https://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/zrak/monitoring-zunanjega-zraka/podatki-merilnih-postaj/>

Za vsako prikazano merilno mesto se glede na merjena onesnaževala in njihove ravni izračuna tudi indeks kakovosti zraka, ki nam poda enostavno informacijo glede na 6 razredov onesnaženosti na posameznem merilnem mestu že na osnovi obarvanosti merilnega mesta.

Rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka pa so (zraven ostalih podatkov o okolju) dosegljivi tudi v informacijskem sistemu Maribor – okolje in zdravje, kateri je dosegljiv na naslovu:

- <https://okolje.maribor.si/okolje/#karta>

V času med 01.10. ter 01.04. se izdaja napoved ravni onesnaženosti z delci PM₁₀, objavljena je na spletnem naslovu ARSO: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_napoved.html.

V času napovedanih visokih koncentracij delcev PM₁₀ se za zmanjšanje negativnih vplivov onesnaženega zraka priporoča prilagoditev ravnanja /28/ tako pri bivanju na prostem (zmanjšanje fizične aktivnosti v času visokih koncentracij), kakor tudi pri zmanjšanju lastnega vpliva na onesnaževanje (zmanjšanje temperature ogrevanja, omejitev ali prenehanje uporabe peči na trdna goriva, pravilno kurjenje /29/,...).

Ilustrativen prikaz izmerjenih vrednosti v letu 2025 s primerjavo z normativnimi vrednostmi je v tabelah 7.5 in 7.6. Primerjava s spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom je narejena samo na podlagi rezultatov v letu 2025. Pri oceni števila preseganj osemurne ciljne vrednosti ozona je upoštevano triletno povprečje.

Tabela 7.5: Pregled izmerjenih vrednosti v letu 2025 in usklajenosti z zakonodajo

Onesnaževalo	NO ₂	NO ₂	O ₃	PM ₁₀	PM ₁₀	PM _{2,5}	Benzen	Pb v PM ₁₀	Cd v PM ₁₀	As v PM ₁₀	Ni v PM ₁₀	B(a)P v PM ₁₀
	letna	urna	osemurna	letna	dnevna	letna	letna	letna	letna	letna	letna	letna
	µg/m ³	št. preko	št. preko	µg/m ³	št. preko	µg/m ³	µg/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Center	20	0		21	11	11	1,0	5,3	0,11	0,30	2,4	0,5
Krekova/Tyrševa				17	11	13						
Tezno	12	0	4	19	10							0,9
Vrbanski plato	7	0	20	14	4	9						
Pohorje			4									
Radvanje				15	8							0,5
Pobrežje				19	12							0,8
Ruše				16	9							0,9
mejna oz. ciljna	40	18	25*	40	35	20	5	500	5	6	20	1

* Triletno povprečje preseganj osemurne ciljne vrednosti. Ker za ozon vrednosti spodnjega in zgornjega ocenjevalnega pragova nista predpisani, se uporabita samo zeleni (ni preko ciljne vrednosti) ter rdeča barva (je preko ciljne vrednosti).

Legenda:

	prekoračena mejna oz. ciljna vrednost za zaščito zdravja
	prekoračen zgornji ocenjevalni prag
	med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
	pod spodnjim ocenjevalnim pragom

Tabela 7.6: Pregled usklajenosti z zakonodajo v letu 2025 (poenostavljeni prikaz)

Onesnaževalo	NO ₂	NO _x	O ₃	PM ₁₀	PM _{2,5}	Benzen	Pb v PM ₁₀	Cd v PM ₁₀	As v PM ₁₀	Ni v PM ₁₀	B(a)P v PM ₁₀
Center	😊			😐	😐	😊	😊	😊	😊	😊	😐
Krekova/Tyrševa				😐	😐						
Tezno	😊	😊	😊	😐							😞
Vrbanski plato	😊	😊	😊	😐	😊						
Pohorje			😊								
Radvanje				😐							😐
Pobrežje				😐							😞
Ruše				😐							😞

Legenda:

😞😞	prekoračena mejna oz. ciljna vrednost za zaščito zdravja
😞	prekoračen zgornji ocenjevalni prag
😐	med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
😊	pod spodnjim ocenjevalnim pragom

8 LITERATURA IN VIRI

- /1/ Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS štev. 39/06, 49/08, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18, 84/18, 158/20, 44/22
- /2/ Kakovost zraka v Mariboru, letno poročilo 2024, NLZOH Maribor 2025
- /3/ Mesečna poročila o kakovosti zraka NLZOH Maribor, januar - december 2025
- /4/ Arhiv, interna poročila ZZV, Inštitut za varstvo okolja Maribor 1984 – 2014 ter NLZOH 2015-2021
- /5/ Agencija RS za okolje: Onesnaženost zraka v Sloveniji (mesečni podatki 2025) in Bilten naše okolje (celotno leto 2025)
- /6/ B. Lukan: Možnosti zmanjšanja vsebnosti ozona v zraku zaradi emisij vozil v prometu, magistrsko delo, Maribor 2003
- /7/ Določitev novih merilnih mest v Ljubljani in Mariboru, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009
- /8/ Fine! Dust-Free, 3rd International Congress in Klagenfurt on Worthersee
- /9/ »Aquila« Peggau Bestimmung von Immissionsbeiträgen in Feinstaubproben, Das Land Steiermark, Bericht UA/AQPeggau 2008 72S, Graz, Oktober 2008
- /10/ WHO Air Quality Guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, global update 2005, Summary of risk assessment, World Health Organization, 2006
- /11/ Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo
- /12/ Poročilo pilotnega projekta »Opredelitev virov delcev PM₁₀ v Sloveniji«, Agencija RS za okolje, Ljubljana, november 2007
- /13/ PM₁₀ Datenanalyse, Grobabschätzung des PM₁₀-Anteils von Verkehrs- und Hausbrandemissionen an Grazer Luftgutemessstationen, Das Land Steiermark, Bericht Nr-01-2008, Graz Februar 2008
- /14/ Impact of selected policy measures on Europe's air quality, EEA Report No 8/2010
- /15/ Air Quality in Europe – 2020 report, EEA Report No 09/2020
- /16/ The contribution of transport to air quality TERM 2012: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, EEA Report No 10/2012
- /17/ Review of evidence on health aspects of air pollution - REVIHAAP, final technical report, WHO 2013
- /18/ Health effects of black carbon, WHO 2012, ISBN 978 92 890 0265 3
- /19/ Air Quality Guidelines for Europe, Second Edition, WHO Regional Publications, European Series, No. 91, 2000
- /20/ Zrak v Sloveniji, Jože Volfand et al, Fit media, Celje 2012
- /21/ C.B.B. Guerreiro et al, Benzo(a)pyrene in Europe: Ambient air concentrations, population, exposure and health effects, Environmental Pollution 241 (2016) 657-667
- /22/ Projekt PMinter, Poročilo o aktivnostih, izdajatelj Občina Celovec, Oddelek za zaščito okolja, Bahnhofstrasse 35, 9010 Celovec ob Vrbskem jezeru, december 2013
- /23/ LUKAN, Benjamin, LEŠNIK, Uroš: Kdo je glavni povzročitelj čezmerne onesnaženosti zraka z delci PM₁₀, Zbornik izvlečkov 6. Slovenskega kongresa preventivne medicine (Portorož 20.-22.10.2016), [COBISS.SI-ID 90064641]
- /24/ LEŠNIK, Uroš, LUKAN, Benjamin: Mit o čistejšem zraku zunaj mestnih središč, Zbornik izvlečkov 6. Slovenskega kongresa preventivne medicine (Portorož 20.-22.10.2016), [COBISS.SI-ID 90064897]
- /25/ IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2011 o določitvi pravil za direktivi 2004/107/ES in 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzajemno izmenjavo informacij in poročanjem o kakovosti zunanjega zraka (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9068) (2011/850/EU)
- /26/ WHO, International Agency for Research on Cancer, Press Release No. 221, Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths, October 2013
- /27/ Agents classified by the IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans, Volumes 1-132, Last update 2022-07-01, spletna stran: <https://monographs.iarc.fr/>
- /28/ Povišane ravni delcev PM₁₀ v zraku – priporočila za prebivalce, NIJZ, Strokovna skupina za ZRAK, Center za zdravstveno ekologijo, verzija: 12.10.2018
- /29/ Kako pravilno kurimo z lesom, 04.09.2019, http://www.mojzrak.si/wp-content/uploads/2016/03/MZK_Zrak-Brosura-TISK.pdf

- /30/ WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide, 2021, ISBN 978-92-4-003422-8
- /31/ LEŠNIK, Uroš. Delci pm10 in benzo(a)piren v delcih pm10 v Mariboru in okolici = Pm10 particles and benzo(a)pyrene in pm10 particles in Maribor and its surroundings. V: VRAČKO, Pia (ur.), et al. Javno zdravje – dosežki, nova spoznanja in izzivi prihodnosti : zbornik izvečkov. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2022. Str. 170-171. <https://www.spm.si/gradiva-kongres-2022/>. [COBISS.SI-ID 111085571]
- /32/ LEŠNIK, Uroš, LUKAN, Benjamin. Kakovost zunanjega zraka z delci PM10 v Mariboru. V: VRAČKO, Pia (ur.), KOLAR, Urška (ur.). *Dosežki v javnem zdravju v Sloveniji*. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. Str. 135. ISBN 978-961-6945-46-2. [COBISS.SI-ID 85896195]
- /33/ Spletna stran: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0233_SL.html (dostop 17.08.2026)
- /34/ [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0347\(COD\)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0347(COD)) (dostop 17.08.2026)
- /35/ <https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1784255&t=e&l=en> (dostop 17.08.2026)
- /36/ BELŠAK ŠEL, Nataša, LEŠNIK, Uroš. Continuous 10-year air quality measurement in Maribor starting in 2013 with PMinter project. V: PEHNEC, Gordana (ur.). "AIR PROTECTION 2023" : international conference and 13th croatian scientific and professional meeting , 20th - 23rd September 2023, Dubrovnik, Croatia : book of abstracts. Zagreb: Croatian Air Pollution Prevention Association: =Hrvatsko udruženje za zaščitu zraka, 2023. Str. 35. Zaščita zraka. ISSN 1848-185X. http://huzz.hr/Zbornik/Zbornik_sazetaka_za_web.pdf. [COBISS.SI-ID 163982851]
- /37/ LEŠNIK, Uroš. Rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka v merilni mreži Maribora in sosednjih občin. V: URŠIČ, Simona (ur.), et al. Srečanje Čist zrak za zdravje, Maribor, 29. januar 2025 : zbornik povzetkov predstavitev. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2025. Str. 5-6. <https://nijz.si/wp-content/uploads/2025/01/ZBORNIK-Cist-zrak-za-zdravje-KONcno.pdf>. [COBISS.SI-ID 225609987]
- /38/ Soares, J., et al., 2025, Assessing the environmental burden of disease related to air pollution in Europe in 2023, Eionet Report – ETC HE 2025/8, European Topic Centre on Human Health and the Environment (<https://doi.org/10.5281/zenodo.17658760>)
- /39/ LEŠNIK, Uroš, RADANOVIČ, Jan. Results of air quality measurements in the measurement network of Maribor, Slovenia, and neighboring municipalities. V: PEHNEC, Gordana (ur.). Air protection 2025 : international conference and 14th croatian scientific and professional meeting, 21st-25th October 2025, Zadar, Croatia : book of abstracts = Zaščita zraka 2025 : međunarodna konferencija i četrnaesti hrvatski znanstveno-stručni skup : zbornik sažetaka. Zagreb: Croatian Air Pollution Prevention Association: =Hrvatsko udruženje za zaščitu zraka, 2025. Str. 38. [COBISS.SI-ID [255881475](#)]